



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

2000-2001

20th 28th.

H.N. 1155

H.N. 1155



CATALOGUE

SYSTÉMATIQUE ET RAISONNÉ

DES CURIOSITÉS

DE

LA NATURE ET DE L'ART,

QUI COMPOSENT LE CABINET

DE M. DAVILA,

Avec Figures en taille-douce, de plusieurs morceaux qui n'avoient point encore été gravés.

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez BRIASSON, rue Saint-Jacques, à la Science.

M. DCC. LXVII.


Avec Approbation & Permission.



LE PRÉSENT CATALOGUE

se distribue aussi

à { Amsterdam , chez CHANGUION.
Rotterdam , chez BEMAN.
Londres , chez PAUL VAILLANT..
Basse , chez SCHWEIGHAUSER.



AVERTISSEMENT

DE M. DAVILA.

Je me crois obligé de prévenir ici le Public, & sur-tout mes Amis & mes Correspondans, des motifs qui m'engagent à vendre un Cabinet que je n'ai cessé d'augmenter jusqu'à ce jour. Les uns pourroient croire que je me suis dégoûté très-légèrement d'un objet qui paroissoit faire mes délices depuis plus de vingt ans : les autres, au nombre desquels sont d'illustres Naturalistes qui n'ont pas peu contribué à l'embellissement de cette Collection, pourroient regretter de m'avoir cédé quelques morceaux rares & curieux, dont ils ne m'ont peut-être fait l'abandon que par l'espoir de les voir paroître dans un Ouvrage que je me proposois de faire alors sur certaines branches de l'Histoire Naturelle, & pour lequel j'avois déjà fait dessiner plus de deux cent morceaux ; mais

cet Ouvrage n'a pû avoir lieu, par les mêmes raisons qui m'obligent à me défaire actuellement de mon Cabinet.

Entre plusieurs motifs que je pourrois donner, j'espère que ces deux suffiront : l'un est l'altération de ma santé qui, depuis quelques années, est fort chancelante, & qui exige de la tranquillité : l'autre est la nécessité où je me trouve de repasser au Pérou pour des affaires de famille qui m'y rappellent.

J'avoue sincèrement que ce n'est pas sans une peine extrême que j'abandonne l'objet de ma plus vive passion, & que je me vois forcé de priver le Public d'un petit Traité sur les Eponges & les Alcyons, que je lui destinois, & qui devoit être mon premier essai, ayant fait, dans ce genre, comme le prouve le Catalogue, une collection des plus intéressantes. Au défaut de cet Ouvrage, j'espère qu'on me saura gré d'avoir présenté le tableau fidèle de tout ce qui compose mon Cabinet.

Malgré les connoissances que l'étude de plusieurs années m'a pû fournir sur les

différentes substances qui s'y trouvent rassemblées, j'ai eu recours, en plus d'une occasion, aux lumières de nos plus habiles Naturalistes, auxquels je suis redevable de plusieurs remarques neuves & importantes; mais celui à qui je dois le plus, est M. DE ROMÉ DE LISLE, Auteur de la Lettre sur les Polypes d'eau-douce., qui a fait, de concert avec moi, toute la partie de l'Histoire Naturelle, & une partie de celle des Curiosités de l'Art.


Le peu de tems qui me reste avant mon retour au Pérou, & la peine que j'ai de voir démembrer une Collection qui, par le soin avec lequel je l'ai faite, peut devenir utile aux progrès de l'Histoire Naturelle, m'engagent à prévenir le Public que je me prêterai volontiers aux propositions de ceux qui voudroient faire l'acquisition totale de mon Cabinet: je le laisserai même, dans ce cas, à un prix son raisonnable, & au-dessous de sa valeur intrinsèque, qui sera fixée sur l'estimation qu'on en fera faire par des Connoisseurs en ce genre.


.vj AVERTISSEM. DE M. DAVILA.

On pourra s'adresser, jusqu'au 15 Octobre 1767, à M. DAVILA, rue de Richelieu, près de la Fontaine, ou à M. REMY, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, rue Poupée, seconde Porte cochère à gauche, en entrant par la rue Haute-feuille.

Passé ce terme, si personne ne se présente, on procédera à la Vente publique, qui commencera le lendemain de la Saint-Martin, Jeudi 12 Novembre de la même année, & qui sera continuée sans interruption jusqu'à sa fin.

On distribuera, de quinze jours en quinze jours, une feuille qui indiquera les Articles qui seront vendus dans chaque vacation.





P R É F A C E.

AVANT que de passer au détail des Substances qui composent notre Cabinet, nous croyons devoir exposer, en peu de mots, l'ordre que nous avons suivi dans leur distribution, & les raisons qui nous ont déterminés à en donner des descriptions plus circonscrites que celles que l'on trouve ordinairement dans les Ouvrages de ce genre.

Vingt ans de soins & de recherches, ayant rendu notre Collection une des plus complètes de l'Europe, sur-tout quant au Regne minéral & aux différens Corps que produit la mer; nous avons pensé que les Naturalistes nous sçauroient gré de la leur faire connoître dans un certain détail, avant qu'elle fût dispersée, & que les Curieux seroient bien-aîsés de se voir indiquer les

morceaux rares que nous possédons, & qu'on chercheroit peut-être inutilement ailleurs.

C'est dans cette vûe que nous avons formé le plan de notre Catalogue, & l'exécution n'étoit pas sans difficulté : car, s'il faut ici donner de chaque substance une idée aussi claire, aussi distincte qu'il est possible ; il est également nécessaire de se renfermer dans les bornes prescrites à une espèce d'ouvrage où l'on doit seulement faire connoître les objets, sans chercher à en approfondir la nature & les diverses propriétés.

La disposition méthodique des substances dans ce Catalogue, nous a paru le seul moyen de réunir le double avantage de la clarté & de la précision : car, en rangeant chaque Espèce dans son vrai Genre, en plaçant le Genre dans sa Famille, & celle-ci dans sa Classe ; cette simple distribution bien ordonnée, non-seulement jette une grande lumière sur les objets, mais même elle

écarter ces répétitions qu'il est si difficile d'éviter dans un ouvrage de la nature de celui-ci.

Mais nous l'avons déjà dit ; cet ordre, qui constitue notre plan, a lui-même ses difficultés : le nombre des productions naturelles est si grand ; leur forme est si variée ; la chaîne qui les unit entr'elles, si déliée & quelquefois si peu sensible, que l'on est souvent très-embarrassé lorsqu'il s'agit de déterminer les caractères qui doivent constituer ce qu'on appelle un *Genre*, & qu'il faut fixer celui auquel on doit rapporter telle ou telle *Espèce*. Tantôt on se trouve arrêté par des *Espèces* qui ne conviennent à aucun des *Genres* établis ; tantôt par une autre qui semble appartenir à plusieurs *Genres* à la fois.

Il est vrai que nous ne manquons pas d'excellens guides qui ont déjà tracé la route que nous devons suivre dans ce dédale ; mais un Catalogue de vente est bien différent d'un simple Catalogue raisonné, où l'on n'est point gêné par

la nécessité souvent rebutante d'affortir des lots : aussi espérons-nous qu'on voudra bien attribuer à cette contrainte quelques irrégularités qui pourront se trouver dans la distribution des *Espèces*. Nous allons développer le plan que nous avons suivi.

Les Naturalistes s'accordent assez à diviser tous les êtres en trois grandes Classes, connues sous les noms de *Regne animal*, *Regne végétal* & *Regne minéral*. Cette division, quoiqu'incomplète, est suffisante pour notre objet, n'ayant à parler que des substances de ces trois Regnes.

Nous mettons à la tête du premier Regne (que nous diviserons en dix parties) les plus petits animaux connus, ou du moins leurs productions, pour nous élever par degrés jusqu'à l'*Homme*. Les POLYPIERS ou habitations de Polypes forment, en conséquence, notre première Partie. Cette Classe, qui est la plus complète de notre Catalogue, comprend aussi les *Eponges* &

les *Alcyons*, quoique nous ignorions encore à quels Genres d'Animaux on doit rapporter ces productions singulieres. Ellis (1), Wallerius (2), Peyssonel (3), ont été nos guides pour la Partie systématique ; Séba (4) & Gualtieri (5) pour la description des Espèces.

La seconde Partie contient les *COQUILLAGES marins, fluviaux & terrestres*, dont nous faisons trois Sections, & que nous divisons, selon la méthode la plus suivie, en *Univalves, Bivalves & Multivalves*.

Quoique les sçavantes distributions

(1) Essai sur l'Hist. Nat. des Corallines. *La Haye*, 1756. in-4°. fig.

(2) Minéralogie (de la traduction de M. le Baron d'Olbach.) *Paris*, 1753. 2 vol. in-8°.

(3) Traduction d'un art. des Transact. Philos. sur le Corail. *Londres*, 1756. in-12.

(4) Locupletis. Rer. Nat. Theſ. *Amſt.* 1734 & suiv. 4 vol. in-fol. fig.

(5) Index Testar. Conchylior. *Florentina*, 1742. in-fol. fig.

de Lister (1), Gualtieri (2), Klein (3) & Adanson (4) nous aient été d'un grand secours, nous n'avons pû adopter aucun de ces systêmes, les uns à cause des subdivisions trop nombreuses qui en résultent, & dont ce Catalogue n'est point susceptible; les autres parce qu'ils sont fondés sur la forme propre & individuelle de chaque animal, & qu'ainsi nous n'aurions pû nous y conformer entièrement, puisque nous possédons un très-grand nombre de Coquilles dont les animaux ou n'ont point été décrits, ou nous sont même absolument inconnus.

Nous avons donc préféré le plan simple & aisé de M. d'Argenville (5);

(1) *Historia Conchylior. Londini*, 1685-1692. in-fol. fig.

(2) *Index Testar. Conchiliorum.*

(3) *Tentamen Methodi Ostracologicæ. Lugd. Batav.* 1753. in-4°. fig.

(4) *Hist. Nat. du Sénégal. Paris*, 1757. in-4°. fig.

(5) *L'Hist. Nat. éclaircie dans la Conchyliologie. Paris*, 1757. in-4°. fig.

plan d'ailleurs très-connu, & dès-là plus convenable à notre dessein, qui est moins de faire un traité complet sur cette matière, que d'indiquer les Espèces & les Variétés dont nous sommes en possession.

Toutefois on ne s'est pas tellement assujetti au plan de cet Auteur, que l'on ait négligé d'y faire quelques changemens, & de mettre un peu plus d'ordre dans les Familles ; ce qu'on a fait en subdivisant ces Familles en un petit nombre de Genres dont les caractères sont aisés à saisir : nous avons aussi réuni ou transposé quelques-unes des Familles, lorsqu'il nous a paru qu'il en résulteroit plus d'ordre & de liaison dans notre système. C'est aux Naturalistes à juger de ces changemens ; mais nous pouvons assurer que nous n'avons eu pour but que l'avantage de simplifier les objets, & de conserver les noms déjà reçus, sans vouloir prendre sur nous d'en faire de nouveaux qui n'auroient pas été du goût de tout le monde,

& qui dès-là exigeoient des discussions déplacées dans un Catalogue.

On nous reprochera peut-être de nous être trop étendus dans la description de la plûpart des Coquillages qui sont déjà connus, & qu'il eût, dira-t-on, suffi de nommer : mais voici nos raisons.

Comme les Coquilles qui ont des noms particuliers, ne font pas la vingtième partie de celles qui sont connues; que d'ailleurs la plûpart de ces noms, quelquefois tirés de fort loin, ne sont pas reçus partout, & que plusieurs ont été donnés en même tems à deux ou trois espèces souvent très-différentes, tandis que d'autres espèces ont eu jusqu'à deux ou trois noms à la fois : nous nous serions exposés à n'être point entendus, & nous n'aurions fait qu'augmenter la confusion, si nous nous étions contentés de donner un nom sans déterminer l'espèce à laquelle il convient.

Tel est l'inconvénient que nous nous sommes proposé d'éviter, en faisant de

P R É F A C E.

chaque espèce une description plus ou moins concise, selon que l'objet à décrire étoit plus ou moins commun, & en y joignant le nom sous lequel cette espèce est connue, non-seulement en France, mais en Hollande & dans les autres pays. En conséquence, nous avons cru devoir nous étendre un peu plus sur celles des espèces qui n'avoient point de nom.

Mais comme, en fait d'Histoire Naturelle, les descriptions les plus exactes sont insuffisantes pour ceux qui n'ont pas déjà quelque connoissance des objets décrits, nous avons eu soin d'indiquer en marge la plûpart des Naturalistes qui nous ont offert la même espèce gravée, en donnant la préférence tantôt à ceux de ces Auteurs où elle étoit le mieux représentée, tantôt à ceux dont les Ouvrages sont le plus connus. C'est aussi par cette raison que nous avons cité quelquefois trois & quatre Auteurs pour un même objet, afin que, si on n'a pas l'un de ces Ou-

vrages; on puisse avoir recours aux autres.

La troisieme Partie qui, sous le nom de ZOOPHYTES, comprend les *Etoiles de mer* & les animaux moux, auxquels on donne le nom de *Mollusques*, est encore des plus intéressantes, quant à la premiere de ces Familles. Si nous n'avons pas toutes les espèces qui sont décrites dans le bel Ouvrage que M. Linck a publié sur cette matiere (1), nous avons l'avantage d'en posséder plusieurs autres qui lui ont été inconnues, entre lesquelles le fameux *Palmier marin* tient sans contredit la premiere place, tant par sa rareté, puisque jusqu'à présent c'est le seul qui soit connu en Europe, que par le jour qu'il a répandu sur l'origine des *Pierres étoilées* & des *Entroques* depuis le Mémoire de M. Guettard (2).

(1) De Stellis marinis. *Lipſiæ*, 1735. in-fol. fig.

(2) Voy. les Mém. de l'Acad. R. des Sc. an. 1755, p. 224 & suiv.

Pour les sept autres Parties du Règne animal, qui sont les CRUSTACÉES, les POISSONS, les AMPHIBIES, les INSECTES, les OISEAUX, les QUADRUPÈDES & l'HOMME; la Collection que nous avons de chacune de ces Classes, n'étant pas assez considérable pour qu'on ait pû ranger les individus qui les composent sous aucun Ordre systématique: nous nous sommes contentés de les indiquer, en suivant, le plus exactement qu'il nous a été possible, l'ordre dans lequel nous les aurions placés, si notre Collection eût été plus complète à cet égard.

Quoique cette partie de notre Cabinet laisse beaucoup à désirer, les Curieux y trouveront néanmoins de quoi se satisfaire, par le soin que nous avons toujours eu de nous procurer ce qu'il y avoit de plus rare en chaque genre, dans l'impossibilité où nous étions de tout compléter.

Nous avons mis, à la fin du Règne animal, les *Bézoards* & les autres *Cal-*

cule qui naissent dans le corps de différens animaux & de l'Homme même. La suite que nous en avons est d'autant plus précieuse, qu'elle est le fruit de plus de quarante années de recherches faites par Messieurs Geoffroy de l'Académie Royale des Sciences, & que depuis elle a encore été augmentée d'un bon nombre d'autres que nous avons reçus du Péron.

Les VÉGÉTAUX forment la onzième Partie du Catalogue des Curiosités naturelles. La suite en est peu nombreuse; mais on y verra quelques morceaux rares & une collection très-piquante d'*Algues*, de *Fucus* & de *Mousses marines*. C'est par-là que nous terminons notre premier volume.

Les TERRES, les PIERRES & les MINÉRAUX ont fourni seuls la matière du second. Au moyen de la distribution méthodique que nous avons faite de ces différentes substances, on s'apercevra aisément qu'il est peu d'Espèces & même de Variétés qui nous

manquent. Nous avons suivi, autant qu'il a été possible, la nomenclature de Wallerius, quoique nous nous soyons souvent écartés du plan général de cet Auteur, pour suivre celui de quelques Naturalistes plus modernes. Nous avons aussi employé les *phrases* de Linnæus, sur-tout lorsqu'il s'agissoit de Pierres & de Mines de Suède, dont nous avons reçu une très-belle suite, étiquetée conformément au système de ce célèbre Naturaliste.

Le soin que nous avons pris de déterminer avec exactitude les diverses espèces de Cristallisations qui sont si fréquentes dans le Règne minéral, nous donne lieu d'espérer qu'on aura quelque indulgence pour certains articles un peu longs, parce qu'ils peuvent contribuer à faire mieux connoître ces corps dont la figure, constamment régulière, n'est pas si indifférente que bien des personnes se le sont persuadé : outre qu'elle suffit quelquefois pour les faire reconnoître, elle paroît indiquer une

★ P R É F A C E.

affinité cachée entre ceux de ces corps qui affectent une même Cristallisation.

Ainsi, par exemple, la forme *Cubique* est particulièrement affectée au Spath vitreux, au Plomb, à la Marcassite, au Sel marin; la *Pyramidale* au Spath calcaire, au Quartz, au Cristal de Roche, à la mine d'Etain; la *Prismatique hexagone* au Spath calcaire, à la mine de Plomb verte, à la mine d'Argent rouge; la *Rhomboïdale* à la Sélénite & au Spath calcaire; l'*Octaèdre* à l'Alun, au Fer, au Cuivre, aux Pyrites, au Rubis, &c.

M. Linnæus est le premier qui ait envisagé, sous un point de vûe général, toutes ces différentes Cristallisations, & le seul qui en ait déterminé la figure avec assez de justesse, pour les faire reconnoître au premier coup d'œil (1); mais les unes n'ayant point encore été décrites en notre langue,

(1) Voyez Linnæi Systema naturæ : ejusd. Amænit. Acad. vol. 1. & Musæum Tellinianum.

& les autres ne l'ayant été que d'une manière vague & incomplète, nous avons cru devoir y suppléer & ajouter aux Cristaux décrits par Linnæus, la description de plusieurs autres dont il n'a point parlé.

Les PÉTRIFICATIONS occupent la dernière Partie de la Collection d'Histoire naturelle; & ce n'est pas la moins intéressante. On y retrouvera le Plan que nous avons suivi dans la distribution des Regnes Animal & Végétal, auxquels, suivant l'opinion la plus commune, les différens corps pétrifiés doivent leur origine. S'il se trouve quelque Naturaliste qui doute encore de la réalité des Pétrifications, ou qui ne leur attribue qu'une origine purement minérale, nous avons plusieurs morceaux dont l'inspection suffira pour le tirer de son erreur. Tels sont, par exemple, du *Corail rouge* avec de la pyrite; des *Cornes d'Ammon*, des *Nautilus* & quantité d'autres Coquilles encore revêtues de leur test & de leur nacre; des

Echinites avec leurs dents ou leurs pointes dans la même matrice ; des *Entroques étoilées*, parfaitement semblables aux tiges du *Palmet marin* (1) ; des *Crâbes* pétrifiés (2) presque entiers avec leurs pattes & leurs mordans ; des Empreintes de *Chevrettes* (3), de *Poissons* (4), d'*Insectes*, caractérisées au point de ne pouvoir les méconnoître ; enfin, des *Bois*, des *Feuilles* & des *Fruits* même (5), hors de toute contestation.

Il existe, à la vérité, un grand nombre de Pétrifications dont les Analogues vivans ne nous sont point connus ; mais, si l'on ne trouve pas toujours précisément l'Espèce vivante, à laquelle on puisse rapporter telle ou telle Espèce pétrifiée, il est aisé du moins de.

(1) Voyez la planche 1 du troisieme vol. de notre Catalogue.

(2) *Ibid.* pl. 3. lett. G. g.

(3) *Ibid.* lett. I.

(4) *Ibid.* pl. IV.

(5) *Ibid.* pl. VI & VII.

reconnoître le genre qu'on doit lui assigner. Il n'en est pas de même des Pierres figurées (1), appelées *Jeux de la Nature* : celles-ci n'ont qu'une ressemblance imparfaite & le plus souvent arbitraire avec les objets auxquels on les compare : c'est ce qui met une différence très-sensible entre les *Fossiles propres* & les *Fossiles accidentels* ou *Pétrifications*, quoique quelques-uns aient affecté de les confondre.

LES CURIOSITÉS DE L'ART, dont il nous reste à parler, ne sont point étrangères à un Cabinet d'Histoire Naturelle : on peut même dire qu'elles en font une branche essentielle, puisqu'il est peu de productions de la Nature, auxquelles les Arts ne puissent ajouter un nouveau lustre & un nouveau mérite.

Les différentes Classes qui composent cette partie de notre Collection, sont :
1^o. Les *Habits, Meubles, Armes &*

(1) V. le second vol. du Catalogue.

Ustensiles de divers Peuples anciens & modernes, Chinois, Indiens, Américains, &c.

2°. Les *Bijoux*, les *Vases d'Agate*, de *Jaspe*, de *Cristal*, d'*Albâtre* & autres ouvrages curieux en *Coquilles*, *Nacre* & *Ivoire*, avec quelques anciens *Laques* & quelques *Porcelaines* de la *Chine* & du *Japon*.

3°. Les *Modèles*, les *Instrumens de Mathématique*, de *Physique*, &c.

4°. Les *Pierres gravées Antiques* & *Modernes*, dont plusieurs sont du premier mérite.

5°. Plusieurs beaux *Bronzes Antiques*, *Bustes*, *Bas-reliefs* & *Médailles*. (M. l'Abbé Grimaud, très-versé dans la connoissance des Antiques, nous a beaucoup aidés dans cette partie de notre Ouvrage).

6°. Une Collection assez considérable d'*Estampes* & de *Peintures à Gouache*, avec quelques *Tableaux* & *Dessins Originaux* des Maîtres des trois

Ecoles ; des Miniatures , Peintures en émail & autres curiosités semblables. Cette Partie a été faite par M. REMY , Peintre de l'Académie de Saint-Luc , connu par les Catalogues qu'il a donnés de plusieurs beaux Cabinets , & , en dernier lieu , par celui qu'il vient de publier de la riche Collection de Tableaux de feu M. de Julienne.

7°. Enfin notre Bibliothèque , peu nombreuse à la vérité , mais qui contient une suite assez complète des meilleurs Livres qui ont paru sur l'Histoire Naturelle.

Afin de ne rien laisser à désirer de tout ce qui pouvoit contribuer à rendre ce Catalogue utile , on y a joint des Tables Alphabétiques & Synoptiques , avec des Gravures d'un certain nombre de morceaux rares ou nouvellement connus , & sur-tout de ceux qui n'avoient point encore été gravés : nous comptons en donner un plus grand nombre ; mais le tems ne nous l'a pas permis : les Planches mêmes ont été

finies trop tard, pour que nous puissions les citer dans le corps de l'Ouvrage. La Table Alphabétique est suivie d'une Explication succincte de ces Planches, avec un renvoi à chacun des articles du Catalogue où il en est parlé.

TABLE SYNOPTIQUE

DU PREMIER VOLUME.

PREMIERE PARTIE.

POLYPIERS, page 1.

ORDRE I.

POLYPIERS SOLIDES OU PIERREUX.

Gr ^e 1.	Coraux.	5
2.	Madrépores.	11
3.	Astroïtes.	21
4.	Tubipores.	24
5.	Millepores.	26
6.	Rétépores.	30
7.	Méandrites.	32
8.	Fongipores.	36

ORDRE II.

POLYPIERS MOUX OU FLEXIBLES.

Gr ^e 1.	Faux Coraux.	43
2.	Lithophytes.	47
3.	Corallines.	56

G ^{re} 4. <i>Escaris molles.</i>	56
5. <i>Eponges.</i>	59
6. <i>Alcyons.</i>	66

SECONDE PARTIE.

COQUILLES.	72
------------	----

SECTION I.

COQUILLES DE MER.	75
-------------------	----

CLASSE I.

COQUILLES DE MER, UNIVALVES

FAMILLE I.

L É P A S.

G ^{re} 1. <i>Lépas entiers.</i>	78
2. percés au sommet.	88
3. chambrés.	89
4. à appendice en demi-cornet.	91

FAMILLE II

OREILLES DE MER.

1. <i>Oreilles de mer</i> , à trous.	93
2. sans trous.	95

SYNOPSIS.

~~xxx~~

FAMILLE III.

TUYAUX DE MER.

G ^e 1.	<i>Tuyaux de mer</i> , simples ou isolés.	97
2.	groupés ou <i>Vermi-</i> <i>culaires</i> .	102
3.	non testacés.	104

FAMILLE IV.

NAUTILES.

1.	<i>Nautilus</i> chambrés.	107
2.	non chambrés.	108

FAMILLE V.

LIMAÇONS.

1.	<i>Limaçons</i> à bouche ronde.	110
2.	à bouche demi-ronde, dits <i>Nérites</i> .	116
3.	à bouche ovale, dits <i>Sa-</i> <i>bots</i> .	123

FAMILLE VI.

BUCCINS.

1.	<i>Buccins</i> à bouche entière.	133
2.	à bouche échancrée.	136
3.	à petite queue.	143
4.	à longue queue.	155

T A B L E

FAMILLE VII.

R O C H E R S.

Gr ^e 1.	<i>Rochers</i> sans queue.	159
2.	à petite queue.	168
3.	aîlés, sans pattes.	179
4.	aîlés, à pattes.	188

FAMILLE VIII.

P O U R P R E S.

1.	<i>Pourpres</i> à petite queue.	194
2.	à longue queue.	202

FAMILLE IX.

T O N N E S.

1.	<i>Tonnes</i> à bouche entiere.	206
2.	à bouche échancrée.	208
3.	à queue.	216

FAMILLE X.

V I S.

1.	<i>Vis</i> lisses.	219
2.	striées.	221
3.	tuberculeuses.	226

FAMILLE XI.

V O L U T E S.

1.	<i>Volutes</i> coniques, ou <i>Cornets</i> .	232
----	--	-----

SYNOPTIQUE. xxx

- Gr^e 2. *Volutes* cylindriques, ou *Rouleaux*. 251
3. échancrées, ou *Olives*. 257

FAMILLE XII.

· PORCELAINES.

1. *Porcelaines* à bouche moins étroite. 264
2. à bouche plus étroite. 267

CLASSE II.

· COQUILLES DE MER BIVALVES.

FAMILLE I.

· HUITRES.

1. *Huitres* proprement dites. 280
2. feuilletées. 293
3. épineuses. 298
4. Anomies ou *Térébratules*. 311

FAMILLE II.

· PEIGNES.

1. *Peignes* à oreilles égales. 316
2. à oreilles inégales, dits
 Péoncles. 319
3. sans oreilles. 327

FAMILLE III.

· CAMES.

1. *Cames* à bases rondes régulières. 329

- G^{re} 2. *Cames à bases rondes irrégulières.* 343
 3. *à bases ovales régulières.* 339
 4. *à bases ovales irrégulières.* 344

F A M I L L E I V.

C Œ U R S.

1. *Cœurs proprement dits.* 349
 2. *Arches.* 357.
 3. *Cames tronquées ou Conques de Vénus.*
 360

F A M I L L E V.

T E L L I N E S.

1. *Tellines béantes à une extrémité.* 370
 2. *béantes aux deux bouts.* 375
 3. *Manches de couteau.* 378

F A M I L L E V I.

M O U L E S.

1. *Moules proprement dites,* 380
 2. *cylindriques, ou Dattes.* 386
 3. *triangulaires, ou Pinnes-*
marines. 388

C L A S S E I I I.

C O Q U I L L E S D E M E R M U L T I V A L V E S.

F A M I L L E I.

O S C A R I O N S.

392

F A M I L L E

SYNOPTIQUE.

xxlii

FAMILLE II.

PHOLADES.

Gr ^e 1. <i>Pholades</i> sextivalves.	396
2. quintivalves.	397

FAMILLE III.

TUYAUX.

1. <i>Tuyaux</i> trivalves.	398
2. quintivalves.	399

FAMILLE IV.

GLANDS DE MER.	401
----------------	-----

FAMILLE V.

CONQUES ANATIFERES ET POUCEPIEDS.	401
-----------------------------------	-----

FAMILLE VI.

OURSINS.

Gr ^e 1. <i>Turbans.</i>	410
2. <i>Cœurs marins.</i>	418
3. <i>Œufs marins.</i>	ibid.
4. <i>Pavois ou Boucliers.</i>	421
5. <i>Gâteaux ou Beignets.</i>	423
6. <i>Rotules.</i>	425

SECTION II.

COQUILLES FLUVIATILES.	427.
------------------------	------

Tome I.

6

SECTION III.

COQUILLES TERRESTRES.

436

TROISIEME PARTIE.

ZOOPHYTES.

451

FAMILLE I.

ETOILES DE MER.

- Gr^e 1. *Etoiles de mer*, à rayons fendus 454
 2. à rayons entiers. 464

FAMILLE II.

MOLLUSQUES.

469

QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES.

- Gr^e 1. *Crustacés* à corps allongé. 471
 2. à corps large. 472
 3. à corps arrondi. 474

CINQUIEME PARTIE.

POISSONS.

475

TABLE SYNOPTIQUE. xxxv

SIXIEME PARTIE.

AMPHIBIES. 478

SEPTIEME PARTIE.

INSECTES. 484

HUITIEME PARTIE.

OISEAUX. 490

NEUVIEME PARTIE.

QUADRUPEDS. 492

DIXIEME PARTIE.

L'HOMME. 500

APPENDICE

BEZOARDS ET CALCULS. 501

ONZIEME PARTIE.

VÉGÉTAUX. 509

APPROBATION

DE M. ADANSON.

*DE l'Académie Royale des Sciences, de la
Société Royale de Londres, Censeur Royal.*

J'AI lû, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un Ouvrage intitulé: *Catalogue systématique & raisonné des Curiosités de la Nature & de l'Art, qui composent le Cabinet de M. DAVILA*; & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression.

Ce Cabinet, vraisemblablement le plus riche qu'aucun Particulier ait encore formé, sur-tout quant à la partie de l'Histoire Naturelle, est d'autant plus précieux qu'il renferme des Suites immenses des productions des trois Regnes de la Nature. Il seroit fâcheux que cette Collection, qui nous est très-connue, & qui est destinée à être mise en vente, fût démembrée & dispersée dans divers petits Cabinets particuliers, étant très-digne de l'attention de quelque Souverain qui en feroit l'acquisition, autant par magnificence que pour procurer à ses Peuples des objets de connoissances naturelles, dont l'application bien entendue mène le plus souvent à quelque chose d'utile pour le commerce de la Société. *Fait à Paris, le 13 Mai 1767.*

ADANSON.

CATALOGUE



CATALOGUE

RAISONNÉ

DES CURIOSITÉS

D'HISTOIRE NATURELLE

DU CABINET

DE M. D'AVILA.

PREMIERE PARTIE.

POLYPERS.

Nous rangerons sous cette Classe toutes les productions marines qui ont été prises si longtems pour des plantes, & que les découvertes de MM. Peyssonel, Tremblay, de Réaumur, de Jussieu, Ellis & Donati ont démontré appartenir au Regne animal. On peut voir dans les Traités de ces sçavans Naturalistes les preuves nombreuses qui

**POLY-
PERS.**

A

POLY-
PIERS.

autorisent ce sentiment. Sans entrer dans de plus grands détails à cet égard, nous nous contenterons de dire ici que ces productions si singulieres & si variées sont l'ouvrage & la demeure d'animaux encore peu connus à cause de leur petitesse, auxquels on a donné le nom de *Polypes*. Ces Polypes que le Comte de Marfigly & quelques autres ont cru être les fleurs de ces prétendues Plantes, ne sont peut-être eux-mêmes que des fourreaux minces & déliés remplis d'animalcules presque imperceptibles (a); mais que le Polype soit pris pour famille ou pour individu, il n'en est pas moins constant que les productions dont nous allons parler sont autant de ruches extrêmement peuplées, comme il est aisé de s'en convaincre en les observant au microscope, lorsqu'elles sont encore dans leur élément : on

(a) Voyez la Lettre de M. de Romé de l'Isle à M. Bertrand sur les *Polypes d'Eau douce*. Paris, La Combe, 1766, in-12.

voit alors des milliers de Polypes sortir de toutes les tubules dont elles sont garnies, & y rentrer avec précipitation lorsqu'on les tire hors de l'eau. Les habitations de cette Classe d'Etres animés sont aussi variées dans leur forme que dans leur tissu. On peut néanmoins les réduire à deux Ordres principaux, dont le premier comprendra les *Polypiers de substance solide ou pierreuse*; & le second, les *Polypiers de substance molle ou flexible*. Il auroit peut être été plus exact d'établir nos classifications sur la forme propre & individuelle des animaux qui habitent & construisent ces Polypiers; mais, faute de connoissances assez étendues sur cet objet, nous adoptons les divisions qu'a établi le célèbre Wallerius pour les Polypiers fossiles, & celles de M. Ellis pour les Corallines, en y faisant quelques légers changemens qui nous ont paru propres à jeter du jour sur cette partie de l'Histoire Naturelle.


Le premier Ordre de cette Classe
contient huit Genres, qui sont

- 1°. Les Coraux proprement dits.
- 2°. Les Madrépores.
- 3°. Les Astroïtes.
- 4°. Les Tubipores.
- 5°. Les Millepores.
- 6°. Les Rétépores.
- 7°. Les Mæandrites.
- 8°. Les Fongipores.

Le second ordre est composé de six
Genres, qui sont

- 1°. Les Faux Coraux.
- 2°. Les Kératophites ou Litophites.
- 3°. Les Corallines.
- 4°. Les Escares molles.
- 5°. Les Éponges.
- 6°. Les Alcyons.





ORDRE PREMIER.

POLYPIERS

DE SUBSTANCE SOLIDE OU PIERREUSE.

GENRE PREMIER.

CORAIL.

CE sont des Polypiers d'une substance dure & compacte, intérieurement massive, pleine & solide, sans aucun trou ni porosité apparente, quoiqu'elle soit revêtue d'une écorce tartareuse garnie de tubules & de petits trous. On enlève aisément cette écorce dans l'instant que le Corail sort de l'eau ; mais après qu'il a été exposé à l'air un certain temps, on ne peut la détacher sans la réduire en poudre. C'est dans les tubules qui la composent que logent les animaux du Corail. Tous les Polypiers de ce genre sont ordinairement branchus, légèrement striés, & présen-

CORAIL.

CORaux. tent aux yeux la figure d'un Arbrisseau dépouillé de ses feuilles : la grosseur de la tige n'excède guère un pouce , & sa plus grande hauteur est d'un pied ou un peu plus.

ARTICLE I. Un très-bel Arbrisseau de Corail rouge, revêtu en partie de son écorce, portant onze pouces de haut sur huit de large, monté sur un pied de bois des Indes (*a*). Ce morceau, qui est d'une forme très élégante, est encore remarquable par deux branches qui se sont trouvées cassées dans le tems qu'il étoit dans la mer, lesquelles étant tombées entre les autres branches, s'y trouvent comme collées & recouvertes de la même écorce qui enveloppe le reste. Cet accident est d'autant plus curieux qu'il peut contribuer à rendre raison de la formation du Corail.

2. Un autre Arbrisseau de même Corail, entièrement revêtu de son écorce, ayant sept pouces de haut sur huit de large. Il adhère par sa base à une espèce de rocher qui paroît avoir

(*a*) Nous avertissons une fois pour toutes que presque tous les Polypiers des Articles suivans sont pareillement montés sur des pieds de bois des Indes, ou de bois noirci, excepté ceux qui ont un support naturel, ou quelque autre support particulier dont nous parlerons à leur Article.

été formé d'un assemblage confus de divers **CORAIL**, Polypiers.

3. Un magnifique Arbrisseau de Corail rouge-sanguin, dépouillé de son écorce, & dont les branches s'étendent en éventail. Ce morceau qui est monté sur un pied de bois noir, orné de cartouches de cuivre doré, est un des plus grands que l'on connoisse. Il porte neuf pouces de haut sur un pied de large, & est presque semblable à celui dont parle Séba *.

* Descript
de son Cabi-
net, tome 3,
pl. 115, N^o 4
1.

4. Un autre d'un rouge plus foncé que le précédent, à branches dispersées en tout sens, monté sur un pied de cuivre doré en or moulu enrichi de bordures, dentelures & fleurons de même Corail. Ce morceau, haut de cinq pouces & large de neuf, est des plus curieux.

5. Un autre Arbrisseau d'un rouge pâle, mais remarquable par la grosseur extraordinaire de ses trois principales branches, dont une a plus d'un pouce de diamètre, & les autres un peu moins. Le tronc a près de trois pouces de diamètre dans sa plus grande largeur. Toute la pièce a sept pouces de haut sur neuf & demi de large.

6. Un autre d'un rouge plus foncé que le précédent. Il se partage en deux branches principales d'une belle grosseur. Sa hauteur est de neuf pouces neuf lignes sur neuf pouces de large.

CORRAUX.

7. Un autre de la plus riche couleur & parfaitement beau. Il a six pouces de haut sur cinq de large, & est monté sur un pied de laque de même couleur, imitant le Corail.

8. Un autre d'un beau rouge foncé. Ce morceau est enrichi de deux grandes *huîtres* & d'un *tube vermiculaire* de deux lignes de diamètre, lesquels sont recouverts de la substance même du Corail.

9. Un magnifique Arbrisseau de vrai Corail blanc, portant huit pouces de haut. Il est en tout semblable au Corail rouge, à la couleur près, ce qui le rend très-rare.

10. Trois petits morceaux de Corail, rares & des plus curieux; sçavoir, un morceau de Corail en partie rouge & en partie blanc. Un traversé dans toute sa longueur par une branche de l'Espèce des Kératophites, connue sous le nom de *Corail noir*. Celui-ci est d'un beau noir luisant, & sert de base au Corail rouge qui l'enveloppe. Une interruption qui se trouve naturellement vers le milieu de ce morceau, en laisse voir tout le mécanisme. Et une branche de faux Corail noir, revêtue d'une croute grislâtre & celluleuse qui est elle-même recouverte d'une couche de vrai Corail rouge, dont les fractures laissent appercevoir les couches intérieures.

11. Deux pièces de Corail rouge avec son

écorce, dont une fait partie d'un groupe de différens Polypiers entassés l'un sur l'autre en forme de rocher ; tels que des *Eponges*, des *Litophites*, des *Corallines*, des *Tubes vermiculaires* & quelques petites *Anomies*. L'autre est aussi chargée de ces Corps étrangers.

12. Deux autres Groupes du même Corail & des mêmes Polypiers, sur chacun desquels on remarque de plus une huître complète. Celle du plus petit est blanche, feuilletée & peu commune.

13. Seize petits morceaux de Corail, très-intéressans pour ceux qui en étudient l'Histoire ; sçavoir, 1°. Cinq de Corail blanc de différentes nuances, l'un desquels se divise en deux branches de forme aplatie & très minces, & un autre fort singulier dont l'extrémité supérieure s'applatit & s'élargit en forme de feuille. 2°. Un petit échantillon de Corail blanc & rouge. 3°. Un petit pied de Corail rouge qui diffère des autres espèces connues, en ce que ses stries sont plus profondes sur-tout vers l'extrémité des branches. 4°. Un morceau dont les branches sont entrelacées les unes dans les autres, & qui paroît être une variété. 5°. Trois morceaux, dont un de Corail blanc, un de Corail noir, & un de Madrépore branchu, remarquables en ce qu'ils sont revêtus de Corail rouge. 6°. Un autre morceau des plus extraor-

CORAUX. dinaires ; c'est une branche de Corail rouge , couverte d'une croute grisâtre ; laquelle est elle-même recouverte par une seconde couche de Corail rouge qui a conservé une partie de son écorce. Entre ces deux couches est renfermé un Tube vermiculaire assez considérable. 7°. Un Galet & trois petites Valves d'Huîtres , dont deux feuilletées , avec des branches de Corail qui y sont adhérentes. 8°. Une petite *Anomie* aussi chargée de Corail.

14. Un petit Bocal très-curieux contenant quelques branches de Corail rouge , chargées de leurs Polypes des mieux conservés dans une liqueur appropriée. On voit très-distinctement leurs bras étendus en forme d'étoiles , & semblables aux pétales d'une petite fleur blanche.

15. Vingt échantillons de Corail numérotés 1=20 ; où l'on trouve toutes les gradations de sa couleur depuis le rouge le plus pâle jusqu'au rouge le plus foncé. Plus , sept douzaines de grains de même Corail de la grosseur d'un gros pois , dont chaque douzaine aussi numérotée offre une variété de nuances très-suivie. Ces échantillons ont été envoyés de la manufacture de Naples.



GENRE SECOND.

MADRÉPORES.

POLYPIERS d'une substance dure & pierreuse, moins compacte que la précédente, composés de branches en forme d'Arbrisseau, garnis de tubules, sans écorce, percés d'une foule de trous étoilés, la plupart très-sensibles & d'une forme régulière qui est toujours la même dans chaque espèce, quoiqu'elle varie à l'infini dans les espèces différentes; les Madrépores diffèrent des Coraux simples par les pores étoilés dont ils sont pourvus & par le défaut d'écorce. Les Polypes qui les habitent occupent l'extrémité des cellules.

**MADRÉ-
PORES,**

16. Un très-beau Madrépore blanc de la Méditerranée à rameaux arrondis, lissés, tortueux, entrelassés les uns dans les autres, parsemés de grands trous ou pores, assez éloignés les uns des autres, débordant un peu la superficie, étoilés & cannelés en-dedans; connu sous le nom de *Corail blanc oculé* *. Ce morceau,

* Seba, pl.
106, N°. 1 &
2. Gualtieri
ind. testar.
N°. 3.

**MADRÉ-
PORES.**

qui est d'une blancheur parfaite, forme un Arbre de neuf pouces de haut sur autant de large.

17. Un autre Madrépore blanc oculé de la même espèce, à branches, plus nombreuses & plus déliées. Il porte onze pouces de haut sur 10 de large.

18. Trois autres Madrépores; sçavoir., un blanc oculé de l'Amérique, à étoiles moins éparfes que le précédent; un, en buisson, couleur lilas, à petites branches rameuses, semées de pores étoilés assez saillants. Le troisième est d'un très-beau violet à petites branches chagrinées, un peu applaties & comprimées. Ces branches ont les deux surfaces séparées par une suite de petits trous qui regnent le long des côtés, ce qui leur donne l'apparence de deux pièces appliquées l'une sur l'autre. Ces trois morceaux ne sont pas communs.

19. Un rare & bel Arbisseau de *Madrépore blanc étoilé* des Indes, à étoiles plus nombreuses, moins profondes, moins saillantes & à moins de rayons que celles des précédens; la surface des branches & du tronc paroît à la loupe comme grainelée. Il est monté sur un support de bois des Indes qui entre à coulisse dans une boîte du même bois & vitrée.

20. Un autre Madrépore branchu étoilé, de la même espèce que le précédent. Il est remarquable en ce qu'il s'est formé sur un gros Litho-

phite, dont il recouvre deux des principales branches; il est aussi chargé de plusieurs huîtres. Les autres branches du Lithophite qui s'étendent en éventail sont recouvertes de l'écorce tartareuse, rouge & celluleuse qui leur est propre.

20 *bis*. Un Madrépore branchu des Indes Orientales, rare, blanc de lait, à branches fines, nombreuses, chargées de petites tubules étoilées, fort serrées. Sa forme est des plus gracieuses, & il adhère par sa base à un Polypier en forme de concrétion blanche & branchue de l'espèce des *faux Coraux*.

21. Un très-grand Madrépore rameux de la Méditerranée, à étoiles larges & profondes situées aux extrémités des branches; le reste de sa superficie est simplement strié, sans pores sensibles, & tire sur le rougeâtre *. Cet arbre qui est d'une hauteur surprenante, porte dix-neuf pouces de haut sur autant de large.

* Donati
mer Adriatique
pl. 7, f. 1.

22. Un autre de la même espèce, grisâtre, à branches moins grosses, & portant treize pouces de haut sur dix-sept de large.

23. Un autre des mêmes espèce & couleur, mais d'une nature beaucoup plus compacte, & à branches très-grosses. Ce morceau, qui est d'une pesanteur remarquable pour un Madrépore, a 14 pouces de haut sur autant de large.

24. Un autre de même espèce, chargé de

MADRÉ-
PORES.

branches de Corail rouge, de *Tubes vermicu-
laires*, d'*Huîtres*, d'*Anomies*, de *Corallines* &
autres Corps marins qui rendent cet article fort
curieux. Il a onze pouces de haut sur autant de
large.

25. Un autre avec les mêmes accidens, mais
moins large.

26. Un autre semblable de treize pouces de
haut sur sept de large.

27. Un très-grand *Madrépore abrotanoïde*
gris-jaunâtre, appelé *Bois de Cerf*, à rameaux
arrondis, pointus, dont toute la superficie est
hérissée de Tubules faillantes, étoilées en-de-
dans. Ce beau morceau porte vingt-cinq pouces
de haut sur vingt trois de large.

28. Un autre *Madrépore Bois de Cerf*, adhé-
rent naturellement à un grand Millepore, d'un
blanc sale, étendu en éventail, dont l'extrémité
des feuilles est profondément ~~de~~ coupée. A cette
particularité près, ce groupe ressemble parfaite-
ment, tant pour la grandeur que pour la forme,
à celui qui est représenté dans Séba *.

* Descr. de
Bon Cab. tom.
3, pl. 114,
N.º 4.

29. Un autre *Madrépore* de même espèce
gris-cendré, à grosses branches, se subdivisant
vers l'extrémité en plusieurs rameaux en forme
de bouquets. Il porte quinze pouces de haut sur
autant de large.

30. Deux *Madrépores* de moyenne gran-
deur, dont un gris-jaunâtre en forme de bou-

quet, à branches minces & pointues, garnies de Tubules plus faillantes que dans l'espèce précédente, ce qui lui a fait donner le nom d'*Épi de Bled*; & un en forme de buisson d'un blanc-bleuâtre, à branches plus grosses & plus rassemblées, également hérissées de longues Tubules. C'est le *Madrepora albida digitata* de *Gualtieri* *.

MADRÉ-
PORES.

* Ind. testar.
N°. 39.

31. Un Madrépore blanc en buisson, de six pouces & demi de diamètre, d'une forme arrondie très-agréable, à branches minces & petites, partant en grand nombre d'un même tronc d'où elles s'élèvent en tout sens. Elles sont chargées de Tubules faillantes, étoilées en dedans comme les espèces précédentes.

32. Un autre Madrépore en buisson, à branches plus grosses, & d'un beau blanc de neige, de forme presque ronde & de la plus parfaite conservation. Il a dix pouces de diamètre, & est porté naturellement sur son pied qui est aussi garni de Tubules, mais moins faillantes que celles des branches.

33. Un autre Madrépore en buisson, de couleur grise, ayant près d'un pied de diamètre. Il est pareillement porté sur une base de même nature que le reste.

34. Un beau Madrépore branchu, blanc sale mêlé de rouge, à branches épaisses, tuberculeuses qui s'élèvent ensemble de la tige dans

**MADRÉ-
PORES**

* Gualtieri
Ind. test. N°. 47.

une direction presque verticale, larges & fourchues aux extrémités. Leur surface est entièrement couverte de petits pores étoilés *. Il porte neuf pouces & demi de haut sur huit & demi de large.

* Idem. N°. 47.

35. Un très-beau Madrépore de la même espèce, blanc-fauve, à branches plus nombreuses, dont les principales se subdivisent en d'autres plus petites & comprimées qui s'étendent en différens sens, & imitent les *Choux fleurs* *. Il a onze pouces de haut sur presque autant de large.

36. Un autre de même espèce d'un très-beau blanc, de forme ovale. Son plus grand diamètre est de neuf pouces & demi, & sa hauteur de cinq pouces & demi.

37. Un autre d'un blanc-jaunâtre, à branches plus larges, plus applaties & plus éparfes, mais du reste semblable au précédent. Il adhère à un autre Madrépore de forme orbiculaire. dont toute la surface est parsemée de petites étoiles, & qui lui sert de base. Ce morceau, des plus agréables, a dix pouces de haut sur quatorze de large.

38. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un blanc rougeâtre, en forme de buisson, à petites branches qui se subdivisent de tous côtés en d'autres plus petites à plusieurs fourches, & adhèrent à une branche de l'espèce

pièce décrite Art. 27, sous le nom de *Bois de Cerf*. L'autre est de même espèce que celui de l'Art. 35. MADRÉ-
PÔRES.

39. Deux autres de moyenne grandeur, dont un de l'espèce du premier de l'Art. précédent, & un de celle de l'Art. 33.

40. Un autre Madrépore blanc, en buisson, à branches fort ferrées, fourchues & tuberculeuses. Cette espèce paroît tenir le milieu entre celle de l'Art. 35 & la première de l'Art. 38.

41. Un Madrépore gris, à rameaux arrondis, fort ferrés les uns contre les autres, épais, mouffes & noueux aux extrémités, parsemés de pores étoilés, très-petits. On remarque à sa base * & sur quelques-unes de ses branches, des *Madrépores agarics* qui s'y sont attachés. Ce morceau, qui a cinq pouces & demi de haut sur huit de large, est fort grand pour son espèce. * Séba, tom.
3, pl. 109,
N^o. 11.

42. Deux Madrépores en buisson, dont un de moyenne grandeur, blanc-jaunâtre, à branches sinueuses & tortues qui se joignent par les côtés en façon de treillis. Elles sont hérissées de rubules & chargées de petits rameaux qui forment, en s'élevant, une espèce de coupe à bords évafés; & un de l'espèce du premier de l'Art. 38.

43. Deux autres, dont un de l'espèce du premier de l'Article précédent, & un de celle de l'Art. 35.

MADRÉ-
PORES.

* Séba, tom.
3, pl. 113.

44. Un grand & rare Madrépore gris-obscur, à rameaux larges & aplatis, semblables aux *Cornes de Daim*; leur superficie est hérissée de tubules *. Ce morceau porte un pied de haut sur dix-huit pouces de large.

45. Un autre, blanc-fale, ressemblant à une grande feuille contournée, dont les bords se rapprochent un peu en forme de cornet. On remarque çà & là dans l'intérieur quelques rejets de la même forme. Ce Madrépore est couvert de tubules fort saillantes, & connu sous le nom de *Char de Neptune*, il porte vingt- & un pouces de haut sur vingt de large.

46. Un autre *Char de Neptune* de moyenne grandeur.

47. Deux jolis Madrépores de moyenne grandeur, dont un d'Amérique, rare, de forme mince & aplatie, semblable à l'*Agaric*, à surface supérieure couverte de sillons ondu-
leux & étoilés *, & un de l'espèce de l'Article précédent, mais de couleur plus blanche.

* Séba, pl.
110, N°. 6,
Lett. c.

48. Un *Madrépore agaric* de forme très-gracieuse; différent du précédent en ce que ses feuilles sont en grand nombre, & ont non-seulement la surface supérieure, mais encore l'inférieure couverte des mêmes sillons ondu-
leux & étoilés *. Il porte dix pouces de haut sur neuf de large.

* Séba, *ibid.*

49. Un autre de même espèce, mais de forme différente. MADRÉ-
PORES.

50. Un Madrépore agaric en forme d'éventail.

51. Un autre à plusieurs feuilles, diversement contournées.

52. Un Madrépore, nommé *Calice* ou *Tasse*, fait en forme d'entonnoir, & duquel les surfaces intérieure & extérieure sont légèrement cannelées & hérissées de petits trous étoilés peu saillans *.

53. Cinq petits Madrépores rares & d'espèces différentes; sçavoir, un à petites branches chargées de rejettons tortus & frisés, disposés en éventail & couverts de petits grains arrondis & inégaux dont ils paroissent hérissés *.

Un en forme d'lf, à tige principale environnée dans toute sa longueur de petites branches alternes & fourchues, forées à l'extrémité de tubules plus sensibles que dans les autres parties. Un en petit buisson, à branches arrondies, se croisant & s'entrelaçant de manière à former une espèce de réseau à jour malgré son épaisseur. Elles sont parsemées de petits pores étoilés. Un à feuilles crêpues & fort serrées, parsemées en entier de pores étoilés très-sensibles. Et un en forme d'Agaric, d'une espèce particulière. La surface supérieure de ses feuilles est criblée çà & là de larges & profondes étoiles, légèrement saillantes, & dont les stries

* Seba, pl.
110, N°. 7.
Gualtieri. in-
dex testar.
N°. 47.

* Gualtieri,
ind. test. N°. 121.

**MADRÉ-
PORES.**

prolongent sur les parties des feuilles qui en sont dépourvues. On y remarque aussi quelques gros tubercules striés comme le reste.

54. Trois petits Madrépores ; sçavoir , un Agaric à surface extérieure parsemée de pores étoilés peu saillans , assez larges , & dont les stries sont en-dedans , adhérant à un gros gallet qui sert aussi de support à quelques *Astroïtes* & à un petit Madrépore , peu différent du second de l'Article précédent ; un de l'espèce du premier de l'Article 38 , formant un petit bouquet sur un autre Madrépore auquel il adhère ; & un de l'espèce du quatrième de l'article précédent.

55. Quatre petits Madrépores ; sçavoir , un rare de Curaçao , à branches peu nombreuses , larges , épaisses , tuberculeuses , dont l'extrémité est aplatie & comprimée. Toute sa superficie est couverte de pores étoilés comme l'espèce de l'Art. 41 , dont il paroît être une variété. Un *Madrépore agaric* , semblable au premier de l'Art. 47. Un Madrépore branchu de l'espèce décrite Art. 41 ; & un semblable au second de l'Article précédent.

55 (bis). Un Madrépore Agaric blanc , très-rare , à partie supérieure , revêtue de protubérances cylindriques grosses , étoilées , plus ou moins saillantes , formées de lames très finement dentelées , qui en rendent la surface comme veloutée. La partie inférieure ne diffère en rien de celle des

SOLIDES OU PIERREUX. 21

autres Madrépores Agarics. Ce morceau curieux nous est arrivé depuis peu des Indes.

GENRE TROISIÈME.

ASTROÏTES.

POLYPIERS de la nature des précédents, & qui n'en diffèrent que par leur ^{ASTROÏTES} structure. Ils sont composés de tubes parallèles joints ensemble par leurs côtés, & dont la cavité est remplie de plusieurs lames qui partent de leurs parois & vont aboutir à un centre, ce qui forme des étoiles rondes, ovales ou anguleuses plus ou moins grandes & à plus ou moins de rayons. Les Astroïtes diffèrent des *Madrépores* en ce qu'ils ont des pores étoilés joints & parallèles qui n'en font qu'une seule masse, & des *Tubipores*, en ce que ceux ci ont des tubes fourchus & irréguliers fort faillans & non parallèles. Les Polypes des Astroïtes occupent l'extrémité des cellules comme dans les Madrépores.

56. Un très-bel Astroïte oblong, à partie supérieure convexe, & inférieure aplatie, à

ASTROÏTES. grandes étoiles orbiculaires bordées de petits jets saillants qui se répandent de tous côtés dans les interstices des étoiles *. Il porte seize pouces de long sur neuf de large.

* Seba, pl.
112. N°. 19.

57. Un bel Astroïte globuleux, à petites étoiles radiées, qui vont en pente vers le milieu, & dont les bords ne sont point frangés *. Ce morceau, d'une beauté singulière, est de forme orbiculaire aplatie, & groupé avec un autre de même espèce & de même forme auquel il tient par une espèce d'étranglement. Ce groupe est encore embelli par un grand Millepore feuillu, étendu en forme d'éventail, & par un Madrépore agaric de l'espèce décrite Art. 47. Le tout porte vingt & un pouces de long sur quatorze de large.

* Seba, pl.
112. N°. 17.

58. Un Astroïte globuleux à pores étoilés, amples, non-arrondis, mais anguleux; les jets dont ils sont bordés sont minces & élevés *. Il adhère à un joli Madrépore en buisson de l'espèce de l'Art. 31, & porte neuf pouces de haut sur sept de large.

* Seba, pl.
112. N°. 10.

59. Deux Astroïtes, dont un en forme de calotte tuberculeuse, parsemée de petits pores étoilés fort nombreux *, & posée naturellement sur une base de même nature & un peu feuilletée. Cet Astroïte vient de Curaçao, où il est connu sous les noms de *Tête de More*, ou de *Perruque à l'Angloise*. L'autre est de même

* Seba, pl.
112, N°. 18.

espèce, mais en forme de rocher, & percé çà & là de tubes cylindriques très-profonds qui paroissent l'ouvrage de quelques Polypes parasites qui s'y logent.

ASTROÏTES.

60. Un autre en forme de monticule creusée par de profonds & larges sillons, inégaux entr'eux. Cet astroïte à petites étoiles, & de même espèce que le précédent, a été trouvé sur la patte d'un ancre de vaisseau dans les Indes Orientales. Il adhère dans toute sa base à une plaque du fer de l'ancre sur laquelle il s'est formé, ce qui le rend fort curieux.

61. Un Astroïte mince & feuilleté en forme d'Agaric. La surface supérieure de ses feuilles est parsemée de petits pores étoilés fort nombreux comme l'espèce de l'Article précédent dont il paroît être une variété. Il est de figure arrondie, & porte treize pouces de diamètre.

62. Deux Astroïtes globuleux, rares & d'une belle grandeur, dont un à larges & très-profondes étoiles irrégulières, dont les bords sont minces & élevés; & un à étoiles arrondies, dont les bords larges & lamelleux sont séparés par de petits intervalles sur lesquels les lames se prolongent *.

* Seba, pl
112. N°. 15.

63. Dix Astroïtes de diverses grandeurs; sçavoir, deux à larges étoiles arrondies de l'espèce de celles de l'Article précédent; trois à étoiles arrondies, mais plus petites & de l'es-

ASTROÏTES. pièce de l'Article 56 ; un de l'espèce de l'Article 57 ; un en forme de poire à étoiles irrégulières, de l'espèce de celles de l'Article 58, mais dont les bords sont plus larges ; deux de forme globuleuse un peu tuberculée , à très-petites étoiles, de l'espèce de l'Article 59 ; & un coupé en différens sens pour faire voir le mécanisme des cellules intérieures.

GENRE QUATRIÈME.

T U B I P O R E S.


TUBIPORES **P**OLYPIERS dont la substance ne diffère en rien des précédens. On ne les en distingue qu'à cause de leurs petits tuyaux fort saillants , quelquefois bifourchus, ramassés en une masse solide en forme de buisson. Ces tuyaux sont étoilés comme ceux des Astroïtes, mais au lieu d'être joints ensemble par leurs côtés, ils sont isolés en partie & ne sont joints que par leur base. L'animal occupe la même place que dans le Genre précédent.

64. Un très-beau Tubipore de la Méditer-

ranée en forme de buisson , à tuyaux longs , **TUBIPORES**
bifourchus , isolés , & profondément étoilés :
ils s'élevent en tout sens d'un centre commun,
qui leur sert de base ; ce morceau porte cinq
pouces de haut sur six de large , & est grand
dans son espèce *.

65. Deux Tubipores des Indes , à tuyaux * Gualtieri
ind. testar.
N°. 5.
engagés en partie dans une concrétion pier-
reuse , qui leur donne une forme orbiculaire *.
Ces tuyaux sortent plus ou moins de la matière
pierreuse qui les enveloppe , & sont plus épars
que dans l'espèce précédente dont ils font une
variété. * Seba , pl.
108. N°. 19.

65 (*bis*). Un autre aussi des Indes , mais rare ,
à tuyaux plus gros , plus saillans & à étoiles for-
mées de lames minces , déliées , presque per-
pendiculaires , & disposées à-peu-près comme
dans l'*Œillet de Mer*.



GENRE CINQUIÈME.

MILLEPORES.

MILLE-
PORES.

POLYPIERS qui diffèrent des Madrépores, des Astroïtes & des Tubipores, en ce que dans ceux-ci les étoiles se présentent d'une manière très-distincte, au lieu que les Millepores n'ont que des trous simples non-étoilés, du moins ils ne le paroissent pas à l'œil. Ces Polypiers ont communément la forme d'arbre ou de buisson, rameux ou feuillus comme les Madrépores : leur superficie est couverte de petits trous quelquefois peu sensibles, même à la loupe, qui pénètrent dans l'intérieur, & servent de retraite aux animaux qui les bâtissent.

66. Un rare & beau Millepore de Curaçao, à feuilles blanchâtres, larges, minces, étendues & piquées de petits trous ronds ; il ressemble à un grand chou qui ne feroit pas pommé, ce qui peut le faire appeller *Millepore à feuilles de Choux*. L'huître extraordinaire

dont parle Séba * peut donner une idée des feuilles de ce Millepore, que nous n'avons trouvé gravé dans aucun Auteur.

MILLE-
PORES.

* Séba, pl.
89. N^o. 10,

67. Un autre de même espèce, mais à feuilles plus épaisses, moins éparpillées & plus serrées, dont les extrémités ont des plis & replis qui imitent *la fraise de veau*. Il a quinze pouces de haut sur dix-huit de large.

68. Un beau Millepore de Curaçao, de même hauteur & largeur que le précédent, à grandes feuilles travaillées à jour, profondément dentelées & frangées dans leurs extrémités.

69. Un autre de même espèce, adhérent à une grosse *Cérébrite*, qui lui sert de support. Ce groupe magnifique est encore embelli par différentes espèces d'*Astroïtes* & de *Méandrites* naissantes qui font au pied. Il porte quinze pouces de haut sur un pied de large.

70. Un autre Millepore de forme très-agréable, à feuilles aplatties, minces, nombreuses & profondément découpées. Il porte treize pouces de large sur huit de haut, & est monté sur un pied de bois doré.

71. Deux Variétés de cette espèce, dont une à dentelures plus allongées, plus droites, & en forme de petites mains étendues, qui l'ont fait appeller *Digitata*; l'autre incruste les branches

**MILLEPO-
RES.**

d'un Lithophyte porté sur un petit pied de bois marbré.

72. Deux autres Variétés de moyenne grandeur, dont une en éventail, à branches applaties, s'entrelaçant en façon de grillage, & une moins évasée, ayant pour base naturelle un groupe d'*Astroïtes* & de *Corallines*.

73. Un autre de même espèce, mais très-remarquable, en ce qu'il s'est formé sur une grosse bouteille, dont il revêt la superficie. Toutes les branches feuillues de ce Millepore sont adhérentes au goulot de la bouteille, d'où elles s'étendent en différens sens & forment un bouquet aussi agréable que curieux. Les Polypes ont étendu leur ouvrage tout autour des bords du goulot, sans en fermer l'orifice ni pénétrer en-dedans, comme on s'en est assuré par une ouverture pratiquée au ventre de la bouteille pour voir dans l'intérieur. Ce morceau intéressant a été pêché à la Barbade.

74. Un beau Millepore en buisson, à branches moins applaties, dont les extrémités se terminent en rameaux bifourchus, arrondis & pointus. Il porte dix pouces de haut sur quinze de large.

75. Un grand Millepore des Indes., rare & des mieux conservés, à branches chargées de rameaux nombreux & délicats, diversement contournés, s'entrelaçant les uns dans les au-

res, & formant un buisson des plus épais, MILLEPO-
d'une figure agréable. Ce morceau a quinze RES.
pouces de long sur quatorze de large.

75 (bis). Trois jolis Millepores, dont un à
branches courtes & rondes, qui se divisent en
plusieurs petits rameaux fourchus & compri-
més : un à branches applaties, dont les ramifi-
cations se partagent comme *le bois de Cerf*, ce
qui lui en a fait donner le nom *, & un à bran- * Marfigly,
ches arrondies, d'un gris verdâtre, granuleu- hist. de la
Mer, pl. 33,
fig. 160.
ses, chargées de petits rameaux très-déli-
cates disposés en forme d'éventail *.

* Ibid. fig.
163.



GENRE SIXIÈME.

RETÉPORES ET ESCARRES PIERREUSES.

RETÉPORES

CES Polypiers qui approchent beaucoup des Millepores pour la forme de leurs trous , n'en diffèrent que parce qu'ils sont à feuilles plates & irrégulières en forme de dentelle , d'écorce ou d'éventail. Leur substance est mince, poreuse & percée ou piquée d'une infinité de trous , dont les uns sont à jour & très-sensibles , les autres le sont moins , & les autres sont à peine visibles. C'est dans ces petites cavités que logent les animalcules.

76. Un beau Rétépore de la Méditerranée d'un blanc rougeâtre nommé *Manchettes de Neptune* ; il est à larges feuilles , minces , & délicates , percées à jour de trous ovales comme de la dentelle *. Ce morceau , qui a quatre
* Seba, tom. 3, tab. 101, N^o. 6. pouces & demi de haut sur six & demi de large , est rare de cette grandeur.

77. Quatre autres *Escarres pierreuses* ou *frondipores* de belle grandeur ; sçavoir , une à larges

feuilles , dont les bords se joignent ensemble irrégulièrement de côté & d'autre , & dont les deux superficies sont composées de cellules ovales *. Une de même espèce groupée avec de gros tubes vermiculaires , diversement entortillés sur un gallet , qui leur sert de base , & deux Escarres à plusieurs feuilles couchées les unes sur les autres en forme d'Agaric , dont les petits pores sont à peine visibles , même à la loupe *.

RÉTÉPORES

* Ellis Corall. pl. 30, N^o. 3.

78. Huit petites Escarres , tant Rétépores que Frondipores ; sçavoir , un Frondipore en façon d'écorce ou de croûte piquée de petits points comme de trous d'aiguille , formant plusieurs couches concentriques sur une branche de *Fucus*. Un dont les petites branches applaties ressemblent aux *Cornes de Daim* , & lui en ont fait donner le nom ; un de l'espèce des deux premiers de l'article précédent ; un à très-petits pores de l'espèce des deux derniers du même article , mais en forme de bouquet. Trois Rétépores dentelles , dont deux de l'espèce & couleur de celui de l'article 76 , & le troisième des Indes , d'un très-beau blanc à pores moins ouverts *. Un Rétépore à larges mailles chargées de petits nœuds granulés , imitant un filet , & différent de toutes les espèces précédentes.

* Ferrant. Imperat. hist. nat. p. 600.

* Seba , pl. 100 , N^o. 11.

79. Six autres Escarres pierreuses , dont une en forme d'écorce incrustant une grosse épon-

RÉTÉPORES ~~ge~~ ; une de l'espèce de la première de l'article 77 ; deux de celle de l'article 76 ; & deux à larges mailles , comme la dernière de l'article précédent.

GENRE SEPTIÈME.

MÉANDRITES.

MÉANDRITES. ~~P~~OLYPIERS qui diffèrent des précédens en ce qu'ils ne sont ni lisses , ni poreux , ni étoilés , mais profondément sillonnés de différentes manières : ils sont ordinairement de forme orbiculaire avec des amfractuosités sur la surface & aux extrémités qui représentent des Ondes , des Vermisseaux ou un Cerveau humain , ce qui leur a fait aussi donner le nom de *Cérébrites*. L'animal occupe la superficie comme dans les Madrépores.

80. Une très-grosse Méandrite d'Amérique de forme orbiculaire , à côtes minces , aiguës , sinueuses , & lamelleuses , laissant des intervalles peu larges , au milieu desquels les lames viennent

viennent aboutir *. Elle porte dix pouces & demi de diametre, & adhère à un grand Panache de mer.

MÉANDRI-
TES.
* Gualtieri
ind. testat.
N°. 44

81. Une grosse Méandrite, à côtes plus élevées que la précédente, d'une forme très-particuliere. Outre les sinuosités qui sont propres à ce genre, elle est encore traversée par de larges amfractuosités très-profondes, qui la font ressembler à un groupe de plusieurs Méandrites posées les unes sur les autres.

82. Deux autres Méandrites à côtes minces, dont une a la forme du gros Coco de mer des Maldives qui représente deux fesses. Les côtes dont elle est sillonnée sont garnies de lames dentelées & saillantes. L'autre, qui ressemble au sabot d'un cheval, a les côtes moins lamelleuses & un peu plus épaisses *.

* Séba, pl.
112. N°. 7.

83. Une autre de forme orbiculaire, à côtes plus épaisses que les précédentes, laissant de larges intervalles, chargés de lames dentelées. Son diametre est de sept pouces *.

* Gualtieri,
ibid. N°. 34.

84. Trois autres assez grandes & des espèces ci-dessus décrites.

85. Six autres, dont quatre de moyenne grandeur & deux petites; sçavoir, une en forme de Priapite, à bandes larges & applaties dont les contours tortueux forment par intervalles des étoiles *. Cette variété est rare & curieuse. Une de la Vera-Cruz, à côtes minces

* Séba, pl.
112. N°. 6.

MÉANDRI-
TES.

& de couleur rougeâtre ; & quatre de l'espèce de l'Art. 80, dont les deux petites paroissent être une variété.

86. Une magnifique Méandrite orbiculaire , à bandes très-faillantes , plus larges & d'une structure plus serrée que les fillons qui les séparent. Ces bandes ont ceci de particulier , qu'au lieu d'aller en s'étrecissant vers le sommet , comme dans les autres espèces , elles sont creusées en gouttieres , s'étrecissent vers la base & forment comme autant de ruisseaux tortueux dont le lit est plus ou moins large. Cette espèce n'est pas commune , celle que nous citons de Séba * en approche ; mais les bandes en paroissent plus petites & les interstices plus larges que dans la nôtre , qui a sept pouces de diamètre.

* Ibid. tab.
112. N°. 5.

87. Une autre de même espèce , de trois pouces & demi de diamètre.

88. Une autre de forme oblongue & de même espèce , à bandes encore plus larges. Elle tient le milieu pour la grosseur entre les deux précédentes.

89. Une belle Méandrite de forme sphéroïdale aplatie , à côtes épaisses par la base , minces & canelées à leur extrémité , séparées par de profonds & larges fillons lamelleux *. Elle porte onze pouces de diamètre. Cette espèce a beaucoup de ressemblance , par sa partie in-

* Séba , pl.
109. N°. 9 &
10.

érieure, à l'espèce de Fongipore, appelée *Œil-
tu de mer*; elle est, comme lui, garnie d'un MÉANDRI-
tes.
pédicule, & n'en diffère qu'en ce que ses cali-
ces se joignent ensemble & forment une seule
masse, dont la partie supérieure est filonnée &
ondulée. Nous avons cru pouvoir la ranger
dans ce genre avec d'autant plus de fondement
qu'elle paroît servir de passage aux véritables
Champignons de mer, dont nous parlerons dans
le suivant.

90. Une autre de même espèce, de forme
ovoïde aplatie. Elle diffère de la précédente
en ce que l'extrémité de ses côtes, au lieu d'être
creusée par un petit filon, est garnie d'une
suite de petites cellules formées par l'extrémité
des lames qui se joignent. Elle est encore re-
marquable par un grand trou à bords lamelleux
en forme d'Umbilic, placé vers le milieu de sa
surface supérieure. Ce beau morceau, qui a
neuf pouces & demi de long sur six & demi de
large, est dans une boîte vitrée.

91. Une autre de l'espèce de l'Art. 89, mais
plus petite *.

92. Quatre autres jolies Méandrites qui sont
des variétés des précédentes; sçavoir, une à
côtes minces garnies de lames larges & très-
fines; une à plis grossiers & lamelleux, dont
les interstices sont très-profonds *; & deux de
forme ovoïde, à bords élevés & repliés, en

* Guad. ind. test. N°. 36.

* Séba. pl. III. N°. 7.

MÉANDRI- forme de festons, dont les jointures sont plus
TES. ou moins serrées ; & les intervalles des plis gar-

* Séba, *Id.* nis de lames plus ou moins larges *.

pl. 112. N°.

23-27.

Museum

Richter, tab.

24. Litt. C.

N° 1.

G E N R E H U I T I É M E.

F O N G I P O R E S.

**FONGIPO-
RES.**

POLYPIERS de substance dure & pierreuse, comme les précédens. Ce qui les différencie est leur structure lamelleuse ou feuilletée, & plus ou moins semblable à un Champignon terrestre dont la partie inférieure seroit en-dessus. Les espèces en sont fort nombreuses ; les unes sont à lames dentelées, les autres à lames unies. Les Polypes habitent les interstices des lames.

93. Un très-beau Fongipore en bouquet ; des Indes Orientales, connu sous le nom d'*Oeillet de mer*. Les Oeillets dont ce pied est garni sont de forme irrégulière & plissée, à lames saillantes & pointues, & à petites dentelures *.

* Séba, pl.
109. N° 6.

94. Trois autres Fongipores en bouquet ; savoir, un à Oeillets de forme régulière & arrondie, garnis, tant dans le calice que le long

de la tige, de lames à grandes dentelures * ; un FONGIPO-
à Oeillers plus petits, & à dentelures de lames ^{R. S.}
peu sensibles * ; & un à fleurs, de même forme ^{* Séba, pl. 109. N°. 2.}
que celles de l'Art. précédent, mais plus peti- ^{* Séba, *ibid.* N°. 1.}
tes & très-semblables aux véritables Oeillers.

95. Trois autres Variétés ; sçavoir, une à
trois plis réguliers, comme les bords d'un cha-
peau ; une à huit plis, comme celle représentée
dans Séba *, mais de forme arrondie & plus ^{* *Ibid.* pl. 109. N°. 4.}
ramassée ; & une à un seul calice de forme ovale
& comprimée, qui tient à un long pédicule.
Cette dernière vient de Curaçao, les deux au-
tres sont des Indes.

96. Trois autres Oeillers de mer, des Indes,
dont un en bouquet de forme un peu sinueuse
& fort applatie ; un d. forme ovale & appla-
tie, à lames très-larges & dentelées, adhérant
à un gros fucus qui lui sert de pédicule *. Le ^{* Séba, pl. 110, N°. 6, lett. A.}
dernier approche du précédent, & tient à un
Caillou avec quelques Astroïtes *. ^{* *Ibid.* pl. 108. N°. 4.}

97. Trois Fongipores en bouquet, à bran-
ches comprimées, des Variétés déjà décrites,
l'un à grands Oeillers, l'autre à petits *, & l'au- ^{* Séba, pl. 116, N°. 4.}
tre de moyenne grandeur.

98. Neuf Variétés intéressantes ; sçavoir,
1°. des Caryophylloïdes en bouquet *. 2°. Six ^{* Rumphius herbar. amb. part. 6, tab. 87, N°. 3.}
Caryophylloïdes détachés, dont un lisse à calice ^{* *Ibid.* N°. 4.}
profond, un articulé, trois striés *, & un à ca-
lice, en partie fermé & en partie ouvert. Tous,

FONGIPO-
RES.

excepté celui-ci, adhérent à de petites branches de Corail rouge. 3°. Un Fongipore rare, de forme ovale comprimée, dont la circonférence est garnie de lames plus ou moins grandes & non dentelées, chaque interstice des grandes lames en contient trois plus petites & moins saillantes. 4°. Deux petits Boutons étouffés, qui sont l'analogie marin des Porpites. 5°. Deux Oeillets des espèces déjà décrites.

99. Six gros Oeillets, rapportés en forme de bouquet sur une tige, où ils sont placés d'une manière fort naturelle. Le pied de la tige est garni d'astroïtes & de glands de mer.

100. Un très-rare Fongipore, appelé le *Chou de mer*. Il est du plus beau blanc, à feuilles papiracées, frisées & dentelées, dont les deux surfaces sont couvertes de lames longitudinales. Ce morceau, qui est d'une beauté singulière & très-grand dans son espèce, porte cinq pouces de haut sur sept de large.

101. Un de même espèce, mais plus petit *.

102. *Idem*.

103. *Le grand Bonnet de Neptune, ou la Mitre Polonoise*, de forme arrondie & très-gracieuse. Sa partie convexe est terminée par un gros tubercule en façon de Bouton, d'où partent, en tout sens, des lames minces fort serrées, dont les dentelures très-saillantes for-

* Séba, pl.
108, N°. 3 &
5.

ment , de distance en distance , de petits Tubercules étoilés , qui le distinguent des autres espèces. Sa partie concave est garnie de stries

granuleuses & pointues *. Ce rare morceau a cinq pouces de haut sur huit de large.

104. Un autre de même espèce , mais plus petit , qui en diffère d'ailleurs en ce qu'il n'a point de bouton à son sommet.

105. Un beau Champignon de mer , de forme arrondie un peu conique , à lames minces , larges , légèrement dentelées , partant d'une fente profonde qui est au sommet de la partie convexe , & allant aboutir en droite ligne à la circonférence , où elles se replient pour remonter au sommet de la partie concave. Il est plus grand que celui que nous citons *.

106. Un autre de même espèce & à peu-près de même forme , mais un peu plus grand. Les lames dentelées y sont disposées d'une manière régulière , & forment , vers le sommet , quelques plis & replis semblables à la fraise de veau.

107. Deux champignons de moyenne grandeur , de forme moins convexe , mais d'ailleurs semblables à ceux des Art. 105 & 106. L'un des deux est de plus remarquable par huit petits Champignons naissants qui adhèrent à la partie concave.

108. Deux autres Champignons de même

FONCIPON-
RES.

* Rumphius
herbar. Amb.
t. 6. tab. 88.
N°. 3. Mém.
de l'Acad. des
Scans. 1700, p.
30, pl. 1.

* Séba, pl.
111. N. 1.

**FONGIPO-
RES.**

grandeur, dont un a sa partie concave enrichie de huit petits Champignons en forme d'œillets; l'autre ne diffère des précédens qu'en ce qu'il est de forme applatie.

109. Deux Champignons de forme oblongue, à partie supérieure convexe & inférieure applatie. L'un est à lames minces, droites & légèrement dentelées *; l'autre en diffère par ses lames sinueuses & entrecoupées qui lui donnent un œil chatoyant.

110. Un grand Fongipore de l'espèce des *Bonnets de Neptune*, de forme ovoïde allongée, très-convexe, à sommet traversé d'un filon peu profond, à lames dentelées, non continues, mais par boucles irrégulières, imitant assez la toison d'un mouton, & à bords festonnés, un peu comprimés vers le milieu *; il porte 16 pouces de long sur 5 & demi de haut, 5 dans sa plus grande largeur, & 3 dans l'étranglement du milieu.

111. Un autre Fongipore de forme oblongue, moins allongée & moins convexe, appelé la *grande limace*; ses lames sont, comme dans le précédent, interrompues dans leur direction; mais à écailles plus grandes, légèrement dentelées, & formant à la partie supérieure un filon assez profond *. Ce morceau porte un pied de long sur quatre pouces de large.

112. Un autre de même espèce & de forme très-allongée, ayant plus de 11 pouces de long sur 3 de large. FONGIPO-
RES.

113. Un Fongipore de forme ovoïde allongée, différent des précédens, en ce qu'il est couvert de lames écailleuses très-petites, environnées d'autres plus minces, & plus enfoncées, qui partent de différens centres. Il a 9 pouces de long sur 4 de large, & ressemble assez, quand il est sur sa base, à un chien accroupi sur ses quatre pattes, dont la queue seroit repliée en-dessous.


114. Un autre petit de même forme à lames minces, écailleuses, droites, fort ferrées les unes contre les autres; on voit sur le milieu du dos un sillon fait en pente, garni de lames radiées *. Ce joli champignon est connu sous le nom de *Taupe Marine* ou de *Chenille*. * Séba, pl.
111, N°. 6,
& pl. 112,
N°. 31.


115. Un autre de même espèce, mais courbé de façon qu'il ressemble parfaitement à une grosse chenille pliée en deux, dont la tête & la queue se rapprochent.

116. Un Fongipore, de forme oblongue & fort convexe, différent de tous ceux ci-dessus décrits, en ce qu'au lieu du sillon plus ou moins profond dont ils sont pourvus, celui-ci est garni de lames à grandes dentelu-

**FONGIPO-
RES.**

res. & parallèles qui s'étendent dans toute la longueur, & se prolongent jusqu'aux bords. Celles des côtés sont disposées comme dans l'es-
pèce de l'art. 105.





ORDRE SECOND.

POLYPIERS

DE SUBSTANCE MOLLE OU FLEXIBLE,

GENRE PREMIER.

FAUX CORAUX.

POLYPIERS qui sont en général d'une substance moins dure que les précédens, quoiqu'il s'en rencontre quelques espèces d'une dureté assez considérable. Nous avons cru devoir comprendre dans ce Genre toutes celles qui ne conviennent à aucuns des Genres ci-dessus décrits; de ce nombre sont les faux Coraux articulés, dont la substance alternativement dure & flexible paroît servir de passage du premier au second Ordre. Les Polypiers de ce Genre différent des vrais Coraux en ce

FAUX CO-
RAUX.

**FAUX Co-
RAUX.**

qu'ils sont plus cassants & d'une substance cornée ou moins serrée. Ils diffèrent des Madrépores, Millepores, &c. en ce qu'on n'y voit point de pores ni d'étoiles. Il y en a de beaucoup d'espèces qui sont toutes en forme d'Arbrisseau, mais qui diffèrent en grandeur, en couleur & en dureté. Les Polypes habitent la superficie des branches & du tronc.

117. Trois faux Coraux, dont un rare; en buisson, à branches fines, arrondies, articulées, blanches, & se divisant en petits rameaux qui partent plusieurs ensemble de la même articulation en forme d'étoiles, & font en s'entrelaçant une masse fort touffue. Les deux autres sont à petits rameaux arrondis, courts, non articulés, & adhèrent chacun à un petit coquillage du genre des *Sabots*, qui est aussi recouvert de la même substance blanchâtre *. Cette circonstance, jointe au défaut de pores, de cavités, & d'écorce celluleuse, pourroit faire regarder ce faux Corail comme une véritable concrétion, s'il n'avoit d'ailleurs une organisation aussi régulière que celle des autres Polypiers.

* Séba, pl.
108. N°. 8.

118. Trois variétés de faux Coraux de l'Isle de France, à branches fines, arrondies,

granuleuses , qui ne diffèrent que par leur couleur , elle est blanche dans l'un , rouge dans l'autre , & jonquille dans le troisième. Plus , deux faux Coraux blanchâtres , dont un à branches articulées , fourchues , granuleuses , & percées d'une petite cavité à l'extrémité ; & un à très-petites branches ramassées ensemble en forme de pelotte , de l'espèce des deux derniers de l'article précédent.

**FAUX Co-
RAUX.**

119. Cinq autres faux Coraux de même espèce , formant quatre variétés ; sçavoir , un blanc - sale tirant un peu sur le lilas , à branches applaties & tuberculeuses , dont les extrémités sont fourchues & comprimées ; un blanc-jaunâtre à branches arrondies , noueuses & fort serrées , dont les extrémités finissent en boutons , comme certaines Stalagmites ; un à branches nombreuses , fines , granuleuses , bifurchues , de couleur blanche ; & les deux autres à branches minces , arrondies , tuberculeuses , qui s'étendent en tout sens , & forment une masse orb.culaire *.

* Séba, *ibid.*
N°. 7.

120. Un très-bel arbrisseau de faux Corail blanc articulé , dont les digitations sont d'une substance pierreuse , gris blanchâtre , assez profondément striées , & dont les articulations sont presque lisses , petites , & d'une substance cornée , d'un brun noirâtre * ; il porte 13 pouces de haut sur 10 de large.

* Séba , pl.
110. N°. 1.
Gualtieri. in-
dex restar.
N°. 16.

**FAUX CO-
RAUX.**

121. Trois petits faux Coraux articulés : l'un approche de l'espèce précédente , mais il en diffère par les articulations qui sont beau-

* Seba , pl.
110. N°. 2.
Rumph. herb.
amb. rom. 6.
tab. 84 , litt.
c.

* Séba , pl.
104 , N°. 1.

coup plus grosses & plus larges * ; l'autre est le faux Corail rouge articulé * , & le troisième est une espèce particulière de couleur blanche , à branches fines , déliées , demi transparentes , dont les articulations , au lieu d'être enfoncées , sont plus saillantes que le reste ; ce qui peut le faire nommer *faux Corail noueux ou géniculé*. Il se termine par un pédicule applati , & a beaucoup de ressemblance avec

* Séba , pl.
106 , N°. 4.

celui que nous citons *.



S E C O N D G E N R E.

KÉRATOPHITES OU LITHOPHITES.

POLYPIERS branchus comme les KÉRATOPHITES OU LITHOPHITES. précédens, mais différens en ce qu'ils sont d'une substance moins dure, plus flexible, & totalement cornée. Leurs troncs & leurs branches sont ordinairement revêtus d'une espèce d'écorce celluleuse & friable qui varie beaucoup, soit pour la forme & l'épaisseur, soit pour la couleur. C'est dans les trous de cette écorce que logent les Polypes. Les Kératophites, comme les Coraux, se trouvent attachés à des rochers, à des coquilles ou à d'autres corps durs, auxquels ils adhèrent par le moyen d'un pédicule assez large qui leur sert de base.

122. Un très-grand Kératophite des Indes, connu sous le nom impropre de *Corail Noir*. Il est légèrement strié, & ses principales branches se divisent en un très-grand nombre de petits rameaux flexibles, dont les extrémités sont très-fines, d'un roux noirâtre, & demi-

KÉRATO-
PHITES
OU LITHO-
PHITES.

* Seba, pl.
104. N°. 2.

transparentes *. Il adhère par un gros & large
pédicule à un Madrépore de l'espèce des Méan-
drites qui lui sert de base. Ce morceau a trois
pieds & demi de hauteur.

123. Un Kératophite ou Corail noir de
Malthe, lequel ne diffère du précédent que
par ses branches, dont les extrémités, quoi-
que très-déliées, ne sont nullement transpa-
rentes; il a près de deux pieds de hauteur.

123.(bis). Cinq autres variétés de Corail noir :
l'une est le vrai Corail noir, à rameaux peu
nombreux, arrondis, d'une grosseur presque
égale dans toute leur longueur, extrêmement
lisses & luisans; l'autre est en forme d'éven-
tail à rameaux aplatis fort tortueux, légè-
ment striés, & d'un noir moins foncé. Les
trois autres morceaux sont dépourvus de bran-
ches, & ne consistent qu'en une tige plus ou
moins grosse & tortueuse. Dans l'un, cette tige
est de la grosseur du petit doigt, peu courbée,
& parsemée de petits points rudes au toucher;
l'autre est plus tortueuse, de la grosseur d'une
plume à écrire, & comme chagrinée à la
surface; l'autre enfin est encore plus fine, &
s'étend en spirale comme un tire-bourre. Elle
est revêtue d'une écorce blanchâtre & épi-
neuse, chargée de petites escharres * & de rété-
pores-dentellés.

* Seba, pl.
114. N°. 3.

124. Deux autres Kératophites, dont un
brun

brun foncé à branches droites , un peu applaties , d'où partent , à distances égales & dans une direction presque horifontale , plusieurs petits jets granuleux & pointus , qui lui ont fait donner le nom de *Lithophite plume de Mer* * , il a plus de deux pieds de hauteur ; l'autre brun verdâtre , est à tige ronde , droite , jettant de tous côtés quantité de rameaux courts , roides , déliés , épineux. Il est connu sous le nom de *Cyprès Marin* * , & a beaucoup de ressemblance avec les branches d'asperges.

KÉRATO-
PHITES OU
LITHOPHI-
TES.

* Séba pl.
114, n°. 3.

* Séba pl.
106, n°. 1.

125. Un Kératophite arbrisseau , à branches applaties , revêtues en partie de leur écorce celluleuse qui est d'un beau rouge de Corail. Les parties qui sont dépourvues de cette écorce , ont la couleur & la transparence de l'écaille. Il porte deux pieds de haut.

126. Un Kératophite de la Méditerranée , à branches principales chargées de petits rameaux capillaires , revêtues d'une écorce tarteuse d'un rouge pâle , dont les cellules sont très-petites & peu sensibles *. La substance cor- née de ce Lithophite est d'un beau noir : il adhère par sa base à une grande pierre fort pesante , & porte deux pieds de haut sur autant de large.

* Marfigly ;
hist. phys. de
la mer, pl. 12,
fig. 83.

127. Un autre des Indes à branches droites garnies dans toute leur longueur de jets nom-

**KÉRATO-
PHITES OU
LITHOPHYTES.**

breux & un peu recourbés ; la ressemblance singulière qu'il a avec le *Romarin* lui en a fait donner le nom. Son écorce est d'un gris rougeâtre. Il adhère par sa base à un Astroïte , & porte vingt pouces de haut sur seize de large.

128. Un autre d'Amérique à branches moins droites , & chargées de jets beaucoup plus longs , qui , par leur flexibilité , forment une espèce de Panache. La couleur de l'écorce est d'un gris jaunâtre ; il a trois pieds & demi de haut sur vingt pouces de large.

129. Un de même hauteur , mais un peu moins large.

130. Un très-beau Kératophite à tige garnie de branches alternes , nombreuses , flexibles , étendues en éventail , revêtues d'une écorce blanchâtre , dont les cellules sont fort saillantes & disposées autour de la tige , & des rejettons en forme de petites grappes à égale distance les unes des autres *. Ce morceau qui a deux pieds de haut sur dix-sept pouces de large , est encore remarquable par une vingtaine de petites étoiles de mer , de l'espèce des *Scolopendroides* qui y sont adhérentes.

* Martigny.
Hist. de la Mer.
pl. 29. fig. 24.

131. Un Kératophite de Malthe, brun verdâtre , à branches principales , garnies aux extrémités de petits rameaux capillaires très-flexibles ; il est de plus recommandable par deux autres de l'espèce connue sous le nom d'*Hiron*.

MOUX OU FLEXIBLES. § 1

delle, qui y sont adhérentes. Sa hauteur est de deux pieds sur autant de large.

KÉRATO-
PHITES OU
LITHOPHI-
TES.

132. Un autre de Cadix, à tige se subdivisant en un petit nombre de jets droits & extrêmement longs, revêtus d'une écorce rougeâtre; la substance intérieure de ce Lithophite est verdâtre. Il a trois pieds & demi de hauteur, & adhère à un rocher chargé de vermiculaires.

133. Trois jolis Kératophites arbrisseaux peu communs; sçavoir, deux à substance intérieure opaque & noire dans les parties les plus grosses, transparente & couleur de corne aux extrémités des branches qui sont applaties; ils diffèrent entre eux par l'écorce celluleuse dont ils sont revêtus. Elle est granuleuse & violette dans l'un, jaune ponctuée de pourpre dans l'autre; & un couleur de lilas, de l'espèce de celui de l'article 127, adhérent par sa base à une petite Huitre.

134. Quatre Kératophites; sçavoir, un en éventail, à branches principales se subdivisant en plusieurs rameaux qui montent droit en haut*. L'écorce tartareuse dont il est revêtu est grisâtre sur certaines branches, rouge de plomb sur d'autres, épaisse, fistuleuse & verdâtre en quelques endroits. Un à branches tortueuses, couvertes d'une écorce noueuse, rouge pâle*. Un à écorce brune plus épaisse & à tubercules plus saillans; & un de l'espèce de celui de

* Séba, pl.
105, n°. 1
lett. a.

* Séba, pl.
106, n°. 3.

KÉRATO-
PHITES ou
LITHOPHI-
TES.

l'article 126, dont les branches sont chargées d'un groupe de vermiculaires, minces & déliés comme des fils.

* Séba, pl.
nos, n°. 1,
lett. B.

135. Dix petits Kératophites ; sçavoir , un à écorce grisâtre , épaisse , un peu applatie , hérissée de tubules saillantes & friables. Un à branches chargées de rameaux longs , étroits , aplatis , blanchâtres , & semblables aux feuilles de *Lavande*. Un couleur de lilas de l'espece du dernier de l'article 133. Un comme le premier de l'article précédent. Un en forme d'éventail & de couleur pourpre , à rameaux plus nombreux , dont plusieurs se réunissent en s'abouchant *. Un à écorce jonquille , hérissée de tubules. Un à écorce noueuse d'un rouge pâle , de l'espece du second de l'article précédent. Et trois à branches très-fines , des variétés déjà décrites.

136. Un Kératophite de l'espece décrite art. 126, adhérent par sa base à une grosse bouteille de terre , sur laquelle il s'est formé.

137. Un Kératophite *digité* de la grande espece , à branches de la grosseur du doigt , fourchues , couvertes d'une ecorce grisâtre fort épaisse , parsemée de tubules peu saillantes. Ce morceau qui vient d'Amérique , porte 17 pouces de haut sur autant de large.

138. Un Kératophite *digité* d'Amérique , à branches moins grosses , dont les principales se

partagent en deux plus petites, chacune desquelles se divise encore en deux, & celles-ci de même. Il est revêtu d'une écorce épaisse, rouge & parsemée de pores très-sensibles comme certaines espèces de Madrépores. Il adhère à son rocher avec un Astroïte, & porte près de deux pieds de hauteur.

139. Un Kératophite arbrisseau d'Amérique, revêtu d'une écorce pierreuse, grisâtre, ridée, annuleuse; ses branches sont garnies de deux rangs de petits rejettons, courts & disposés en forme d'arrête, qui sont probablement, ainsi que l'écorce, l'ouvrage de Polypes d'un autre genre. Ce morceau porte deux pieds de hauteur.

140. Deux autres Kératophites d'Amérique, dont un en forme d'éventail, à branches très-nombreuses, grosses & peu flexibles, revêtues d'une écorce grisâtre, épaisse & parsemée de petits trous; l'autre est en arbrisseau, & a quelques-unes de ses branches couvertes d'une écorce tartareuse, épaisse & friable, d'un rouge pourpre, ayant tous les caractères de ce genre de Polypiers: mais les autres branches ont servi de retraite à des animaux d'un autre genre qui s'y sont attachés, & qui les ont recouvertes, les uns de l'incrustation grisâtre & annuleuse de l'article précédent, les autres d'une incrustation pierreuse du genre des Millepores; cette dernière substance recouvre aussi plusieurs glands.

KÉRA. O-
PHITES OU
LITHOPHI-
TES.

de mer qui s'étoient fixés sur ce Lithophite.
Ces divers accidens le rendent extrêmement
curieux.

* Mém. de
l'Académ. des
Sc. an. 1780,
p. 34 pl. 2.

* Ibid. pl. 3.

141. Six Kératophites d'Amérique en forme
d'éventail, dont trois revêtus d'une écorce
brune, mais avec ces différences que dans l'un
cette écorce est parsemée de petites tubules qui
ne d'bordent point la superficie; dans l'autre
ces tubules sont saillantes & très-nombreuses *;
elles sont aussi saillantes, mais plus grosses &
plus éparées dans le troisième. Un à écorce gris-
cendré, aplatie, & à pores peu saillans. Un à
écorce de même couleur, mais arrondie & par-
semée de pores assez larges. * Et un de l'espèce
de celui de l'article 139.

142. Deux grands Kératophites d'Améri-
que, dont un *digité* de l'espèce de celui de
l'art. 138, adhérent à un rocher formé de con-
crétions marines qui lui sert de support. L'autre
est de l'espèce du quatrième de l'article pré-
cédent.

* Marfigly,
pl. 19, fig 86.

143. Un magnifique Panache de mer d'Amé-
rique, se partageant dès la racine en plusieurs
rameaux anguleux, chargés d'un grand nom-
bre d'autres, dont les extrémités s'entrelacent
en forme de rets *. Il est couvert d'une écorce
couleur de lilas, ainsi que les petits rejet-
tons qui y adhèrent, & porte trois pieds de
haut sur autant de large.

MOUX OU FLEXIBLES. 55

144. Un Kératophite à branches reticulées, qui ne diffère du précédent que par son écorce qui est de couleur jaune. Il a quarante pouces de haut sur plus de deux pieds de large.

KÉRATO-
PHITES OU
LITHOPHITES
TAA.

145. Deux autres Kératophites à panache, dont un est totalement incrusté d'une matière grisâtre & pierreuse, de l'espèce de celle de l'article 139, ce qui le rend fort pèsant; l'autre est de l'espèce de l'article précédent, & adhère à une concrétion pierreuse.

TROISIEME ET QUATRIEME GENRE.

CORALLINES ET ESCARES MOLLES.

POLYPIERS, d'une substance ou cornée ou crustacée, ou pierreuse, qui ont la forme de plantes, & qui sont composés de plusieurs branches minces, subdivisées en fines ramifications, comme quelques espèces de mousses, ce qui les avoit fait ranger dans cette classe par les Botanistes, avant les découvertes de M. Ellis. Cet habile Observateur les distingue en *vésiculeuses*, en *tubuleuses*, en *celluleuses* & en *articulées* *. Comme son ouvrage est entre les mains de tout le monde, nous ne dirons rien ici des caractères spécifiques qui différencient ces Polypiers, ni des animaux qui les habitent.

* Voyez l'Es.
de Phil. nat.
des Corallines.
&c. la Haye
1756, in-4°.
fig.

146. Deux belles Corallines vésiculeuses ; l'une est la *Queue d'Ecureuil* * adhérente à un *manche de couteau* bivalve : trois des principaux jets de cette Coralline, ont plus d'un pied de hauteur. L'autre est le *Cheveu de mer* *

* Ellis, pl.
2, n° 4, let.
c.

* Ellis, pl.
3, n° 6, let.
h.

adhérent à une moule aussi bivalve. Plus le même sur un gros fucus.

CORALLINES.

147. Cinq Corallines vésiculeuses ; savoir, le *Tamaris de mer*¹, le *Sapin de mer*², adhérent à une coquille, l'*Antenne d'Ecrevisse*³, la *Queue d'Ecureuil* sur une moitié de coquille, & le *Cheveu de mer* sur une moule.

¹ Ellis, pl. 4
² Ibid. pl. 1.
³ Ibid. pl. 2.
⁴ Ibid. pl. 9, n°. 14
let. a.

148. Douze jolies Corallines, dont sept vésiculeuses qui sont l'*Antenne d'Ecrevisse* ou *barbe de mer*, des deux variétés décrites dans Ellis⁴.

⁴ Ibid. pl. 9, n°. 14
let. a. & b.

Le *Cheveu de mer*, adhérent à un fucus. Le *Cyprès de mer*⁵. La *Coralline à lentes*⁶. La *Co-*

⁵ Ibid. pl. 3, n°. 5, let. a.

ralline à cosses environnant un fucus⁷, & la

⁶ Ibid. pl. 15, n°. 24, b.

Queue d'Ecureuil. Deux Corallines tubuleuses ;

⁷ Ibid. pl. 7, n°. 12, b.

savoir une à petites ramifications⁸ ; & une du

⁸ Ellis, pl. 16, fig. a.

Cap de Bonne Espérance, ridée comme la

Trachée-artère formant un faisceau de petits

⁹ Ellis Ibid. fig. b.

tubes paralleles & fort ferrés⁹. Trois Corallines

¹⁰ Ibid. pl. 20, n°. 3, b.

celluleuses adhérentes à des fucus ; savoir, la

¹¹ Ibid. pl. 20, n°. 5, d.

*Rampante*¹⁰, la *Coralline à cils*¹¹, & la *Co-*

¹² Ibid. pl. 21, n°. 6, a.

*ralline à touffe couleur d'ivoire*¹² ; plus trois

¹³ Ibid. l. 28, fig. a.

Escars molles, qui sont l'*Escare à feuilles étro-*

¹⁴ Ibid. pl. 29, n°. 2, a.

*ites*¹³, celle à *feuilles larges*¹⁴, & l'*Escare mille-*

¹⁵ Ellis pl. 31, fig. b.

pore spongieuse & irrégulière, dont les ouver-

¹⁶ Ibid. pl. 23, n°. 1, a.

tures sont garnies de poils¹⁵.

¹⁷ Ibid. pl. 24, n°. 2, a.

149. Douze Corallines articulées, savoir,

la *Bugle coralline*, ou *Consoude moyenne* à tu-

bes déliés¹⁶ : la *bugle coralline* à tubes plus épais :

la *commune*, ou blanche des Apothicaires ;¹⁷ la

CORALLINES. *commune* à extrémités terminées en bouton : la Coralline à têtes en forme de lance & à articu-

¹ *Ibid.* pl. 24, lations plates ¹ : la Coralline rouge semblable ² *Ibid.* fig. e. à des cheveux ² : la blanche à articulations dé-

³ *Ibid.* fig. d. liées ³ : la Coralline à branches arrondies, dont les extrémités s'applatissent & se contournent

à la dernière articulation : la Coralline à bran-

ches applaties, rameuses & mobiles de la

grande espèce : la Coralline à feuilles très-ap-

platies, rondes au sommet : la blanche à

⁴ *Ibid.* pl. 45, fig. b. feuilles articulées de la Jamaïque ⁴, & une très-rare à longue tige, ornée à l'un des

bouts d'une houe de filamens articulés, très-

déliés, semblables à un pinceau. C'est le *vrai*

pinceau de mer.

150. Les deux espèces d'*Acétabule*, décrites

dans Tournefort & Bauhin. L'un est le grand

Acétabule de mer, formant un groupe de six

pouces de haut sur autant de large, adhérent

⁵ Tournefort, pl. 338. à une pierre ⁵. L'autre est de la petite espèce

& adhère à une valve de coquille du genre des

cœurs. Il n'est pas bien décidé que cette pro-

duction singulière soit un Polypier. M. Donati

donne l'autorité est d'un grand poids en cette

⁶ Donati, mer adriatique, pl. 3, fig. 1. matière, la range dans les plantes marines ⁶.



GENRE CINQUIEME.**EPONGES.**

P**OLYPIERS** d'une substance molle **EPONGES** & élastique , composés de plusieurs fibres qui s'entrelaçant les unes dans les autres , s'unissent & forment une espece de rézeau percé de tubes plus ou moins larges & profonds ; ces tubes paroissent remplis d'une substance molle & blanchâtre , & il résulte de leurs diverses inflexions , un grand nombre de variétés dans les éponges. Les cavités dont elles sont remplies , sont probablement l'ouvrage & la demeure d'une certaine classe d'animalcules encore peu connus.

151. Deux très-grandes Eponges fines , de l'espece commune , l'une en forme de manchon & l'autre en chapeau rabattu , nommées le *Manchon* & le *Chapeau de Neptune*.

152. Quatre autres de la même espece , remarquables par leurs formes singulieres , nom-

SPONGES.

mées *l'Eventail*, *le Turban*, *la Calotte*, & *le Mortier*.

153. Onze Eponges fines de formes très-variées, de l'espèce des précédentes, & *l'Eponge des Frotteurs*.

154. Deux Eponges d'Amérique, dont une de forme longue comprimée, à côtés garnis de petits trous, à partie supérieure percée d'une suite de trous larges & profonds, rangés sur une même ligne, qui lui ont fait donner le nom de *Flutte de Pan*, elle a seize pouces de de long; l'autre est rameuse & digitée, à feuilles applaties, & adhère à une belle moule Magellanique de l'espèce chatoyante.

155. Deux Eponges rameuses, à branches nombreuses de substance friable, qui dans l'une sont étendues en éventail, comme certains lithophites, & ramassées en forme de gerbe dans l'autre. La première porte vingt-six pouces de haut, & la seconde vingt-deux.

156. Quatre Eponges rameuses, dont trois de substance molle & flexible, plus ou moins

* Séba, pl. fines & serrées*, & une de l'espèce décrite dans
97, n°. 5, 6 l'article précédent.
& 7.

157. Une Eponge en forme de colonne, à fibres rudes & serrées, à circonférence parsemée de grandes cavités irrégulières, & à sommet percé d'une large ouverture cylindrique, qui pénètre jusqu'à la base. Elle est de couleur rousse.

158. Trois Eponges en colonnes ; sçavoir , Eponges,
 une à tissu fin peu serré , uniforme dans toute sa
 longueur, sans autre grande cavité que celle qui
 la traverse d'un bout à l'autre * ; une de la * Séba , pl.
95, n°. 1.
 grosseur du doigt , un peu aplatie , qui au
 lieu d'être percée dans sa longueur d'une seule
 cavité comme la précédente , l'est trans-
 versalement de deux rangées de trous opposés,
 qui se suivent à distances égales ; elle paroît
 être une variété de la *flutte de Pan* ; la troisième
 est de l'espèce de celle de l'article précédent ;
 mais elle a deux cylindres joints par les côtés.

159. Une autre Eponge en colonne pyra-
 midale , de couleur brune , nommée *le Cierge* ;
 elle diffère des précédentes , en ce que ses fibres
 sont plus serrées , & qu'elle est comme crevas-
 sée dans tout son pourtour. Ce beau morceau
 a 26 pouces de haut.

160. Une autre de même forme , mais à tissu
 encore plus serré & plus compacte , brun-noi-
 râtre & à superficie hérissée de tubercules. Elle
 est sur-tout remarquable par sa hauteur qui est
 de 41 pouces.

161. Une Eponge de même espèce , mais
 différente pour la forme. C'est un groupe de
 cinq gros tuyaux , placés l'un près de l'autre ,
 comme des tuyaux d'orgue ; il a 22 pouces
 de haut*.

162. Trois Eponges en colonne des variétés

* Séba , pl.
95, n°. 7.

Eponges.

déjà décrites. L'une est à deux tuyaux, de même tissu que la première de l'article 158; l'autre à quatre tuyaux, de même espèce que celle de l'article 160. La troisième réunit sur un seul tube le tissu compacte & ferré, & le tissu mince & lâche de ces deux espèces.

163. Une grande Eponge, nommée le *Bonnet de Neptune*, sa partie convexe est tuberculeuse & à larges canelures, & sa partie concave tapissée de fibres longitudinales qui vont du sommet à la circonférence, d'une manière fort régulière.

164. Trois jolies Eponges de formes singulières. L'une aplatie, d'un tissu fort ferré garni de pointes, ressemble exactement à une *Mître d'Evêque*. L'autre d'un tissu plus lâche, aussi hérissé de pointes, n'imité pas moins bien une *Crosse*; la troisième, d'un tissu semblable à la mie de pain, est de forme ovale comprimée, & s'appelle le *Gobelet de Neptune*.

165. Deux Eponges de même espèce que la première de l'article précédent, dont une semblable aux feuilles de l'*Opuntia*, adhérente à un Astroïte qui lui sert de base; l'autre composée de quatre tubes un peu aplatis, d'un tissu peu ferré, & parsemés de tubules arrondies.

166. Une autre de même espèce, mais digitée, sa forme lui peut faire donner le nom de

Sand de Neptune; elle adhère par sa base à un faux Corail & à un petit *Kératophite*.

EPONGES.

167. Deux Eponges, dont une rare en forme de cornet, appelée *Trompette de mer*. Le tissu en est mince. & fragile, & remarquable par quantité de petits trous cylindriques, dont la cavité & les bords extérieurs sont revêtus d'une croute pierreuse, striée & étoilée, qui en bouche quelquefois l'ouverture. L'autre Eponge est à peu près de même forme, mais de texture plus solide, & privée des cellules pierreuses qu'on remarque en la précédente.

168. Sept petites Eponges, dont une à feuilles minces & découpées, en forme d'*Agaric*; une rameuse à tubes noueux & tuberculeux, d'un tissu très-fin & très-serré; une en forme d'entonnoir un peu comprimé; une en crosse; une en bouquet, imitant la fleur de Jacinthe; & deux à tubes cylindriques, des espèces déjà décrites.

169. Deux Eponges rares, l'une appelée la *Morille*, à cause de la ressemblance parfaite avec ce végétal. Elle adhère à un faux Corail. L'autre de forme orbiculaire, peut être nommée l'*Eponge oursin*. Les pointes dont elle est hérissée, & qui la traversent de part en part, sont liées les unes aux autres par des fils épars, minces & déliés comme de la toile d'araignée.

170. Trois Eponges, dont une peu com-

EPONGES.

* Mém. du
Chev. Turgot
sur l'hist. nat.
pl. 24, let. E.

mune , en forme de buisson à petites feuilles nombreuses découpées & frisées , portées sur un rocher qui leur sert de base , & deux de l'espèce de celles de l'article précédent , dont une est *la Morille* à feuilles plus petites , plus nombreuses & plus comprimées *. L'autre a les pointes entièrement engagées dans ces fibres éparfes , que nous avons dit ressembler à la toile d'araignée.

171. Une très-rare & magnifique Eponge rameuse , de couleur brune-obscur , dont les branches rondes vers la tige , s'élargissent & s'applatissent en s'élevant , & prennent la figure de *cornes de Daim* , elles sont entièrement couvertes de petites feuilles drues , plissées & comprimées , d'un tissu ferme , serré , peu flexible. Ses branches les plus larges sont reticulées à peu près comme le *Lithophite éventail*. Elle porte vingt-un pouces de haut sur un pied de large.

172. Neuf Eponges de différentes espèces ; sçavoir , une Eponge agaric , à feuilles blanches , nombreuses , frisées , comprimées , percées çà & là de cellules arrondies & tuberculeuses en forme de verrues , dont la cavité intérieure est incrustée d'une substance friable & crétacée. Trois semblables à la mie de pain , de substance friable & comme vermoulue ; l'une de forme aplatie , comme un morceau de liége ,

lège, les deux autres de forme irrégulière. **EPONGES.**
 Une globuleuse, percée de larges cavités cylindriques & irrégulières, rangées parallèlement comme dans les *Astroïtes*. Deux minces & plates, dont le tissu roide, quoique lâche & peu ferré, forme des cellules à réseau, fort nombreuses & jointes les unes aux autres, comme celles des mouches à miel. Une à rameaux arrondis, entrelacés les uns dans les autres, comme un groupe de tuyaux vermiculaires. Il est d'autant plus aisé d'en faire la comparaison, qu'on voit plusieurs de ces derniers qui y adhèrent; & une mince & plate, plissée comme une fraise de veau.

173. Seize petites Eponges de formes très-variées. Sçavoir, deux digitées, l'une grise & l'autre brune, à rameaux creux & cylindriques, percés de trous plus ou moins larges. Une rameuse, grise, qui paroît être une variété de celle décrite article 171. Six variétés d'Eponges rameuses, à branches aplatties, l'une à feuilles larges, velues, profondément découpées; l'autre à feuilles étroites & allongées; l'autre à feuilles frisées; l'autre à petites branches rondes aplatties & bifourchues; l'autre à feuilles d'Agaric, repliées les unes sur les autres; & l'autre à feuilles terminées en bouton tubuleux. Une à branches arrondies*. Une sembla-

* Séba, pl.
95, n°. 5.

Éponges. ble, dont les extrémités s'applatissent en forme de main. Une aplattie comme la feuille de l'*Opuntia*. Une à fibres droites & isolées. Une cannelée ; & deux globuleuses.

GENRE SIXIÈME.

ALCYONS.

Alcyons. **E**SPÈCES de Polypiers qui, suivant M. Ellis, paroissent principalement destinés à servir de nids & de matrices à des animaux de mer. Les Alcyons varient beaucoup dans leur forme & dans leur substance ; celle-ci est spongieuse dans quelques espèces & charnue dans d'autres. Ils ont aussi différentes fortes d'enveloppes, les uns ont une peau graveleuse, elle est calleuse, coriace ou friable dans les autres.

174. *Le grand Guepier de mer.* Cet Alcyon en forme de ruche, est d'une substance dure & cartonneuse, de couleur rougeâtre, percée çà & là d'un grand nombre de petits trous. Au sommet est une large ouverture en cône

MOUX OU FLEXIBLES. 67

renversé, qui laisse voir les compartimens cellululeux dont l'intérieur est garni. Ce morceau ^{ALCYONS.} curieux a dix pouces de haut sur huit de large.

175. Huit Alcyons ; savoir, un en forme de *Poire* de substance lisse & friable, d'un rouge de brique *. Son extrémité est percée d'une cavité profonde & conique, qui laisse appercevoir les cellules intérieures. Un de même espèce, de couleur grise, adhérant à un groupe d'autres Alcyons en forme de *Figue*, revêtus d'une écorce rude & épineuse, & troués au sommet. Un de l'espèce du premier de cet article, ressemblant à des figues jointes par les côtés, & se terminant en une seule queue. Un de forme globuleuse, d'où partent en tous sens des tubes creux & spongieux, & quatre de forme plus ou moins ronde, à tissu spongieux, celluleux & peu flexible ; parmi ces derniers, trois adhèrent à des corallines & à des fucus.

* Marfigly ;
hist. de la mer,
pl. 16, fig. 79.

176. Trois Alcyons branchus peu communs, en forme de *cornes de Daim*. La substance de l'un est spongieuse, friable, percée de distance en distance de trous arrondis qui laissent voir les cellules intérieures ; celle de l'autre est coriace, dure & semée de cavités peu profondes. Dans le troisième, elle est membraneuse, celluleuse & épineuse.

177. Quatre Alcyons de l'espèce du premier de l'article précédent ; dont un singulièrement

~~contourné.~~ Deux Agarics , de substance
 ALCYONS. spongieuse & friable , semée de petites cavités
 intérieurement celluleuses ; & une autre va-
 riété d'Agaric , revêtue d'une écorce carton-
 neuse , percée en sept à huit endroits de trous
 comme les précédens , mais beaucoup plus
 larges.

178. Deux Alcyons , l'un desquels est une
 grosse masse fongueuse & tuberculeuse en for-
 me d'Agaric * , dont l'écorce est de même con-
 sistance que celle du dernier de l'article précé-
 dent ; l'autre est en forme de coupe ovale , à
 bords un peu comprimés , de substance dure ,
 coriace , ridée & de couleur brune.

179. Trois jolis Alcyons de substance car-
 tonneuse ; sçavoir , un à feuilles larges & fri-
 sées , dont les plus grands rameaux tiennent
 ensemble à l'aide d'un tissu mince & membra-
 neux ; elles sont flexibles , un peu élastiques ,
 * Séba pl. 96
 n°. 4. & semblables à des feuilles desséchées *. Un à
 95. n°. 8. feuilles plus étroites , épineuses & semblables
 à celles du chardon , ce qui l'a fait nommer
Chardon de mer. Le troisième est une feuille
 large & spongieuse , qui recouvre totalement
 les branches d'un petit fucus , excepté les ex-
 trémités qui sortent en façon de frange.

180. Quatre Alcyons différens ; sçavoir ,
 un rare des Indes , à branches rondes en forme
 de corail , de substance assez dure , spongieuse ,

friable, non élastique. Un d'Amérique, dont la substance est une espèce de peau calleuse & savonneuse, couverte de tubercules en forme de verrues trouées dans le milieu, laquelle enveloppe une concrétion de mer. Le troisième est une masse assez informe, roide, membraneuse, celluleuse & piquante, de couleur brune tirant sur le noir *. Et un qui approche assez du précédent, mais d'une substance plus spongieuse & néanmoins plus compacte.

ALCYONS.

* Séba, *ibid*
pl. 95, n°. 3.

181. Treize petits Alcyons, dont un en masse arrondie, se partageant en plusieurs petites tiges velues & pointues, de substance friable & spongieuse *. Un en forme de vessie de loup; un dans la cavité duquel est logé *Bernard l'Hermite*; un en forme de petit chapeau; les autres sont des espèces déjà décrites.


* *Imperati*
lib. 27. Cap. 8
fig. 6.


182. Huit espèces différentes d'Ovaires ou Matrices de coquillages, dont quelques-unes portent le nom vulgaire de *Savonettes de mer*. Sçavoir, 1°. une d'Amérique, composée de petites vessies jaunes, rondes, applaties, jointes ensemble en une de masse irrégulière, & adhérentes à une branche de Madrepore; ce sont les matrices des Pourpres communes. 2°. Une de même espèce venant de nos mers; elle est en masse arrondie *. 3°. Une à vessies en forme d'entonnoir, dont les bords sont festonnés; ce sont des matrices de Buc-

* Ellis Corat
pl. 32. fig. b.

ALCYONS. cins de la Jamaïque. 4°. Des matrices de buccins de Virginie *. 5°. Autres en forme de petits tubes droits, dont le sommet est rouge de corail, ils adhèrent à un buccin. 6°. Deux à vessies noires triangulaires & à tête aplatie. Et trois autres variétés de matrices, des Indes orientales.

* Ellis, pl.
33. fig. 2. &
Lister, pl. 878
& 879.





SECONDE PARTIE.

COQUILLES OU TESTACÉES.

AVANT d'entrer dans l'énumération des Coquilles que nous possédons, nous croyons devoir dire un mot de l'ordre que nous suivrons dans leur distribution, & donner quelques notices préliminaires & succinctes qui puissent rendre ce Catalogue utile, par l'ordre que nous tâcherons d'y observer.

Nous avons présenté dans la première Partie les habitations pierreuses * ou ligneuses des plus petits Animaux connus dont les Mers soient peuplées; nous avons compris dans la même Classe les productions d'Animaux encore inconnus, telles que les Eponges, &c. & enfin celles qui paroissent destinées à servir de nid & de matrices à certains Coquillages de Mer : ce qui

COQUILLES

* Les Poly-
piers.

COQUILLES. nous mène, par une gradation presque insensible, à traiter des Coquillages mêmes : ce sera le sujet de cette seconde Partie.

On distingue primitivement trois sortes de Coquilles, celles de Mer, celles d'Eau-douce, & celles de Terre. Nous en ferons trois Sections; dans la première nous rangerons les *Coquilles Marines*, dans la seconde les *Fluviatiles*, & les *Terrestres* dans la troisième.

Les Coquilles Marines se trouveront ici divisées, à l'exemple de la plupart des Auteurs qui en ont traité, en trois Classes :

Les Univalves.

Les Bivalves.

Les Mutivalves.


Nous sous-diviserons encore, conformément à la méthode la plus suivie, chaque classe en un certain nombre de familles, chaque famille en gen-

res, chaque genre en espèces, & celles-ci même en variétés.

COQUILLES

Mais il est bon de prévenir que, ne s'agissant ici que de Coquilles où ne se trouvent plus les Animaux auxquels elles ont été propres; ces divisions ne pourront être les mêmes qu'elles auroient été, si elles avoient dû se rapporter aux Coquillages entiers, comprenant à la fois l'Animal & la Coquille, telles qu'on en trouve de très-heureuses & de très-justes dans l'histoire des Coquillages du Sénégal, par M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences.

On a cru d'ailleurs ne devoir point négliger de joindre aux descriptions de chaque espèce ou variété de Coquilles, les noms tirés presque toujours de quelque ressemblance frappante, & sous lesquels elles sont le plus connues, fussent-ils même du nombre de ceux dits vulgairement *de guerre*, ou qui ne sont en usage que chez quelques Amateurs ou chez les Marchands.

 On a de plus placé dans quelques **COQUILLES.** familles, à titre de Coquilles improprement dites, des fourreaux ou habitations d'Animaux, formées d'un grand nombre de fragmens de diverses Coquilles, joints à des brins de bois, à de gros sable, &c. sur-tout lorsque ces Coquilles se sont trouvées à peu-près semblables pour la forme, à celles de ces familles.

Quant aux Coquilles Fluviales & Terrestres, comme nous ne connoissons des premières que de deux sortes générales, les *Univalves* & les *Bivalves*; & des secondes que d'une sorte seulement, sçavoir les *Univalves*; & que d'ailleurs les familles en sont analogues à celles des précédentes, & en même-tems moins nombreuses : nous ne décrirons la collection, assez variée cependant, que nous avons des unes & des autres, que par forme d'autant d'appendices, qui feront la seconde & la troisième Section.



SECTION PREMIERE.

COQUILLES DE MER.



CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES.

Nous rangerons dans cette Classe toutes les Coquilles où l'on ne remarque pour l'ordinaire qu'une seule pièce. Nous disons *pour l'ordinaire*, parce que plusieurs de ces Coquilles en ont deux lorsqu'elles sont habitées par l'Animal : mais il n'y en a qu'une qui retienne proprement le nom de *Coquille*, l'autre est connue sous le nom d'*Opercule*.

UNIVALVES.

Ces Opercules se trouvent rarement dans les Cabinets avec les Coquilles auxquelles ils appartiennent, & les familles & genres de ces Coquilles n'étant pas même assez bien déterminés par opposition aux autres, nous n'avons point jugé devoir, comme ont fait quelques Auteurs, très estimables d'ail-

leurs , tirer la division générale des Univalves , ou même certaines de leurs divisions ultérieures, des caractères de n'être point, ou d'être en effet operculés..

Nous avons donc préféré de puiser ces diverses divisions dans la forme générale des Coquilles, & ce sera de caractères moins apparens que dériveront les différences des genres, des espèces & des variétés. Les Coquilles Univalves peuvent être partagées en douze familles, qui sont :

1. Les Lépas ou Patelles.
2. Les Orcilles de Mer.
3. Les Tuyaux vermiculaires.
4. Les Nautilus.
5. Les Limaçons.
6. Les Buccins.
7. Les Rochers.
8. Les Pourpres.
9. Les Tonnes.
10. Les Vis.
11. Les Volutes.
12. Les Porcelaines.

PREMIERE FAMILLE.

LÉPAS OU PATELLES.

CE sont des Coquilles ouvertes, éva-
 fées, non contournées, de la figure
 d'un cône tronqué, qui s'attachent aux
 rochers ou à quelqu'autre corps dur.
 Elles sont ou entières, ou percées, ou
 chambrées, ou à appendice intérieur ;
 & c'est delà que nous tirerons leur di-
 vision en quatre genres, qui sont :

I. FAM.
 LES LÉPAS.

1°. Les Lépas à Coquille simple & entiere.

2°. Les Lépas à Coquille percée en-dessus.

3°. Les Lépas à Coquille chambrée.

4°. Les Lépas à Appendice en demi-cornet.



GENRE PREMIER.

LÉPAS A COQUILLE SIMPLE ET ENTIERE;

I. FAM.
LES LÉPAS.

1. UN Lépas des Indes , très-rare , blanc , de forme presque ronde & aplatie , creusé en-dessus de sillons onvés concentriques , & en-dedans de stries fines qui s'étendent du centre à la circonférence. Le bouton du sommet est jonquille , le milieu de l'intérieur est jaune. Ce Lépas qu'on pourroit nommer *Parasol Chinois* , porte trois pouces deux lignes sur trois pouces quatre lignes de diamètre.

2. Le même , avec cette seule différence , que le milieu du dedans est fauve tirant sur le gris de lin.

* Argenv.
Pl. 2. lett. P.

3. Un Lépas des Indes , rare , à tête située vers les deux tiers de la longueur , à stries longitudinales , à base ovale , & de l'espèce nommée *Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue* * ; il est marbré en-dessus , & nacré en-dessous.

4. Un *Bouclier* semblable , un peu plus grand , dépouillé , & dont les stries ont disparu. Ses couleurs ont un grand éclat.

5. Un autre dépouillé & sans stries , moins grand , & de marbrure plus chargée que le pré-

* List. tab. cédent *.
531 n°. 9.

6. Un très-beau *Bouclier* à onze bandes lon-

gitudinales, de forme un peu moins élevée que les précédens, sa tête est blanche & nacrée *. Il porte trois pouces, sur deux pouces six lignes de diamètre.

I. FAM.
LES LÉPAS
* Rumph.
tab. 40. fig.
A.

7. Un autre moins grand de l'espèce du précédent, mais dépouillé.

8. Un grand Lépas Magellanique, papyracé à stries longitudinales peu élevées. La tête, le bord de la base, & une zone intermédiaire sont flambés de lie de vin sur un fond blanc, l'intérieur est nacré.

9. Six Lépas de l'espèce de celui de l'article précédent, mais moins grands, de fonds & de marbrure variés.

10. Sept Lépas de moyenne grandeur, savoir, un blanc tacheté, de forme un peu aplatie, à stries longitudinales ferrées & granuleuses; un à tête élevée placée près de son milieu, & de forme presque conique, à stries longitudinales bien marquées. Deux Lépas coniques jaunes, l'un dans l'état naturel à tête plus obtuse, & l'autre poli. Deux de l'espèce de l'article précédent, & un *Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue*.

11. Deux très-grands Lépas Magellaniques en pendant, de forme oblongue, à tête fort élevée & chatoyante, à grosses stries ou côtes longitudinales rabotteuses, de couleur brune moirée en-dessus, nacrée en-dedans.

80 COQUILLES UNIVALVES

I. FAM.

LES LÉPAS.

12. Deux autres de forme plus applatie.

13. Deux autres de l'espèce de ceux de l'article onze ; à cela près , qu'ils sont blancs nués de marron ; les sommets sont comme dans les précédens.

14. Deux grands Lépas rares Magellaniques , à côtes assez larges & peu saillantes , brun-foncé en dessus , nacrés en-dedans , à tête élevée , de forme à peu-près conique , & nommés en Hollande *Entonnoirs*.

15. Deux autres qui ne diffèrent des précédents qu'en ce que les cannelures de l'un sont blanches , & qu'on remarque aussi un peu de blanc dans le haut & le bas des cannelures de l'autre.

16. Cinq Lépas de moyenne grandeur & fort jolis ; sçavoir , un rare à stries blanches & cannelures amaranthe-clair , chargées de petits grains très-fins ; un autre rare encore à stries fines & serrées , à peine sensibles , rassemblées en plusieurs faisceaux alternativement blanc & cerise ; deux fond blanc nué de bleu , nacrés en-dedans , & un *Entonnoir* de l'espèce du premier des précédens.

17. Trois Lépas rares , sçavoir , un grand blanc , nué de violet vers le haut , & de verd dans le bas , à côtes longitudinales nombreuses , & nacré tant en-dedans qu'en dehors ; un de l'espèce du premier de l'article précédent ,
mais

mais plus grand ; & un autre un peu plus grand, nué & marbré de fauve roux , à côtes peu élevées , & nacré tant en-dessus qu'en dessous.

I. FAM.
LES LÉPAS ;

18. Sept Lépas de moyenne grandeur ; savoir , un à stries & cannelures longitudinales , granuleuses & à tête élevée , bariolé de noirâtre , de fauve & de blanc *. Un à grosses côtes longitudinales , laissant entr'elles de pro-

* Arg. pl. &
lett. H.

fondes cannelures , nué de marron clair sur un fond blanc , à tête blanche & de forme aplatie. Un à stries larges & peu élevées , fond brun avec une zone blanche ; nacré par-tout. Un à seize côtes longitudinales , marron , & autant de cannelures verdâtres. Deux semblables au premier de l'article précédent ; à cela près , que les cannelures en sont couleur de rose , & qu'ils sont plus aplatis , & un de même espèce nué de gris-de-lin.

19. Six Lépas , savoir , deux à peu-près semblables aux deux premiers de l'article précédent. Un semblable au premier de l'article 16 ; un granuleux bariolé d'orangé & de blanc ; un semblable au quatrième de l'article précédent , mais plus grand ; & un grand Lépas Magellanique mince , à côtes peu élevées , ondées & irrégulières marron , sur un fond blanc & nacré.

20. Deux grands & beaux Lépas de forme un peu aplatie ; l'un à côtes longitudinales

82 COQUILLES UNIVALVES

I. FAM.
LES LÉPAS.

* Arg. pl. 2.
lett. G. list.
tab. 534. fig.
13.

grandes & petites , alternatives , & débordant la base en forme de rayons; il est panaché en zigzag de blanc , de jaune clair & de brun , & a le sommet noir; on le nomme *Œil de rubis radié* * , l'autre est à stries blanches & cannelures couleur de rose.

21. Deux semblables , à cette différence près, que l'*Œil de Rubis* est à stries moins élevées , moins radiées , & à zigzags plus marqués; & que l'autre Lépas est ici plus grand , plus oblong , & nué seulement de couleur de rose.

* List. tab.
541. fig. 25.

22. Trois Lépas , sçavoir , deux fauves à stries légères & nombreuses , de forme oblongue , à côtés comprimés , ressemblants par-là à des *bateaux* , & nommés en effet de la sorte * , & un *œil de Rubis* semblable à celui de l'article précédent.

* Arg. pl.
lett. B.

23. Trois grands Lépas , l'un à côtes grandes & petites , alternatives , débordant la base , de forme aplatie , à tête marbrée de blanc & de fauve , brun dans le reste , & nommé *Œil de Bouc radié* * ; l'autre poli , de forme un peu élevée , arrondie vers le haut , à tête & bords brun-foncé , blanc-nacré dans l'intervalle ; & un blanc du Brésil , marbré de fauve-roux , à grosses côtes , chargées de stries inégales , onduleuses & rabotteuses , & à base dentelée.

24. Trois autres , sçavoir , un *Œil de Rubis* ,

un *Œil de Bouc* ; & un comme le dernier de l'article précédent , mais moins grand.

I. FAM.
LES LÉPAS.

25. Quatre grands Lépas , ſçavoir , deux blancs à ſtries longitudinales , ſaillantes en vive arrête & dentelées , débordant la baſe ; un blanc un peu orangé , à tête élevée , & à ſtries fines ; & un ſemblable , à ſtries plus larges , chargé de *Glands de Mer*.

26. Sept Lépas , ſçavoir , un grand , blanc nué de fauve , de forme applatie , à larges côtes peu élevées & à ſtries fines & ſerrées * ; un à ſtries longitudinales , bariolé de zones fauves , blanches & noires ; un ſemblable aux deux premiers de l'article précédent , mais moins grand ; un à tête plus élevée & à ſtries non dentelées. Un granuleux ſemblable au premier de l'article 18 , & deux de l'eſpèce nommée *Œil de Rubis*.

* Gual. Ind.
tab. 8. litt. L.

27. Trois très-grands Lépas , ſçavoir , un d'Amérique , à ſtries inégales & rabotteuſes , marbré de blanc , de fauve & de gris-verdâtre. Un de la Méditerranée à ſtries ſaillantes , rabotteuſes & débordant un peu la baſe , marbré par zones de marron , & de blanc ; & le troiſième dépouillé , d'un beau blanc , à tête élevée & pointue.

28. Huit grands Lépas , ſçavoir , un blanc à ſtries inégales , revêtu de ſon épiderme. Un autre dépouillé paroiſſant de même eſpèce ,

I. FAM.
LES LÉPAS. chargé de trois tuyaux vermiculaires. Deux à grosses stries longitudinales débordant la base ; & marbrés par zones de marron-clair & toncé, & de verd d'eau * ; deux Magellaniques de l'espèce de ceux de l'article 11, & deux blancs dépouillés, semblables au dernier de l'article précédent.

* Gual ind.
 tab. 9. litt. H.

29. Vingt-quatre Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, quatre à bandes larges, alternativement blanches & brunes, & à stries fines & serrées. Deux fauves nus de verd & de gris, de l'espèce du premier de l'article 26. Deux verdâtres à stries inégales, serrées & rabotteuses, parmi lesquelles il y en a, dans un, onze orangées placées à distance presque égale les unes des autres. Un souci lisse, à tête blanche ; un à stries peu élevées, & à zones brunes hachées sur un fond jonquille ; un verd de terrasse strié, à bandes alternatives, fauves & brunes ; deux à stries transversales & à petites bandes hachées, blanches & rouges-brunes. Deux petits Magellaniques papyracés, à stries brunes & cannelures blanches, mieux prononcées dans l'un que dans l'autre. Deux autres Magellaniques papyracés, de la variété de l'article 9. Quatre *Œils de Rubis*, dont deux radiés & revêtus de leur épiderme ; les deux autres dépouillés & non radiés. Deux de l'espèce du premier, de l'article 28, & un.

en bateau comme les deux premiers de l'article 22.

I. FAM.
LES LÉPAS.

30. Cinquante Lépas de moyenne grandeur & petits, sçavoir, deux petits & plats à stries capillaires, marbrés, par zones inégales, de brun & de gris, & à sommet blanc *. Deux autres de forme conique & à stries fines alternatives, blanches & noires. Deux à tête comprimée, à stries fines, blanches & grises. Deux lisses & aplatis, à lignes longitudinales, brunes, interrompues, sur un fond blanc. Deux aplatis d'un beau couleur de rose, à stries capillaires & à sommet blanc. Un semblable, mais brun-obscur. Un blanc à grandes taches couleur de rose, régnautes dans une large zone. Deux un peu plus élevés, fauves-gris. Deux blancs à côtés comprimés, & à stries longitudinales & transversales, grosses & rabotteuses, formant un réseau imparfait. Un noir de forme conique, à huit côtes élevées, d'un blanc d'émail. Un de même espèce, à neuf côtes, blanc nué de fauve roux, & à sommet noir aplati. Un à base dentelée & à côtes striées, alternativement blanches & brunes *. Le petit Lépas peint en façon de réseau *. Deux Lépas bruns, dont les cannelures & les stries sont hérissées de petits points rudes *. Deux autres semblables, mais rougeâtres. Un blanc à stries fines, granuleuses & à base pres-

* List. tab.
539. f. 22.

* List. tab.
532. fig. 11.
* List. tab.
530. fig. 8.

* List. tab.
536. fig. 15.

I. FAM. que circulaire. Cinq Magellaniques, dont quatre de l'espèce de l'article 9, & un *Entonnoir* à bandes alternatives blanches & brunes. Deux *œils de Rubis* radiés, un *Bouclier*, & dix-sept autres variétés.

31. Sept Lépàs peu communs, tous à grands rayons, en forme d'étoile, & nommés par cette raison *Astroïépas*; savoir, un blanc de forme plate, à seize rayons saillans en-dehors, & creusés en-dessous en gouttière; trois blancs rouffâtres à tête plus élevée, à rayons plus serrés & dentelés; un blanc à rayons épais & granuleux; & deux blancs marbrés de noir,

* Arg. pl. 2. l'un à sept, l'autre à huit rayons *.

lett. M.

Litt. tab. 532.

fig. 10.

32. Deux Lépàs à tête recourbée & à stries fines & serrées, nommés *Bonnets de Dragon*; l'un d'une belle couleur de chair, & plus grand que celui représenté dans la première Planche de l'Appendice de d'Argenville*; l'autre n'en diffère qu'en ce qu'il est un peu moins grand & de couleur blanche. Ils sont de la plus parfaite conservation.

* Arg. app.
pl. 1, lett. A.

33. Deux rares Lépàs Magellaniques papyracés à tête recourbée, & grands dans leur espèce. Ils sont en forme de *gondole*, à tête placée à l'une des extrémités de la base, & un peu recourbée sur ce même point, à stries transversales qu'on n'apperçoit qu'à la loupe, blancs en-dessus, nacrés en-dedans.

34. Douze autres Lépas Cabochons de I. FAM.
LES LEPAS,
moyenne grandeur & petits ; sçavoir , deux
fauves nués de marron , à stries longitudina-
les , granuleuses vers le haut , tuilées dans
le bas , & à léger recourbement de tête regar-
dant l'un des deux bouts *. Un autre avec son * Gualt. indi
tab. 9. litt. V.
épiderme à stries , alternativement granuleuses
& hérissées de petites tuiles fort saillantes. Un
petit blanc de la Barbade , à stries transver-
sales & ridées , à base irrégulière , & à recour-
bement de tête regardant un des côtés *. Un * Litt. tab.
544 fig. 31.
petit blanc du même lieu à stries longitudi-
nales , revêtues de Drap Marin , à base ronde
& à recourbement de tête contourné *. Un * Litt. tab.
544. fig. 32.
petit blanc à stries fines , transversales , gra-
nuleuses & à base ronde *. Deux blancs & * Litt. tab.
544. fig. 30.
gris , nués de verd , de forme conique à stries
longitudinales , & à sommet un peu recourbé.
Un blanc à stries transversales , onduleuses &
ridées , & à recourbement de tête descendant
jusqu'à la base. Deux *Bonnets de Dragon* de
l'espèce de ceux de l'article 32 , mais plus
petits * ; & un petit de l'espèce de ceux de l'ar- * Arg. pl. 2.
lett. R.
ticle 33.

35. Un Lépas rare de couleur fauve , à gros-
ses stries rabotteuses , longitudinales , & à pe-
tites transversales qui se croisent en réseau , à
base ovale & à tête recourbée sur l'un de ses
côtés ; l'intérieur ressemble à une valve de

I. FAM.
LES LÉPAS.

* Arg. pl. 2.
lett. D.

came qui seroit destituée de charniere , ce qui lui a fait donner le nom de *Concho-Lépas* *.

GENRE SECOND.

LÉPAS A COQUILLE PERCÉE EN DESSUS.

36. **U**N Lépas rare de Magellan , à base ovale , de plus de trois pouces de long , sur plus de deux de large , de forme assez élevée , à stries longitudinales , ferrées , coupées par quelques autres transversales , & à vingt-huit larges rayons alternativement blancs & violets , nués d'incarnat vif , le trou ovale du sommet a un demi-pouce de long sur trois lignes de large , & est bordé de blanc.

37. Un de même espèce , à cela près , qu'il est plus large , & que les rayons sont alternativement violets & blancs nués de verdâtre.

38. Deux Lépas en pendant , de la variété de celui de l'article précédent , mais un peu moins grands.

39. Douze Lépas de différentes grandeurs , tous percés au sommet ; sçavoir , un à large ouverture , & à côtés comprimés , qui lui donnent la forme d'un canot. Un marbré de blanc-fale & de verd céladon , à stries inégales & ser-

rées, & à bords dentelés ¹; le Lépas réticulé, blanc safrané; ² le Treillis à pointes de Lister ³; le Lépas à Treillis plus serré ⁴; le Lépas d'Afrique légèrement strié, blanc-verdâtre en dedans, brun-roux en dessus ⁵; le Lépas verd à stries blanches, alternatives, & dont le trou du sommet est noirâtre tant en dedans qu'au dehors ⁶; le Lépas blanc taché de verd, à stries noueuses ⁷; le Lépas blanc tacheté, remarquable par le trou circulaire de son sommet ⁸; le Lépas à dix rayons fascié d'incarnat & de brun; & deux grands Lépas en pendant de l'espèce de celui de l'article 37.

I. FAM.
LES LÉPAS.

(¹) Gual.
tab. 9. litt. N.

(²) Bonan.
n^o. 6. Argenv.
pl. 2. lett. I.

(³) List. tab.
527. fig. 1.

(⁴) Ibid. tab.
527. fig. 2.

(⁵) Ibid. tab.
528. fig. 4.

(⁶) Ibid.
fig. 5.

(⁷) Ibid.
fig. 6.

(⁸) Ibid.
fig. 7.

40. Trente-quatre autres de différentes grandeurs, tant réticulés que striés, de toutes les variétés de l'article précédent, excepté la seconde.

GENRE TROISIEME.

LÉPAS A COQUILLE CHAMBRÉE,

41. VINGT-UN Lépas de moyenne grandeur & petits; sçavoir, deux blancs * flambés de brun-rougeâtre, de forme plate, à base irrégulière, à tête saillante en forme de bec un peu recourbé, & à cloison parallèle à la base, occupant près de la moitié du dedans,

* List. tab.
545. fig. 34.
Adanf. Hist. du
Seneg. pl. 2.
fig. 8.

90 COQUILLES UNIVALVES

**I FAM.
LES LEPAS.**

Quatre autres, dont trois blancs, nués de fauve clair, & un orangé, à stries longitudinales, inégales & hérissées de petites pointes, à tête recourbée & contournée qui leur donne une forme approchante de celle des Oreilles de Mer; leur chambre est à peu-près semblable à celle des précédens. Un de forme peu différente, mais lisse & à robe verd-de-terrasse, picottée de petits points grisâtres. Deux blancs, lisses, de forme un peu bombée, & à tête recourbée de biais jusqu'à la base, imitant très-bien une *Nacelle*: ils ont beaucoup de ressemblance avec le *Garnot* de M. Adanson *. Deux blancs papyracés, de forme ovale très-applatie, approchant beaucoup du *Jenac* du même Auteur *. Deux autres blancs papyracés, de forme plus allongée, & qu'on nomme *Sandales*. Deux à coque épaisse, à tête un peu recourbée, descendant presque jusqu'à la base, & sous laquelle on apperçoit en dedans une espèce de très-petite chambre; leur robe est lisse & panachée de petites larmes en losange, blanches, vertes & violettes *. Deux de même espèce, mais à fond brun & larmes fauves. Deux petits fauves de la Méditerranée, en forme de cônes évasés, & à petite chambre dont l'ouverture s'étend du centre à un des points du bord *, nommés *le Bonnet Chinois*;

* Hist. du
Sénég. pl. 2.
fig. 9.

* Ibid. fig. 10.

* Rumph.
tab. 40. litt. O.

* Arg. pl. 2.
lett. F. Bonan.
cl. 1. n°. 12.
list. tab. 46.
fig. 38.

& deux des Indes de même espèce, mais blancs; dont un à stries longitudinales, inégales & peu ferrées, & l'autre lisse au sommet, imitant le bout d'un mammelon.

I. FAM.

LES LÉPAS.

GENRE QUATRIEME.

LÉPAS A APPENDICE EN DEMI-CORNET.

42. NEUF Lépas, sçavoir, deux blancs papyracés, à stries longitudinales, très-fines, & à grosses stries transversales, onduleuses, à base irrégulière, à tête élevée & saillante en bec de Corbin, & de l'espèce nommée *Cabochon* *. Deux autres de la même espèce, mais dont les grosses stries transversales serpentent & se croisent en divers sens; ce qui les fait paroître comme ridés. Deux autres Cabochons blancs de Saint Domingue, différens des précédens, en ce que les stries longitudinales en sont fortes & bien marquées, & que les transversales y paroissent à peine. Deux petits blancs feuilletés, formés chacun comme de sept autres papyracés, empilés, à distance inégale les uns sur les autres, & qui vont en diminuant de volume à mesure qu'ils approchent du sommet, imitant par-là un toit Chinois à plusieurs étages, d'où ils ont tiré leur nom de

* Arg. pl. 2.
lett. K, Gualt.
ind. tab. 9.
lett. Z.

92 COQUILLES UNIVALVES

Arg. pl. 2.
lett. S.

Toits Chinois * ; & un petit blanc & conique à stries longitudinales bien marquées, à trois renflemens circulaires, terminés par un petit bouton, & nommé *Bonnet de Matelot*.



SECONDE FAMILLE.

OREILLES DE MER.

H. FAM.
OREILLES
DE MER.

CE sont des Coquilles ouvertes & ap-
platies qui n'ont qu'une seule spirale,
& qui ressemblent assez bien à l'oreille
humaine, d'où elles ont pris leur nom.
Elles ont ordinairement une rangée de
trous ronds disposés sur une ligne cour-
be ; mais quelques-unes en étant pri-
vées, nous en ferons un genre à part.
Ces deux genres sont :

- 1°. Les Oreilles de Mer à trous.
- 2°. Les Oreilles de Mer sans trous.



GENRE PREMIER.

OREILLES DE MER A TROUS.

43. **U**N E Oreille de Mer, des Indes, rare, dépouillée, d'une très-belle Nacre, ayant plusieurs semences de Perles dans son milieu, & portant cinq pouces & demi sur quatre *.

II. FAM.
OREILLES
DE MER.

* Gualt. ind.
tab. 69. litt.
B.

44. Deux autres un peu moins grandes, non dépouillées, à profonds sillons, à stries élevées en vive arrête, onduleuses & rabattues toutes d'un même côté en forme de feuilles roulées. La Nacre du dedans offre aux yeux toutes les couleurs de l'Arc-en-ciel *.

* Lill. tab.
613. fig. 5.

45. Deux comme les précédentes, dont une dépouillée.

46. Trois belles Oreilles de Mer, Orientales, de forme étroite allongée, l'une à stries presque imperceptibles, revêtue de sa pellicule d'un beau verd-pré, tacheté de blanc-sale; les deux autres dépouillées & très-grandes dans leur espèce. Leur Nacre intérieure est du plus bel Orient *.

* Rumph.
tab. 40. litt.
E. F.
Arg. pl. 30
lett. E.

47. Sept jolies Oreilles de Mer, sçavoir, une rare des Indes, jaune, marbrée de blanc-sale, à stries longitudinales onduleuses, coupées d'autres plus fines transversales, à bord

II. FAM. OREILLES DE MER. extérieur granuleux, mais sur-tout remarquable par une suite de tubercules parallèles aux trous dont l'Oreille est percée, & qui se prolongent en spirale jusqu'à la clavicule où ils forment une espèce de Couronne. Deux autres aussi des Indes à robe aurore réticulée, & à deux larges cannelures bordant des deux côtés la rangée de trous & de tubercules. Deux de Rio de la Plata à coque plus mince & à stries plus régulières que celles de nos Mers; & deux petites de l'espèce de l'article précédent.

48. Douze Oreilles de Mer de nos parages, savoir, un assortiment de six à peu près de même grandeur, percées de 4, 5, 6, 7, 8 & 9 trous, conservant leurs pellicules marbrées de diverses couleurs *. Une à stries en forme de feuilles ou rides très-faillantes *. Deux grandes chargées de Glands de Mer, & trois dépouillées, dont une orangée aurore & cerise, de diverses nuances & d'un grand éclat, tant en dessus, qu'en dessous, & au-dedans de laquelle adherent des semences de Perles, mais dont le bord paroît avoir été rogné jusqu'en deçà des trous qui y manquent.

* Arg. pl. 3.
lett. A. F.
* Ibid. lett. D.



GENRE SECOND.

OREILLES DE MER SANS TROUS.

49. **T**ROIS Oreilles de Mer, ſçavoir, deux blanches de forme applatie, & nommées *Oreilles de Venus*, à ſtries très-fines *; & une petite très-rare d'une autre eſpèce, blanche, marbrée d'orangé, légèrement ſtriée, nacrée en dedans, & de forme bombée *.

II. FAM.
OREILLES
DE MER.

* Arg. pl. 3.
lett. C.

* Liſt. tab.
1056.



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX ET VERMICULAIRES.

CE ſont des eſpèces d'Eruis teſtacés, tantôt coniques, tantôt cylindriques, droits, recourbés, ſinueux ou tortillés, qui ont ſervi de logement à des eſpèces de Vers de Mer, & qui adhèrent ſouvent les uns aux autres & à d'autres corps.

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMI-
CULAIRES.

On les appelle ou *Tuyaux de Mer*, ou *Vermiculaires*, ſelon qu'on les ren-

contre ou isolés, ou groupés ensemble en masses plus ou moins grosses, & ces dénominations distinctives donneront lieu à les partager ici en deux Genres :

1°. Les Tuyaux de Mer.

2°. Les Vermiculaires.

Auxquels nous ajouterons, par forme d'appendice, un troisième Genre, qui sera composé de ceux qui sont formés d'une substance cartilagineuse & flexible, ou de grains de sable & de fragmens de Coquilles, ou de grains de sable seulement, liés ensemble par un suc glutineux, soit qu'on les trouve seuls ou groupés. Quoique nous ne regardions pas ceux de ce dernier genre, comme des Coquilles proprement dites, nous n'avons pas cru devoir les ranger ailleurs, vû leur ressemblance avec les précédens.



GENRE

GENRE PREMIER.

TUYAUX DE MER.

50. **U**N très-beau Tuyau de Mer de l'Isle d'Amboine, nommé l'*Arrosoir* ou le *Pinceau de Mer*, de six pouces & demi de long & parfaitement conservé. Il est de couleur blanche à tête arrondie en forme de gland, & percée de petits trous, couronnée d'une espèce de fraise formée de petits tubes accolés & tenans les uns aux autres, comme autant de portions de rayons d'un même cercle *.

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMI-
CULAIRES.

51. Deux *Arrosoirs* de la côte Coromandel, moins grands que le précédent, & à tuyau un peu recourbé, l'un à tête & fraise applaties, & l'autre à fraise fort irrégulière. Une tête d'*Arrosoir*, coupée au-dessous de la fraise pour faire voir l'organisation intérieure, & un Tuyau d'Amérique blanc nué de violet, ridé, & à deux replis irréguliers, dont l'extrémité la moins grosse est fermée par une demi-sphère lisse & luisante.

* Arg. pl. 32
lett. G. list.
tab. 548. fig.

52. Le grand Tuyau de mer de l'espèce des *solen du sable*, de forme cylindrique, droite, ridée, & composé comme de plusieurs pièces entées l'une sur l'autre, formant un seul tube,

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMI-
CULAIRES.

¹ Séba, tom.
3, tab. 94.
Klein rub.
mar. tab. 1,
fig. 3.

² Rumph. tab.
41 n°. 3.

³ Arg. p¹. 3.
lett. HH. Bo-
nanni. n°. 8.

⁴ Lister. tab.
547, fig. 1.

⁵ Arg. *Ibid.*
lett. II.

⁶ Arg. *Ibid.*
lett. KK. Bo-
nanni. n°. 9.

⁷ Gualt. tab.
10. litt. F.

excepté à l'extrémité supérieure qui se partage en deux par une cloison longitudinale d'un pouce de long. Il est fort épais, d'un blanc sale, & a dix-huit pouces de haut sur quinze lignes de diamètre dans le bout le plus gros. Sa forme qui ressemble parfaitement à un *cierge*, lui en peut faire donner le nom ¹.

53. Onze autres, sçavoir, quatre de l'espèce du précédent, & dont le plus gros qui est courbé, a 5 pouces & demi de long, sur un pouce & demi de diamètre. Un cylindrique, de huit pouces & demi de long, de cinq lignes de diamètre, & formé de quatre additions ou jets; & six petits d'Amérique un peu courbés, dont le diamètre va en s'étrécissant comme aux précédens ².

54. Dix-huit Tuyaux de mer; sçavoir, deux grands *Dentales* des Indes, cannelés, de couleur verte foncée dans le bas, qui s'éclaircit jusqu'au blanc vers la pointe ³. Deux semblables, à cela près qu'ils sont plus minces, & à cannelures plus étroites ⁴. Deux autres blancs droits & courts à cannelures plus profondes ⁵. Huit *Antales*, lisses & blancs ⁶. Et quatre autres légèrement striés, dont deux aurore nués par zones de blanc, & deux couleur de rose nués par zones de verd ⁷.

55. Un tuyau de mer des Indes & de la plus grande rareté, de couleur blanche, auquel sa

ressemblance avec un Escalier a fait donner le nom Italien de *Scalata*. C'est un tuyau contour-
né régulièrement en spirale de huit orbes, qui se
surmontent les uns les autres en forme de vis
conique, & dont le plus bas revient en cor-
net former une bouche ovale; il est revêtu
extérieurement & à distance égale, d'anneaux
blancs, saillans en vive arrête, se rapportant
& partie se joignant d'orbe en orbe, & laissant
entre deux, d'un orbe à l'autre, des jours à rai-
son de neuf par orbe, à commencer de la
bouche même que le premier borde. Il a deux
pouces de haut & est des mieux conservés *.

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMI-
CULAIRES.

*Rumph. tab:
49. litt. A.
Gault tab. 10.
lett. ZZ. Arg.
pl. 11. lett. V.

56. Deux gros tuyaux de mer, rares, de
couleur grise, de forme presque cylindrique,
contournés en spirale, & nommés *Tire-bour-
res*. Cette espèce est remarquable par des
stries circulaires onduleuses & ridées, & par une
fente droite qui regne dans la longueur de tou-
tes les spires, & qui en laisse voir en plusieurs
endroits le dedans. La clavicule est aplatie
dans l'un & saillante dans l'autre *.

*Séba pl. 94.

57. Cinq *Tire-bourres* de l'espèce du dernier
des précédens, groupés à côté les uns des au-
tres sur une production de mer grisâtre & cou-
verte de houpes de petits poils transparens,
semblables à des filamens d'alun de plume.

58. Quatre autres plus grands que les pré-
cédens, groupés sur une production marine
de même espèce.

Gij

III. FAM. TUYAUX ET VERMICULAIRES. 59. Six rares Tuyaux de mer de l'espèce nommée *Solen Serpent* ; sçavoir , deux fauves , dont les replis se terminent par une clavicule en forme de vis très-aiguë à son extrémité* , & qu'on peut nommer *Vilebrequin* ; deux ridés & tortillés, de couleur rousse, dont un lisse & l'autre strié ; un à côtes longitudinales épineuses , à fillon dentelé , & à replis tortueux , imitant ceux des vers de terre* ; & un gros & long à trois faces , dont deux plates , & la troisième arrondie , à stries longitudinales & transversales*.

* Gualt. tab. 10. litt. Q.
Arg. pl. 4 lett. I.

* Rumph. tab. 41. litt. H.
Gualt. tab. 10 litt. R.

* Bonanni. tab. 20. litt. F.

* Arg. pl. 4. lett. H.

* List. tab. 554. f. 5. Klein tub. mar. tab. 1. f. 2.

60. Dix Tuyaux de mer ; sçavoir , un gros *Serpent* , à stries longitudinales granuleuses , plié en spirale & adhérent à un morceau de corail oculé blanc. Trois accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intestins. Deux rares à robe raboteuse , roulés en forme de cornes d'Ammon , l'un à trois & l'autre à deux contours* . Un grand nombre de très-petits blancs , adhérens à l'Algue marine , nommés par Lister *Nautiloïdes** . Trois petits Tire-bourres de l'espèce du premier de l'article 56 , & trois autres de l'espèce des deux premiers de l'article précédent.

61. Deux Tuyaux de mer d'Amérique, rares, d'un petit diamètre , & d'une extrême longueur, tortillés chacun en deux spires d'un grand nombre de révolutions , & ressemblans à des

petits *pains de Bougie*, ce qui nous leur en fait donner le nom.

III. FAM.

TUYAUX

ET VERMI-

CULAIRES,

62. Huit Tuyaux de mer chambrés; sçavoir, un très-rare aurore clair, à six replis irréguliers, & ouverture longitudinale dentelée des deux côtés, à petites chambres intérieures, tournant leurs convexités du côté du bout le plus mince, & qui paroissent destituées d'un siphon qui les traverse toutes, tel qu'on l'observe dans celles des *Nautilus chambrés*. Six autres, ronds, roulés en spirale plate, à cloisons nacrées, traversées d'un siphon, nommés *Ammonies*, & en Hollande *Cornets de Postillon* *. Un autre de même espèce, percé de quelques trous latéraux pour en faire voir les chambres; & quelques diaphragmes ou cloisons détachées garnies de leur siphon.

* Arg. pl. 54
lett. GG.



G E N R E : S E C O N D

VERMICULAIRES.

III. FAM. TUYAUX ET VERMICULAIRES. 63. **T**ROIS grands & beaux groupes, l'un de gros Tuyaux Vermiculaires du Golfe de Venise, à stries longitudinales granuleuses; les deux autres de la Méditerranée, moins gros, lisses & blancs. Ils adhèrent l'un à un grand

* Arg. pl. 4.
lett. C.

Peigne, l'autre à une valve *de Cœur de Bœuf**.

64. Quatre autres groupes, des deux variétés de l'article précédent*.

* Ibid. pl. 4.
lett. B. D. E.

65. Neuf Variétés de Vermiculaires, savoir, un groupe de Vermiculaires peu communs, minces comme du fil fin & diversement tortillés*. Un autre de deux tubes à plis circulaires en vive arête de distance en distance, qui les font ressembler à plusieurs gobelets empilés les uns dans les autres, & qu'on nomme *Tuyaux Trompettes*. Une grosse Came chargée de vermiculaires blancs & triangulaires à côte longitudinale en vive arête sur le milieu du corps. Et six autres Variétés dont quelques-unes déjà décrites.

* Séba tom.
3 tab. 100. n°.
8.

66. Quatre groupes de Vermiculaires, dont deux blancs operculés du Sénégal, nommés *Vermets**, Et deux réguliers d'un beau pourpre

* Adanson,
pl. 11. n°. 1.

foncé, connus sous le nom de *Tuyaux d'Orgue*.
Plus un opercule de Vermet détaché, ainsi
que l'animal *.

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMI-
CULAIRES.
* Arg. pl. 42
lett. A.

67. Un groupe de *Tuyaux d'Orgue*, de
près de huit pouces de longueur, sur près de
six de largeur & autant de hauteur.

68. Un autre groupe de *Tuyaux d'Orgue* ;
moins gros que le précédent, mais de couleur
plus vive.

69. Un grand & beau groupe de Tuyaux
Vermiculaires de la Méditerranée, partie oper-
culés, partie de l'espèce appelée *Tuyaux Trom-
pette*, lequel renferme plusieurs pétoncles.

70. Deux amas de Vermiculaires très-blancs,
groupés à l'entour de fragmens de bâtons, &
qui posent sur des pieds de bois des Indes ; &
un autre amas de Vermiculaires, semblable à
celui de l'article précédent, mais plus petit.

71. Un gros groupe de Vermiculaires du
Sénégal, des deux espèces, brune & blan-
che, nommées *Vermets* & *Dofans* *, formé en
éventail, auquel adhèrent des huîtres feuil-
lettées & des glands de mer : il a dix pouces de
haut sur douze de large, & est posé sur un pied
de bois noirci.

* Adanf. pl.
II, n°. 1 & 34



GENRE TROISIEME.

TUYAUX ET VERMICULAIRES NON
TESTACÉS.

72. TRENTE-CINQ Tuyaux de mer; sçavoir,
 III. FAM. fix cartilagineux, dont un simple & mince,
 TUYAUX un peu élastique, brun rougeâtre, les cinq autres
 ET VERMI- sont des étuis de Scolopendre, à double coque,
 CULAIRES. dont l'extérieure est mince, grise noirâtre & ri-
 dée, l'intérieure un peu plus épaisse, très-lisse, de
 la dureté & transparence de la corne. M. Ellis
 * Ellis, pl 34. les nomme *Coraline tubuleuse de Malte* *. Trois
 mar. tab. 1. f. d'une autre variété, cartilagineux, longs, min-
 4. ces & fragiles. Douze à robe raboteuse & fra-
 gile formée de sable & de fragmens de co-
 quilles *. Deux autres de même espèce, mais
 * Klein. tub. de consistance plus solide; six autres adhé-
 mar. tab. 1. f. rens à autant de pointes d'oursins. Quatre
 4. papyracés de forme conique tronquée, lisses
 & fragiles *. Et un de la côte de Coromandel
 * Klein Ibid. à robe seulement formée de fragmens de co-
 tab. 1. f. 5. quilles. Plus une Scolopendre de l'Isle de Saint-
 Helene, avec son tuyau, conservés dans l'Es-
 prit de vin.

73. Un gros groupe de Tuyaux Vermicu-
 laires de l'Océan, formés de sable & de frag-
 mens de coquilles; la surface, où aboutissent

les bouches des tuyaux , offre à l'œil des com-
partimens à peu près semblables à ceux des
gâteaux des mouches à miel * , mais dont les
cellules seroient rondes & non exagones ; il

III. FAM.
TUYAUX ET
VERMICU-
LAIRES.

est de la plus belle conservation , & porte 15
pouces 3 lignes de large sur 5 & demi de haut.

* Ellis, pl.
36, lett. A, B,
C. Mém. de
l'Acad. des Sc.
an. 1711, p.
134, pl. 2, fig.
15.

74 Deux groupes de Vermiculaires ; sça-
voir , un de l'espèce de ceux de l'article pré-
cédent , mais d'un volume à pouvoir entrer
dans des tiroirs , & un d'autre espèce formé de
gros sable blanc seulement , & venant de l'Isle
de l'Ascension : plus des boîtes où sont des sa-
bles & autres fragmens provenans de la dé-
composition d'une partie de chacun , qu'on a
rassemblés pour pouvoir à volonté les exami-
ner au Microscope.

QUATRIEME FAMILLE.
NAUTILES.


IV. FAM.
NAUTILES.

CE sont des Coquilles contournées en spirale de trois révolutions, toutes dans un même plan, & dont la dernière paroît seule extérieurement. Elles ont l'apparence d'un petit navire ou gondole à poupe élevée.

Les Coquilles de cette Famille sont ou épaisses & cloisonnées, nacrées en dedans, à carenne lisse & arrondie ; ou papyracées & non cloisonnées, ni nacrées, à carenne tuberculeuse plus ou moins large, d'où résulte leur division en deux genres.

1°. Les Nautilus épais & chambrés.

2°. Les Nautilus papyracés non chambrés.



GENRE PREMIER.

NAUTILES ÉPAIS ET CHAMBRÉS

75. **U**N grand Nautilé des Indes, fauve très-clair, à flammes onduleuses cannelle dans la moitié de sa robe la plus voisine de la tête, & à grande tache noire dans l'origine de la seconde révolution *.

IV. FAM.
NAUTILES.

76. Un autre blanc qui diffère du précédent en ce que sa tache noire y est plus grande & se prolonge en une raye fine qui borde l'intérieur de la bouche *.

* Arg. pl. 5
lett. E.

77. Un autre fauve foncé, à flamme cannelle, & où la tache noire ne forme qu'une zone peu large.

* Gualt. tab.
17, fig. A.

78. Un autre dépouillé & par-là nacré, tant en dedans qu'en dehors, & d'un bel orient.

79. Trois Nautilés chambrés & umbiliqués; dont un de moyenne grandeur à flammes blanc de lait dans toute sa robe, & deux petits dépouillés *.

80. Les mêmes Nautilés qu'à l'article précédent, excepté que l'un des deux petits n'est point dépouillé.

* Arg. pl. 5
lett. F. Gualt.
tab. 17, fig. B.

81. Un grand Nautilé chambré, coupé en deux suivant sa longueur pour en laisser voir l'inté-

IV. FAM. NAUTILES. **81.** **rieur ***. Un percé de divers trous du côté qui répond à ses chambres, & vers la tête d'un plus grand, laissant à découvert un intervalle de trois cloisons; & la portion chambrée d'un autre, ouverte en divers autres sens.

GENRE SECOND.

NAUTILES PAPYRACÉS, NON CHAMBRÉS.

82. **U**N Nautilé papyracé de la Méditerranée, blanc de lait, à stries onduleuses unies, à carène étroite, brune dans la moitié de sa longueur, de 7 pouces 4 lignes de long, avec son polype desséché & bien conservé *.

* Arg. pl. 5, lett. A. *Ibid.*
Zoomorp. pl. 2, f. 2 & 3.

83. Le même Nautilé, mais moins long d'un demi pouce, & sans polype.

84. Un Nautilé semblable aux précédens; à cela près que la couleur blanche en est moins vive, & que les bords d'une partie de la carène en sont plus noirs.

85. Un Nautilé des Indes papyracé, blanc tirant sur le fauve, à stries chargées de petits tubercules en forme de grains de ris, à deux crochets saillans ou oreilles, à carène large,

* Arg. pl. 5, & de 5 pouces 4 lignes de long *.
lett. C.

86. Un du Brésil de l'espèce du précédent, mais moins grand, & d'un beau blanc de lait.


87. Deux Nautilus, l'un de l'espèce du précédent, mais beaucoup plus petit ; l'autre sans tubercules, de couleur blanche tirant sur le roux, à carenne large & très-petit *.

IV. FAM.
NAUTILES.

* Arg. pl. 5 ;
lett. B. Seba,
tom. 3, tab.
84, n°. 9 &
10.

88. Un Nautilus de moyenne grandeur, à stries chargées de grains de ris, mais différent de ceux des articles 85 & 86, en ce qu'il n'a pas d'oreilles, & par-là plus rare *.

* Seba, tom.
3, tab. 84,
n°. 4.



CINQUIEME FAMILLE.

L I M A ç O N S.

CE sont des Coquilles contournées en spirale, depuis deux orbes jusqu'à dix, dont on distingue trois genres ; savoir,

V. FAM.
LIMAÇONS.

1°. *Les Limaçons à bouche ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.*

2°. *Les Nerites ou Limaçons à bouche demi-ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.*

3°. *Les Sabots ou Limaçons à bouche ovale & à levre intérieure, presque parallèle à la base.*

GENRE PREMIER.

LIMAÇONS A BOUCHE RONDE.

- V. FAM. LIMAÇONS**
89. **DEUX** Limaçons, l'un lilas vif, l'autre blanc, nué de gris de lin, nommés *Dauphins* *.
- * Arg. pl. 6, lett. H. Seba, tab. 59, n°. 15 & 16.
* Seba, *ibid.* n°. 20 & 21.
90. Deux autres Dauphins un peu plus grands, l'un couleur de lilas, & l'autre sans avoir été nétoyé *.
- * Seba, *ibid.* n°. 7, 8 & 11. Gualt. tab. 68, litt. D.
91. Deux autres plus grands, à pointes & feuilles plus nombreuses, mais moins saillantes qu'aux précédens *.
- * Bonan. cl. 3, n°. 9. Gualt. tab. 64, litt. A.
92. Deux très-grands Limaçons des Indes, de forme renflée, & du genre des *Burgaux* nommés *Olearia*, parce que les anciens s'en servoient pour mettre de l'huile. L'un est umbiliqué & d'un verd foncé; ce qui le fait aussi nommer *Pot-verd* *. L'autre diffère du premier en ce qu'il n'a point d'umbilic; il est dépouillé & montre en dehors comme en dedans une très-belle nacre *. Plus un grand Opercule qui appartient aux Coquilles de ce genre.
- * Gualt. tab. 68, litt. A.
93. Deux *Burgaux* dépouillés de l'espèce du dernier des précédens, mais moins grands.
94. Deux *Burgaux*, l'un plus grand, l'autre moins, à robe verte, marbrée de blanc & de marron, nommés en Hollande *Princesses*.

Dans le plus grand , la côte la plus élevée se rend à la bouche par un gros pli formant en dedans une espèce de gouttière *. L'autre est d'un verd moins foncé.

V. FAM.
LIMAÇONS.

* Rumph. tab.
19, litt. A, B.
Séba, tab. 74,
n^o. 1 & 2.

95. Deux Burgaux rares, sçavoir, un dépouillé en partie, dont la robe n'offre aux yeux que du noir & de la nacre, & qu'on nomme *Veuve perlée*; & l'autre dépouillée jusqu'à la nacre qui est très-brillante; tous deux à tête orangée *.

* Arg. pl. 8,
lett. B.

96. Un plus gros, de même espèce, aussi dépouillé, à robe nuée de rouge & d'orangé, de l'éclat du rubis.

96. Le même Burgau que le précédent, dépouillé en partie seulement, noir & orangé dans le reste, nommé *Burgau perlé*.

98. Deux Burgaux rares de la Chine, verd foncé, nués de jaune, à cannelures & stries circulaires & inégales, croisées d'autres transversales, fines & onduleuses, à cinq pas de spirale, & à très-petite queue: l'un à cinq rangs de tuiles saillantes, diminuant de grandeur de la bouche à la tête, & l'autre à deux rangs seulement.

99. Deux beaux Burgaux en pendant, blancs marbrés principalement par zones d'un beau verd, dépouillés en quelques endroits jusqu'à la nacre, à tête un peu élevée, à six orbes, & nommés *Perroquets perlés*.

112 COQUILLES UNIVALVES

100. Six Burgaux, dont un noir, à quelques traits blancs interrompus, nommé *Veuve*, & **LIMAÇONS.** cinq autres flambés plus ou moins réguliè-

¹ Gualt. tab. 48, litt. B. ment de blanc & de noir, nommés *Petit deuil*¹

Bonanni, cl. ou *la Pie*.

3, n°. 29 &

30. Arg. pl. 8,

lett. G.

101. Trois beaux Limaçons, sçavoir, un à stries circulaires & tuberculeuses, nommé *Bou-*

² Arg. pl. 6, *che d'or*²; un à stries circulaires, sans tubercu-
lett. D. Séba,
pl. 74, n°. 9. les, nommé *Bouche d'Argent*³, & un à stries

⁴ Séba, *ibid.* longitudinales, ferrées & peu prononcées,
n°. 4. Rumph.
tab. 19, n°. 3. nommé *Ruban*⁴.

⁴ Séba, *ibid.*

n°. 27. Arg.

pl. 6, lett. K.

102. Trois Coquilles des espèces précédentes, mais un peu différentes par la grandeur & les couleurs.

103. Trois autres de marbrure différente, sçavoir, une *Bouche d'or*⁵, fermée par son opercule, une *Bouche d'argent*⁶ & un *Ruban*.

⁵ Séba, pl. 74,
n°. 10 & 11.

⁶ Séba, *ibid.*
n°. 6.

104. Trois Limaçons semblables aux précédens, à cela près que les couleurs en sont un peu différentes, & que la clavicule de la *Bouche d'argent* est d'un rouge de corail.

105. Deux *Rubans* un peu différens des précédens, & l'un de l'autre, & une *Bouche d'argent* qui diffère de celle de l'article 101, en ce que les pas en sont aplatis & bordés extérieurement d'une strie plus forte que les autres.

106. Deux grosses *Bouches d'argent* d'Amérique, & d'espèce rare, marbrées par bandes longitudinales, obliques & irrégulières, l'une
de

de blanc & de fauve de diverses nuances, l'autre de blanc & de verdâtre, à grosses stries transversales, un peu applaties, croisées d'autres longitudinales & obliques, très-fines & serrées, à tête élevée, à six orbes arrondis, & à pas creusés en dedans.

V. FAM.
LIMAÇONS

107. Six Limaçons de moyenne grandeur; savoir, deux *Rubans*, deux *Bouches d'or* & deux *Bouches d'argent* qui sont à stries & à tubercules, comme les *Bouches d'or*.

108. Six autres, savoir, un à taches blanches, olives, & brunes, nommé *Peau de serpent* *; deux *Bouches d'argent*, l'une marbrée de fauve & de brun, l'autre de verd & de noir; un *Perroquet perlé*, un *Petit-deuil* & un *Ruban*.

* Arg. pl. 61
lett. C.

109. Dix Limaçons un peu moins grands que les précédens, & par pendans deux à deux; savoir, deux blancs tachetés par compartimens de noir, sans umbilic, & qui peuvent former une seconde espèce de *Petits-deuils*; deux *Petits-deuils* de la première espèce, deux *Peaux de serpent*, deux *Perroquets perlés* & deux *Rubans*.

110. Vingt-six petits Limaçons; savoir, deux noirs, nués de fauve dans le bout, nommés *Marrons rôtis* *; deux de forme à peu près semblable, & rayés par zones de fauve, de jaune & de noir *; deux de forme bombée & à bouche argentée, dont la robe est chargée

* Ibid. lett. I.

* Gualt. tab. 45, lit. A, C,

114 COQUILLES UNIVALVES

V. FAM.
LIMAÇONS.


¹ Lister. tab.
642, fig. 34.

² Ibid. fig. 33.

d'une suite de petites taches oblongues, pourpre-clair, rangées par lignes circulaires¹; deux blancs tachetés de noir, par bandes longitudinales en zig-zag, & du reste, semblables aux précédens²; deux petits Burgaux à tête élevée, marbrés de blanc sale & de noir, dont un dépouillé en partie & par bandes obliques jusqu'à la nacre; deux autres umbiliqués de l'espèce des *Petits-deuils*; deux *Bouches d'or*, deux *Bouches d'argent*, deux *Rubans*, un Limaçon dépouillé, d'une belle nacre, très-singulier en ce que la tête en est rouge de corail très-vif; un couleur de noisette, à tête dépouillée, jouant l'opale; six autres dépouillés & nacrés partout. Plus deux bracelets faits, l'un de petits Burgautins dépouillés, enfilés ensemble, & l'autre de gros fragmens de *Petits-deuils*, avec un lambeau de ceinture de Sauvage, tissu de petits morceaux de coquilles, violets & blancs, cylindriques & creux.

111. Deux Burgaux des Indes, très-rares, verts, marbrés, l'un de blanc, l'autre de rouge & de blanc, à tête orangée; à quatre pas un peu aplatis & obliques, bordés de tubercules peu élevés, à umbilic & à un pli dans l'angle des deux lèvres, du côté de la bouche le plus près de la spirale.

112. Dix Limaçons des Indes; sçavoir, deux fauves qui différent des précédens par leurs stries

granuleuses, & en ce que l'un des deux n'est  point umbiliqué¹; un de l'espèce de ce dernier, V. FAM.
 dépouillé & d'une belle nacre; un petit, d'es- LIMAÇONS.
 pèce à peu près semblable, verd foncé, marbré ¹ Liff. tab.
 de blanc; deux petits Burgaux de la forme des 575. fig. 28.
 précédens, fauves, nués de verd, umbiliqués
 & légèrement striés; un à robe marron clair,
 chargée de grandes taches blanches, & de huit
 lignes circulaires, ponctuées de blanc, nommé
 en Hollande *le Turban Turc*²; le même dé- ² Séba, tab.
 pouillé & d'une belle nacre, & deux blancs, à 74, n°. 14.
 quatre orbes poin illés de pourpre, à stries gra-
 nuleuses & à gros tubercules³.

113. Cinq gros Burgaux; sçavoir, une *Bou-* ³ Arg. pl. 6,
che d'argent d'une grandeur extraordinaire & lett. Q.
 de couleurs très-vives; une *Veuve*, un Lima-
 çon dépouillé⁴; deux percés à jour en diffé- ⁴ Séba, tab.
 rens sens, pour donner la facilité d'en observer 74, n°. 7.
 le dedans, & un opercule d'*Olearia*:

114. Vingt-cinq opercules de Limaçons, à
 bouche ronde, dont douze variétés; sçavoir,
 un grand d'*Olearia*, blanc & lisse en dessus, à
 spirale fauve en dessous⁵; un moins grand, de ⁵ Rumph. tab.
 forme plus bombée, à stries fines & onduleuses 20, litt. A.
 en dessus⁶; deux aurore, nués de brun vers le ⁶ Gualt. tab. 70,
 sommet⁷; deux autres couleur de chair dans litt. A.
 le bas, noirs aux sommets, qui ont appartenu à ⁷ Rumph. tab.
 des *Bouches d'or*; un blanc légèrement strié, 20, litt. G.
 lisse & verd d'Émeraude au sommet⁸; deux ⁸ Ibid. litt. B.
⁸ Gualt. ibid.
 litt. L.
 litt. M.

116 COQUILLES UNIVALVES

V. FAM.
LIMAÇONS.

* Gualt. tab.
20, litt. h

* Ibid. litt.
E, F. Rumph.
ibid. litt. C, E.

granuleux, l'un blanc en dessus, & l'autre blanc nué de fauve dans le bas, verds au sommet; un grand, blanc, hérissé de tubercules dans sa partie convexe *; six *Nombrils de Vénus*, lisses, convexes vers les bords, mais creux au milieu, de couleur rouge, un peu nuée de blanc *; deux autres petits *Nombrils de Vénus*, blancs & granuleux en dessus; un très-petit, blanc, nué de couleur de chair, & six autres entièrement blancs.

GENRE SECOND.

LES NÉRITES.

* Lill. tab.
670, fig. 21.

115. **T**ROIS Nérîtes des Indes, rares; sçavoir, une blanc-sale, à stries longitudinales, très-fines & serrées, un peu onduleuses; elle ne diffère de la petite oreille blanche sans trous, de l'article 49, que par sa clavicule plus élevée & sa forme plus bombée *; une de même espèce, fauve-clair nué de blanc, polie, & dont les stries ont presque disparu, & une blanche à coque très-épaisse, à stries fines transversales, à lèvre intérieure garnie de dents, & s'extrayant en forme d'excroissance sur toute la base.

116. Trois grandes Nérîtes umbiliquées, la première des Indes, fauve foncé, à quatre fascies blanches, tachetées de flammes brunes en

zig-zag ¹ ; les deux autres nommées *Cordon-bleu* par Dargenville ². Celles-ci sont terrestres, V. FAM. & appartiennent à la troisième Section. LIMAÇONS.

117. Quatre Nérîtes umbiliquées, par pendans; sçavoir, deux des Indes, nommées *Testicules* ³, & deux de l'espèce de la première de l'article précédent, mais un peu moins grandes. ¹ Arg. pl. 7, lett. A. C. ² Ibid. pl. 17, lett. B. ³ Ibid. pl. 7, lett. V.


118. Deux Nérîtes rares des Indes, fauves en dessus, blanches en dessous, nommées *le Jaune d'œuf applati* ⁴.

119. Quatre Nérîtes umbiliquées, dont deux blanches, mouchetées de fousi ⁵, & deux *Testicules*. ⁴ Rumph. tab. 22, lit. B. ⁵ Gualt. tab. 67, lit. S. List. tab. 564, fig. 1.

120. Six Nérîtes des Indes par pendans; sçavoir, deux *Grives* ⁶, deux *Mammelons blancs* ⁷, & deux umbiliquées, nommées en Hollande *Jau-nes d'œufs* ⁸. ⁶ Arg. pl. 7, lett. B. ⁷ Ibid. lett. X.

121. Dix Nérîtes par pendans; sçavoir, deux à lèvre intérieure garnie de deux dents, surmontées d'une tache rouge, & nommées pour cela *Quenottes saignantes* ⁹; deux blanches, nuées d'incarnat, à quatre zones blanches, tachetées de roux, & umbiliquées ¹⁰; deux de l'espèce des premières de l'article 119; deux *Jau-nes d'œufs*, & deux *Grives*, dont une à stries fines, quoiqu'à larges cannelures. ⁸ Rumph. tab. 22, lit. A. ⁹ Arg. pl. 7, lett. H. O. ¹⁰ List. tab. 560, n^o. 3.

122. Deux Nérîtes des Indes, rares, blanc de lait, lisses, à quelques plis près qui regnent autour de leur spirale, umbiliquées, à appen-

 **V. FAM. LIMAÇONS.** dîce naissant du milieu de la lèvre intérieure, & se plongeant dans l'ombilic, & à angles des lèvres, très-faillans.

123. Six Nérîtes des Indes, par pendans; sçavoir, deux rares de la Chine, fauve roux, à trois bandes longitudinales blanches, & umbiliquées *; deux *Mâmmelons blancs*, & deux *Mâmmelons souci*, à tête & base blanche, ce qui les rend rares.

124. Douze Nérîtes des Indes, par pendans, sçavoir, deux blanches, à trois bandes longitudinales, bariolées de canelle, dont les intervalles sont ponctués de même, & umbiliquées *; deux blanches, picotées de marron clair, à tête élevée, & umbiliquées *; deux à grosses stries longitudinales noirâtres, & cannelures profondes jaunâtres, à lèvres intérieure & extérieure garnies de dents *; deux marbrées par grandes taches de blanc & de verd noirâtre, à stries fines & égales *; deux *Mâmmelons blancs* nus de couleur de chair, & deux *Quenottes saignantes* des plus vives couleurs.

125. Quatorze Nérîtes des Indes, par pendans; sçavoir, deux gris de lin, à trois bandes longitudinales blanches *, & dont une conserve son opercule; deux blanches à stries longitudinales raboteuses, à lèvres garnies de dents, conservant toutes deux leurs opercules; deux blanches, tachetées de noir, & à cannelures larges

& profondes * ; deux semblables aux deux premières de l'article précédent ; deux comme les septieme & huitieme du même article ; deux *Mammelons* , l'un blanc , l'autre fouci , & deux très-belles *Quenottes saignantes*.

V. FAM.
LIMAÇONS.
* List. tab.
599. fig. 15.

126. Vingt-deux Nérîtes , par pendans ; savoir , deux des Indes , à stries longitudinales noires , & cannelures grises plus ou moins profondes , dont une avec son opercule ; deux d'Amérique , noires , ponctuées de jaune pâle * ; quatre petites de la Méditerranée , jonquille , de forme renflée * ; quatre autres , marron fascié de fauve clair * ; deux de l'espèce de la troisieme & de la quatrieme de l'article précédent ; deux grandes *Quenottes saignantes* d'Amérique ; deux grands *Mammelons blancs* ; deux *Jaunes d'œufs* ; & deux *Grives*.

* Arg. pl. 7.
n°. 4.
* List. tab.
607. fig. 39.
* Ibid. fig.
40.

127. Quatorze Nérîtes , par pendans ; savoir , deux de la Méditerranée , blanc de lait , à six orbes renflés , à tête un peu élevée , & umbiliquées * ; deux des mêmes parages , & de forme semblable aux précédentes , mais d'un brun verdâtre ; deux de l'espèce de la premiere de l'article 116 ; deux à peu près semblables aux septieme & huitieme de l'article 124 ; deux grandes *Quenottes saignantes* ; deux *Jaunes d'œufs* , & deux *Grives*.

* Gual. tab.
67. litt. E.

128. Dix-huit Nérîtes , par pendans ; savoir , deux des Indes , à fond blanc picoté de

120 COQUILLES UNIVALVES

noir, & à deux larges zones noires* ; deux petites des Indes, blanches, tachetées & ponctuées par zones de roux, & umbiliquées; deux blanches, ondées en zig-zag de fauve roux : c'est le *Gochet* de M. Adanson* ; deux à robe noire ; deux petites, jonquilles, semblables aux quatre de l'article 126 ; deux *Quenottes saignantes* ; deux grandes *Grives* ; deux *Jaunes d'œufs*, & deux *Mammelons blancs*.

V. FAM.
LIMAÇONS.

* Arg. pl. 7.
lett. N.

* Adans. Hist.
du Sénégal. pl.

13. fig. 4.
* List. tab.


567. fig. 17.

129. Huit belles Nérîtes des Indes ; savoir, une blanche, marbrée de fauve clair, à trois larges bandes longitudinales cramoisies ; deux à trois bandes pourpre, & bariolées de blanc & de verdâtre ; une de même espèce, mais à bandes plus prononcées, & taches verdâtres isolées ; une gris de lin, tachetée par zone de brun & de verd céladon, à quatre orbes de forme bombée, à bouche nacrée & doublée en dessus de blanc mat ; ce qui a fait nommer cette Coquille *Bouche double* ; une de même espèce, dépouillée, d'une belle nacre, à tête verd d'émeraude & à stries circulaires bien prononcées ; deux blanches, umbiliquées, à lignes roussâtres, transversales & onduleuses* , & deux *Quenottes saignantes*.

* List. tab.

512. n°. 1.

130. Sept Nérîtes des Indes peu communes ; savoir, deux à bandes longitudinales, alternatives blanches & noires, & à tête aurore ; une à bandes alternatives noires & blanches nuées de

lilas ; deux de même espèce, dont les bandes 
noires & blanches sont marbrées de jonquille ^{V. FAM.}
dans l'une, & de jaune dans l'autre ^{LIMAÇONS:} ; deux
Bouches doubles ; plus six petites Nérîtes, à lé- ^{1 Arg. pl. 76}
vre extérieure non garnie de dents, de Lister ; ^{lett. M.}
qui sont, la blanche à lignes noires fines, ondu-
leuses, ombrées ² ; celle à lignes larges, blan- ^{2 List. tab.}
ches & noires alternatives ³ ; celle à taches jau- ^{604. fig. 24.}
nâtres ⁴ ; l'ondulée ⁵ ; la réticulée ⁶ ; & la blan- ^{3 Ibid. fig.}
che à taches noires triangulaires ⁷. ^{25. 4 Ibid. fig.}

131. Deux petites Nérîtes des Indes, & ra- ^{16. 1 Ibid. fig.}
res, dont une blanc sale nué de gris, à stries ^{27. 6 Ibid. fig.}
transversales onduleuses, & à un rang d'épines ^{28. 7 Ibid. fig.}
couronnant son premier orbe ; on la nomme
Epineuse ⁸ ; & une blanche, nuée dans deux ^{29. 8 Rumph. tab. 22. lit. O.}
bandes longitudinales de jonquille pâle, umbi-
liquée & à stries longitudinales & transversales,
piquées, partout où elles se croisent, d'un petit
point creux.

132. Vingt-une jolies Nérîtes, d'espèces, for-
mes, couleurs & marbrures déjà décrites, &
très-variées.

133. Idem.

134. Trente-quatre Nérîtes, d'espèces, for-
mes & couleurs non moins variées que les
précédentes, dont deux d'une beauté singu-
lière, à trois zones orangées ; & tachetées de
verd & de noir sur un fond blanc.

135. Deux cartons contenant soixante-

122 COQUILLES UNIVALVES

**V. FAM.
LIMAÇONS.**

seize petites Nérîtes des Indes & d'Amérique ; d'un très-beau choix , & d'une très-grande variété.

136. Deux cartons contenant cent trente Nérîtes , plus petites encore que les précédentes, des mêmes parages, & non moins variées.

137. Quatre Nérîtes des Parages de Hollande , recouvertes d'une incrustation grise granuleuse & épineuse , qui paroît être un ouvrage de Polype ; l'une est occupée par un *Bernard l'Hermite*. Six petites Nérîtes de Lister *. Un carton contenant soixante - quinze

* List. tab.
605. fig. 31. &
tab. 606. fig.
34. 35. 36. 37.
38.

* List. tab.
601. fig. 18.

Nérîtes choisies & très - variées. Une petite boîte de semences de Nérîtes de la Barbade , d'un verd clair. * Une autre de petites Nérîtes du Brésil , bariolées de diverses couleurs, & nommées *Pois de Mer*. Une grosse Nérîte fauve découpée en spirale pour en faire voir le dedans, & six opercules de Nérîtes de différentes grandeurs , dont trois variétés *.

* Gualt. tab.
70. litt. P. Q.
Rumph. tab.
20. n°. 5 & 6.
List. tab. 560.
fig. 4.



GENRE TROISIÈME.

LES SABOTS.

138. **U**N grand Sabot des Indes , à base ap-
plarie , nommé *l'Escalier* ou *le Cadran* *. V. FAM.
LIMAÇONS.
139. Un *Cadran* semblable au précédent. * Séba , tab.
40. n°. 1 & 2.
140. Un grand *Cadran* de la Côte Coro-
mandel , à stries transversales , plus profondes ,
à taches moins régulières & plus grandes que
celles des précédents , dont il est une variété *. * Ibid. n°. 41 & 42.
141. Deux *Cadrans* d'une troisième variété,
& moins grands que les précédens *. * Ibid. n°. 13 & 14 Arg.
pl. 8. lett. M.
142. Quatre Sabots de forme peu élevée :
sçavoir , deux d'Amérique umbiliqués , l'un
blanc nacré , & l'autre verd nacré , appelés
l'Eperon , tous deux grands dans cette espé-
ce * ; & deux *Cadrans* de moyenne grandeur ,
de l'espèce de ceux des articles 140 & 141. * List. tab.
622. fig. 9.
Arg. pl. 8. let.
Fl.
143. Neuf Sabots ; sçavoir , deux des Indes
à stries granuleuses , à bouche nacrée , & à um-
bilic , connus sous le nom de *Bouton de ca-*
misole * ; deux de la Méditerranée , aussi um-
biliqués , & de l'espèce nommée *Sorciere* *. Un * Arg. pl. 8.
lett. L. Q. List.
pl. 637. fig. 25.
* Arg. pl. 8.
lett. S.
Eperon semblable à ceux de l'article précédent ,
à sa couleur près , qui est nuée de citron , de
verd & de blanc. Deux autres petits *Eperons*
fauve - clair , de forme fort élevée , & sans

124 COQUILLES UNIVALVES

 umbilic *, & deux Cadrans semblables à ceux
V. FAM. de l'article 141.

LIMAÇONS.

* Séba. tab.
59. n°. 5 & 6.
Rumph. tab.
20. litt. I.

144. Dix Sabots par pendans deux à deux ;
sçavoir, deux *Eperons* de moyenne grandeur
& de la première variété ; deux de la seconde
variété, mais à pointes moins saillantes, dont
un dépouillé. Deux *Boutons de Camisole*,
deux *Sorcières* & deux *Cadrans*.

* Liff. tab.
527. fig. 13.

145. Deux Sabots des Indes, rares & en
pendant ; l'un blanc-fale, mêlé de verdâ-
tre, de forme conique un peu élevée, à stries
longitudinales larges & un peu onduleuses, à
trois tours de spire, à bords dentelés & à base
concave * ; l'autre nué de verd & de gris-
de-lin, de forme conique plus élevée, à stries
longitudinales moins larges & moins pronon-
cées, à sept tours de spire, à base très-con-
cave, & umbiliqué.

146. Deux Sabots d'Amérique, de forme
conique, à robe recouverte de diverses sortes
de coquilles, ou fragmens de Coquilles, de
Madrépores, de Cailloux, &c. à orbes ren-
flés, raboteux, comme hachés à coups de
marteau, & se recouvrant l'un l'autre de haut
en bas, à base très-concave, & striée en spi-
rale, & de l'espèce nommée en France *Fri-
pière*, & en Amérique *Conchiliologie*. Ceux-
ci sont très-grands dans leur espèce.

147. Trois *Fripieres* moins grandes que les précédentes , dont une chargée d'un grand nombre de très - jolies Coquilles , & les deux autres en pendant , moins chargées de Coquilles , mais sur chacune desquelles on voit un Fongipore de l'espèce nommée *Œillet de Mer*.


V. FAM.
LIMAÇONS.

148. Deux Sabots des Indes & très-rares , noirs , à sept orbes bombés , à stries longitudinales , obliques ; onduleuses , croisées irrégulièrement par d'autres transversales , à base fauve dans l'un , fauve nué de noir & de verd d'émeraude dans l'autre , & à bouche d'une très-belle nacre.

149. Douze Sabots par pendans deux à deux , sçavoir , deux des Indes à tête élevée , & à plusieurs étages chargés de tubercules finissant en pointe , qui les ont fait nommer la *Pagode* ou le *Toû Chinois* * ; deux de la Méditerranée de forme moins élevée , à cinq orbes renflés , & couronnés de tubercules longitudinaux en forme de plis , à bouche nacrée , & à lèvre inférieure bordée d'aurore * ; deux de même espèce dépouillés & nacrés : deux *Sorcieres* , deux *Boutons de Camisole* , & deux *Cadrams*.

* Arg. pl. 8.
lett. A.
Rumph. tab.
21. litt. A.

* Bonan. cl.
3. n°. 11.

150. Huit Sabots ; sçavoir , deux grands umbiliqués , à tête élevée , de l'espèce nommée *Cul-de-lampe* , & qu'on appelle plus particulièrement *Bouton de la Chine* * , l'un desquels

* Arg. pl. 8.
lett. C.

126 COQUILLES UNIVALVES

~~est~~ est dépouillé de distance en distance jusqu'à la na-

V. FAM. cre. Deux verds & blancs, dont toutes les spires
LIMAÇONS. sont chargées de petites tuiles couchées de haut

* Gualt. tab. en bas, un peu saillantes, & à bouche nacrée *.
52. litt. H.

Deux de l'espèce des troisième & quatrième de
l'article précédent, dont un conserve son oper-
cule, & deux des Indes, verd nué de blanc,
à robe réticulée, & à grosses côtes obliques on-
duleuses *.

* Arg. pl. 8.
lett. L.

151. Deux *Culs-de-lampe* de l'espèce des
deux premiers de l'article précédent, mais plus
grands.

152. Deux autres de même espèce, mais à
base plus large, l'un desquels est taché par
flammes plus grandes & moins confuses; l'au-
tre est en partie dépouillé jusqu'à la nacre.

* Gualt. tab.
60. litt. C.

153. Cinq *Culs-de-lampe* moins grands que
les précédens : sçavoir, un blanc, fauve &
verd, à stries circulaires granuleuses * : un à-
peu-près de même forme, & dépouillé en li-
gne spirale, & trois umbiliqués, dont un à
spirale bordée d'un cordon de tubercules *, &
les deux autres de l'espèce de ceux de l'article

* Rumph.
tab. 21. n°. 3.

151.

154. Seize *Culs-de-lampe* de moyenne gran-
deur : sçavoir, deux *Toûs Chinois* de nos mers,
verdâtres, nués de blanc-sale, à étages moins
saillans, & à moins vive arrête que ceux des
Indes *; deux *Culs-de-lampe* verds nués de

* Gualt. tab.
60. litt. M.

blanc , à base dentelée , & à tours de spire , chargés de tubercules *. Deux des mêmes couleurs , à base plus large , granuleuse & dentelée , à stries tuberculeuses , & umbiliqués * ; deux à flammes longitudinales , alternatives blanches & rouges , à stries granuleuses , & umbiliqués * : deux marbrés de blanc & de verd , de forme un peu renflée , à stries granuleuses & tuberculeuses , aussi umbiliqués * ; deux à flammes longitudinales alternatives blanches & vertes , à stries granuleuses , & à base un peu concave * : deux de l'espèce du premier & des deux derniers de l'article précédent , & deux dépouillés.

155. Dix-neuf Culs-de-lampe de moyenne grandeur , & au-dessous ; sçavoir , deux lisses marbrés de rouge & de violet , à orbes séparés par un cordon * ; deux à stries fines circulaires , marbrés de blanc & de jaunâtre * ; deux couleur de fouci , lisses & à bouche moins comprimée * ; deux rose-seche , à stries circulaires fines & granuleuses , à base un peu convexe , tachetés çà & là de petits points rougeâtres *. Un rare à stries circulaires blanches & ficelées , & à cannelures noires , chargées elles-mêmes de stries obliques très-fines , à base plate , & umbiliqué. Deux petits à robe-grise tachetée de violet-foncé , à cinq étages de spire bombés & détachés , à côtes longitudinales un peu tuberculeuses , & umbiliqués. Un cou-



V. FAM.
LIMAÇONS.

* Gualt. tab.
60. litt. N.
* Ibid. litt. O.

* Ibid. tab.
61. litt. E.

* Ibid. litt.
DD.

* List. tab.
631. fig. 17.

* Gualt. tab.
61. litt. B.
* Ibid. litt.
G.

* Ibid. litt.
L.

* Ibid. litt.
M.

128 COQUILLES UNIVALVES

V. FAM.
LIMAÇONS.

leur de rose, à larmes blanches disposées régulièrement & à distances égales autour de la spirale, à stries circulaires, fines & granuleuses, & umbiliqué. Un marbré de blanc & de rouge, à stries circulaires granuleuses & tuberculeuses. Deux tachetés de verd, de noir & de violet-clair, à stries cordelées, à base renflée, & à bouche nacrée, doublée de blanc mat, ce qui les fait nommer *Bouches doubles*, & quatre dépouillés, dont deux umbiliqués.

156. Neuf gros Sabots, sçavoir, deux d'Amérique blancs nus de couleur de rose pâle & de verd, à cinq orbes renflés, bordés chacun dans le bas de trois cordons, tuilés de distance en distance, & chargés de stries & de plis tuberculeux, à base striée & tuilée circulairement, & à bouche dentelée * ; deux *Culs-de-lampe* de l'Isle de France, blancs nus de verdâtre, de forme conique très-élevée, à côtes tuberculeuses saillantes le long de la spirale & à base dentelée * ; un du même endroit, gris verdâtre, à grosses côtes longitudinales obliques, disposées de façon que celles d'un pas répondent aux cannelures de l'autre pas, à base striée circulairement & dentelée ; deux comme les troisième & quatrième de l'article 149, & deux comme les derniers de l'article 150.

* Séba, tab.
60. n°. 1 & 2.

* Bonan. cl.
8. fig. 90.

157. Trente-deux jolis Sabots de couleur & de

de formes très-variées , & des espèces déjà décrites : sçavoir , dix *Cul-de-lampes* gran leux, dont deux dépouillés ; huit lisses, dont quatre dépouillés ; quatre striés , dont un dépouillé & un découpé en spirale pour faire voir le dedans ; deux *Toits Chinois* de nos mers , deux *Cadrans*, deux *Boutons de Camisole*, deux *Bouches doubles* , & deux petits Sabots de l'espèce des troisième & quatrième de l'article 149.

~~—————~~
V. FAM.
LIMAÇONS.

158. Neuf Limaçons rares ; sçavoir , deux des parages de Mississipi , violet très-foncé , lisses , à cinq orbes renflés , & à tête orangée , l'un desquels est dépouillé en partie jusqu'à la nacre , qui est striée circulairement , & d'un bel orient ; six Magellaniques papyracés , perlés & à stries circulaires très-fines , dont deux à petites zones couleur de rose ; deux à raies noires circulaires , & deux blancs ; un gris-noirâtre des Indes , à grandes taches blanches quarrées , placées à distances égales dans le bord supérieur de chaque orbe , & à mouchetures blanches dans le reste , à stries circulaires très-fines , de forme un peu applatie , à six orbes , dont le premier est très-large & umbiliqué.

159. Deux cartons contenant 120 petits Sabots des Indes , tous de même forme , un peu applatie , de couleurs , marbrures & desseins extrêmement variés.

130 COQUILLES UNIVALVES

160. Idem.

W. FAM.
LIMAÇONS.

161. Quatre très-grands *Cul-de-lampes* ; savoir , un blanc flambé régulièrement de rougeâtre , à orbes renflés dans le bas , un peu concaves dans le haut , & à base un peu convexe ; un à flammes plus irrégulières de l'espèce du premier de l'article 150 , auquel adhère un Madrépore , & deux dépouillés & découpés en spirale pour en faire voir l'intérieur.

SIXIEME FAMILLE.**B U C C I N S.**

Ce sont des Coquilles contournées en volute, à plusieurs spirales, dont la plus basse est beaucoup plus grande que les autres ; ce qui les rend grosses par le milieu. Elles sont ordinairement dépourvues de pointes & de tubercules, & ont toutes une grande bouche oblongue qui est ou entière, ou échancrée, ou terminée par une queue plus ou moins longue, d'où nous les diviserons en quatre genres ; sçavoir,

VI. FAM.
BUCCINS.

1°. Les Buccins à bouche entière, dépourvue de queue.

2°. Les Buccins à bouche échancrée, dépourvue de queue.

3°. Les Buccins à bouche garnie d'une queue peu longue.

4°. Les Buccins à bouche garnie d'une longue queue.

VI. FAM.
BUCCINS.

Les Naturalistes ont été fort peu d'accord jusqu'à présent sur la distribution de cette famille, qu'ils ont aggrandie ou resserrée, suivant l'idée plus ou moins étendue qu'ils attachoient au mot *Buccin*, qui, de lui-même, est assez vague. Nous aurions bien désiré suivre une autre route, en partageant cette nombreuse famille en plusieurs autres petites, dont les caractères auroient été plus précis ; mais, comme nous n'avons dessein que de jeter un peu d'ordre dans ce catalogue, & non de faire un traité de Conchiliologie, nous avons cru qu'il suffiroit de suivre les divisions déjà reçues, en y faisant les changemens qui nous ont paru indispensables.



GENRE PREMIER.

BUCCINS A BOUCHE ENTIERE, DÉPOUR- VUE DE QUEUE.

162. **U**N Buccin des Indes, revêtu de son épiderme marron à huit orbes, à bouche couleur de chair garnie de deux dents, & de forme approchante de celle d'une oreille, ce qui l'a fait nommer *Oreille de Midas*, il est très-grand dans son espèce *.

VI. FAM.
BUCCINÆ.

163. Une *Oreille de Midas* de l'espèce de la précédente, & de même grandeur, mais dépouillée, & d'une belle couleur de chair.

* Arg. pl.
10. lett. G.
Séba, tab. 71.
fig. 21 & 22.

164. Deux petites *Oreilles de Midas*, dont une grise à stries longitudinales onduleuses & granuleuses, à bouche blanche garnie de deux dents, & à quatre orbes seulement *; l'autre est semblable, mais dépouillée.

* Liff. tab. 32.
fig. 30.

165. Cinq petites *Oreilles de Midas*; sçavoir, deux flambées de blanc & de marron-clair dans le corps, à levres retroussées en dehors, l'extérieure sinueuse & l'intérieure armée d'une seule dent; deux fasciées de blanc & de marron-clair à tête peu élevée, à bouche garnie de deux dents, & imitant encore mieux que les précédentes la forme d'une oreille *, & une légère-

* Ibid. tab.
834. fig. 59.

134 COQUILLES UNIVALVES

ment striée, grise, fasciée de blanc, à bouche garnie d'une seule dent, & nommée *Aveline* *.

VI. FAM.
BUCCINS.

* List. tab.
835. fig. 58.

166. Quatre Buccins de forme à-peu-près semblable aux précédents, & nommés pour cela *fausse Oreille de Midas*; savoir, deux de Cayenne, dont un fauve-clair, & l'autre fauve-nué de gris-de-lin, à stries fines longitudinales, à cinq orbes un peu bombés, à bouche

* Ibid. tab.
21. fig. 21.
Séba, pl. 71.
f. 17-20.

plus large que l'*Oreille de Midas* & sans dents *; un de Rio de la Plata, qui ne diffère de ceux-ci que par ses orbes moins renflés, & sa couleur orangée, & un de Rio-Janeiro, à orbes plus renflés que tous les précédents, revêtu de son épiderme, fascié par bandes longitudinales de fauve clair & de fauve roux. Ces Coquilles, ainsi que celles des articles 162, 163 & 164 sont terrestres, & nous ne les avons mises ici, que pour faire voir sous un seul point de vue, toutes les variétés de cette espèce de Buccins.

167. Deux Buccins à orbes renflés, & nommés *Perdrix rouges*, l'un flambé de blanc & de rouge-brun & dépouillé *, l'autre avec son épiderme marron-foncé.

* Séba pl. 71.
fig. 2 & 3.
List. tab. 579.
f. 32.

168. Deux autres Buccins, dont un revêtu de son épiderme, à raies longitudinales onduleuses, alternativement blanches & rouge-brun, & grand dans son espèce, nommée le *Zebre* ou l'*Ane rayé* *; & une *Perdrix rouge*, semblable

* Séba, ibid.
fig. 4 & 5.
Arg. Append.
pl. 2. lett. L.

à celles de l'article précédent, mais dont on a coupé une portion du premier orbe & la columelle entiere.

VI. FAM.
BUCCINS.

169. Une *Perdrix rouge* & un *Ane rayé*, moins grands que les précédens.

170. Deux Buccins de la forme des précédens; sçavoir, un à bandes longitudinales, nuées de violet & de bleu, à tête flambée de rouge & de jaune, & à bouche violette *, & une *Perdrix rouge*.

* Liff. tab.
581. f. 35.

171. Deux Buccins en pendant, de l'espèce du premier de l'article précédent, mais dépouillés de leur épiderme, polis, & devenus par-là d'un couleur de rose très-vif.

172. Vingt petits Buccins; sçavoir, deux peu communs blancs, flambé par bandes longitudinales onduleuses de brun & d'incarnat, à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents: deux fauves tigrés de blanc, à levre extérieure en bourrelet, dentelée en-dedans, & du reste semblables aux précédens. C'est la *Porcelaine* de M. Adanson *; quatre blancs mouchetés par zones de petites taches ou traits longitudinaux marron, de forme semblable aux précédens *; deux blanc-jaunâtre, l'un flambé, l'autre pointillé de marron, à stries circulaires très-fines, & à orbes renflés *; deux très-petits de même forme à robe flambée de blanc & de violet; deux petits

* Ibid. tab
818. fig. 29.
Adanson, pl.
4. f. 1.

* Liff. tab
803. fig. 10.
Gual. tab. 22
litt. Q.

* Ibid.
44. litt. Z.

136 COQUILLES UNIVALVES

VI. FAM. BUCCINS. très-singuliers à robe grisâtre, poreuse & tuberculeuse, où l'on ne remarque aucunes spirales, & à très-petite bouche ovale, nommés *Mures de haies*; deux verd-bleuâtre à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents, & à tête se confondant avec le corps; deux plus petits, qui ne diffèrent des précédents qu'en ce que la levre extérieure est garnie de cinq dents*, & deux gris légèrement fasciés, privés totalement de tête, & à levre garnie de trois dents,

* Lft. tab. 36. f. 1.

GENRE SECOND.

BUCCINS A BOUCHE ÉCHANCRÉE, DÉPOURVUE DE QUEUE.

173. **U**N Buccin très-rare rayé par zones alternatives de blanc & d'orangé-vif, à tête assez élevée, à clavicule blanche, finissant en bouton, & nommé *Pavillon d'Orange**; il est de la plus parfaite conservation, & porte deux pouces cinq lignes de long, sur un pouce trois lignes de large.

* Rumph. tab. 37. n°. 2.

174. Deux Buccins des parages Magellaniques, rares & en pendant, à robe marron-foncé, à stries transversales tuilées, alternativement plus ou moins élevées, à levre extérieure

dentelée & armée en-dedans vers l'extrémité inférieure d'une dent saillante , ce qui leur a fait donner le nom de *Licorne*.

VI. FAM.
BUCCINS.

175. Deux Buccins en pendant peu communs , blancs , à grandes taches marron , disposées par zones , & paralleles les unes aux autres , umbiliqués , & des plus grands dans leur espèce *.

* Séba pl. 73.
n°. 23 & 26.
Bonan. cl. 3.
n°. 70.

176. Deux Buccins semblables aux précédents , mais moins grands.

177. Deux Buccins blancs, flambés & tachetés de fauve , & de même forme que les précédens , à cela près , que les pas en sont plus creusés en-dedans en forme de sillons *.

* Séba , ibid.
n°. 21 & 22.
Bonan. cl. 3.
n°. 370. Arg.
pl. 17. lctt. M.

178. Dix Buccins ; sçavoir , un rare blanc à stries circulaires , les unes élevées , les autres non , à côtes longitudinales rabotteuses , à fix orbes terminés par des pas aplatis , sur lesquels les côtes se prolongent , à levre extérieure dentelée & à umbilic ; deux gris à stries fines circulaires , à côtes longitudinales obliques , qui s'étendent depuis la clavicule jusqu'à la moitié du corps , & à pas des orbes arrondis * ; deux de forme à-peu-près semblable aux premiers de cet article , mais à stries plus fines & plus serrées en vive arrête , & un peu tuilées * ; un blanc nué de fauve-roux , à robe réticulée , & à levre intérieure garnie de deux dents * ; un ventre de biche à stries circulaires , dont les in-

* Séba , pl.
37. n°. 76, 77.

* List. tab.
896. f. 16.

* Ibid. tab.
830. f.

138 COQUILLES UNIVALVES

VI. FAM. BUCCINS. tervalles sont remplis d'autres plus fines, à pas des orbes arrondis, & du reste semblable aux précédens, aux dents près, dont il est dépourvu; deux blancs à stries circulaires peu prononcées, & à cinq orbes, dont les pas sont un peu concaves en se relevant, & un de l'espèce de ceux de l'article 177, mais différem-

* Séba, pl. ment tacheté *.

73. n°. 24 &
25.

179. Vingt-deux petits Buccins; sçavoir, deux rares, blancs nués de fauve, à stries circulaires fines & serrées, à levre extérieure, finissant en un bourrelet, & dentelée en-dedans*; deux de même couleur à stries circulaires ficelées & ondées, séparées par de larges canne-

* List. tab.
831. f. 55.

* Séba, tab.
52. n°. 31.

lures, à cinq pas aplatis, & umbiliqués*; un fauve nué de gris à grosses stries longitudinales granuleuses, fort distantes les unes des autres, à six orbes, dont les pas sont un peu aplatis; un fauve blond, à robe en réseau granuleux, ventru & à huit orbes; quatre, dont deux blancs & deux gris, à côtes longitudinales, & à levre intérieure, retroussée jusqu'au haut du premier

* List. tab.
970. f. 24.

* Ibid. tab.
971. f. 26.

orbe*; un très-petit à une bosse sur le dos, & à rebroussement de la levre jusqu'au haut du troisième orbe*; quatre blancs, dont deux fasciés de souci, & deux partie de souci & partie de marron; quatre, dont deux blancs & deux marron à stries fines circulaires, tuilées; deux fauves ventrus à pas des orbes bordés

d'un rang de taches marron ¹, & deux fauves roux, dont un lisse à trois côtes longitudinales blanches, & un à stries circulaires bien prononcées : plus, un collier dont les Indiennes se parent, fait de petits Buccins, dont le rebroussement des levres s'étend jusqu'à la clavicule.

VI. FAM.
BUCCINS.

¹ List. tab.
975. f. 30.

180. Vingt-cinq autres petits Buccins intéressans ; sçavoir, deux blancs marbrés par grandes taches de fauve rous, granuleux par bandes longitudinales ²; deux des mêmes fond & forme que ceux-ci, à lignes circulaires cannelée & lisses, aux derniers orbes près, qui sont striés en longueur ³; deux fauve-roux & marron, à côtes longitudinales chargées de stries onduleuses ⁴; deux blancs & fauves, nués de marron, à robe réticulée, & à levre garnie de dents ⁵; deux blancs fasciés de marron, à stries circulaires noueuses ⁶; deux petits noirs de la Barbade ⁷; deux fasciés par zones alternatives de blanc & de noir ⁸; un blanc strié, & fascié de zones noueuses marron ⁹; deux marron, fasciés de lignes blanches, à côtes longitudinales & stries fines transversales ^{*}; deux de même forme, mais entièrement marron; un blanc à côtes longitudinales chargées de stries transversales onduleuses & bien prononcées; un gris-de-lin à stries circulaires fines & granuleuses; un fascié de taches alternatives blanches & marron, à stries circulaires très-fines

² Gualt. tab.
44. litt. G.
Argen. pl. 9.
lett. I.

³ Rumph.
tab. 29. litt. P.

⁴ Ibid. litt.
O.

⁵ List. tab.
965. f. 21.

⁶ Ibid. tab.

969. f. 23.

⁷ Ibid. tab.

976. f. 32.

⁸ Ibid. tab.

834. f. 61.

⁹ Ibid. tab.

954. fig. 5.

^{*} Gualt. tab.

44. litt. C.

VI. FAM.
BUCCINS.

entre quelques autres plus grosses ; un marbré de blanc & de marron à stries circulaires peu prononcées , & deux lisses, verdâtres, à pas des orbes granuleux.

181. Un grand Buccin Magellanique rare , blanc , nué de fauve & de jaune , avec quelques zig-zags marron , de forme allongée , à sept orbes terminés par un mammelon , à levre intérieure garnie de trois dents & à robe lisse chargée de quelques plis ou rides.

182. Un semblable , à cela près que les rides en sont nuées de verd-clair , & que les zig-zags n'y paroissent point.

183. Deux Buccins blancs tachetés par zones , l'un de rouge sanguin & de l'espèce nom-

¹ Arg. pl. 9. lett. E. Séba , tab. 51. n°. 1. mée *Thiare* ou *Couronne Papale* ¹ ; l'autre d'orange , & connu sous le nom de *Mitre* ² , tous deux de la grandeur de ceux que nous citons dans Séba.
² Arg. pl. 9. lett. C. Séba , ibid. n°. 13 & 14.

184. Une *Thiare* un peu moins grande que ¹ Séba , ibid. n°. 2. la précédente , & une *Mitre* de même grandeur.

185. Cinq Buccins moins grands que les précédens ; sçavoir , un lisse ventre de biche nué de blanc, nommé l'*Ivoire* ou *Mitre jaune* ⁴ ; trois autres Mitres, dont une semblable à celle de l'article précédent ; une à stries circulaires flambée de taches rougeâtres , nommée en Hollande *Thiare bâtarde* ⁵ ; une légèrement
⁴ List. tab. 974. f. 29.
⁵ Séba, pl. 50. n°. 49. List. tab. 822. f. 40.

striée & mouchetée par zones circulaires, de taches rouge-brun, nommée la *Cardinale* *, & une *Thiare* semblable à celle de l'article précédent.

VI. FAM.
BUCCINS.

* Séba, pl.
50. n°. 50 &
51. List. tab.
838. n°. 65.

186. Sept Buccins, dont deux petites *Thiars* par pendant, marbrées de jonquille, de blanc & de roux, à stries circulaires piquetées de petits trous, espèce rare *; une autre variété de *Thiare*, appelée la *Thiare à trous*, & les quatre variétés de Mitre de l'article précédent.

* Séba, pl.
50. n°. 29.

187. Sept autres, dont cinq *Mitres* des espèces de l'article 185, & deux *Thiars* de celles de l'article précédent.

188. Dix jolies Mitres par pendans; savoir, deux marron à zones jonquilles, à stries longitudinales vers le sommet, & transversales vers le bas *; deux blanches, à lignes & bandes vertes, noires & jaunes, à côtes longitudinales & stries transversales *; deux blanches pointillées l'une d'orangé, l'autre d'orangé & de brun, à stries qui se croisent en treillis*; deux blanches nuées de verdâtre, fasciées & pointillées par zones de rouge, à côtes longitudinales croisées par des stries circulaires *, & deux de l'espèce de celle de l'article 183, dont les taches sont d'un beau rouge de corail.

* Gualt. tab.
53. litt. E.

* Ibid. 54.
litt. B.

* Ibid. litt.
H.

* Arg. pl. 9.
lett. V.

189. Vingt-huit petits Buccins par pendans; savoir, deux blancs fasciés de verd & de zones noires interrompues, à côtes élevées,

VI. FAM. BUCCINS. & nommés *Minarets*¹ ; deux *Minarets* à zones noires & vertes de diverses nuances non interrompues² ; deux Buccins lisses à bandes longitudinales alternatives & onduleuses , blanches & rouges dans l'un , fauves & rouges dans l'autre³ ; deux petits lisses marron , pointillés de gris⁴ ; deux blancs nués de gris , légèrement striés , à pas des orbes granuleux⁵ ; deux fauve-clair , à côtes longitudinales chargées de stries circulaires faillantes en vive arrête⁶ ; deux marron très-foncé , à zones étroites blanches , & à côtes longitudinales striées transversalement⁷ ; deux blancs à côtes moins faillantes , pointillés de rouge-sanguin⁸ ; deux légèrement striés à bandes longitudinales alternatives blanches & rouge-foncé , avec une zone blanche transversale ; deux à robe marron-foncé avec une zone blanche ; quatre comme les huitième & treizième de l'article 179 , & quatre comme les septième & dix-neuvième de l'article 180.

¹ Arg. pl. 9. lett. Q. Gualt. pl. 54. litt. F. ² Gualt. ibid. litt. A. ³ Ibid. litt. L. List. tab. 819. f. 35. ⁴ List. tab. 824. f. 44. ⁵ Ibid. tab. 977. f. 34. ⁶ Arg. pl. 9. lett. O. Gualt. tab. 51. litt. G. ⁷ Séba , pl. 49. n°. 42. ⁸ List. tab. 822. f. 38.

190. Vingt-quatre autres petits de forme effilée ; sçavoir , un verdâtre imitant la corne , à robe réticulée & granuleuse , & extrémités des orbes bordés d'un petit rang de tubercules oblongs ; un blanc réticulé , à taches marron de distance en distance sur une bande circulaire de même couleur⁹ ; deux blancs à côtes longitudinales granuleuses , mouchetées par zones de rouge ; un à robe blanche très-fine.

⁹ Séba , pl. 49. n°. 19 & 20.

ment réticulée, & à stries circulaires rouges plus saillantes, écartées les unes des autres; deux blancs marbrés, l'un de jaune-obscur, l'autre de gris-de-lin, à robe réticulée & granuleuse; un lisse blanc, marbré de lignes onduleuses marron-foncé; un *Minaret* fascié de blanc, de brun, de verd & de bleu-pâle; deux autres de l'espèce des troisième & quatrième de l'article précédent; huit *Mitres* des variétés détaillées dans l'article 188, & cinq autres *Buccins* des variétés déjà décrites.

VI. FAM.
BUCCINS.

GENRE TROISIEME.

*BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNÉ
QUEUE PEU LONGUE.*

191. **U**N Buccin très-rare, fauve-clair, à fascies élevées & tuberculeuses marron, à stries des intervalles peu élevées, à six orbes, à très-petite queue, & à levre extérieure en bourrelet, nommé en Hollande l'*Argus fascié* *; il porte un pouce dix lignes de long.

* Rumph.
cab. 49. litt. B.

192. Deux Buccins très-rares & en pendant, blanc-sale, à grosses stries applaties, & néanmoins très-saillantes, à larges & profondes canelures, à quatre orbes, le premier desquels est chargé de trois stries & de deux canelures,

144 COQUILLES UNIVALVES.

VI. FAM. BUCCINS. tandis que les autres n'ont que deux stries & une cannelure, non compris les pas creusés en-dedans & plats qui les séparent : ces Buccins sont grands dans leur espèce, nommée le *Cabestan*.

193. Quatre petits Buccins ; sçavoir deux lisses à pas des orbes aplatis & saillants en-dehors presque en vive arrête, nommés en Hollande *Perrons* *, & deux petits *Cabestans*.

* List. tab.
924. f. 16.

194. Un rare & très-beau Buccin Magellanique, blanc nué de gris-de-lin, à sept orbes renflés, chargé de côtes longitudinales en vive arrête & papyracées, représentant de longues feuilles inclinées toutes vers la levre extérieure, à bouche presque ovale, à petite queue recourbée, creusée en gouttière, & umbiliqué. On le nomme *Buccin feuilleté*. Celui-ci porte trois pouces cinq lignes de long sur deux pouces deux lignes de large.

195. Deux Buccins de même espèce, mais moins grands.

196. Deux autres moins grands encore que les précédents.

197. Deux Buccins Magellaniques rares, fauve-clair, à grosses stries longitudinales & transversales formant un réz au qui imite les étoffes gaufrées, à cinq orbes bombés, à clavicle rentrant en-dedans, à queue courte un peu

peu recourbée & à coque mince ; espèce nommée *Gaufre*.

VI. FAM.
BUCCINS.

198. Cinq petits Buccins rares ; sçavoir , un des Indes blanc & feuilleté , mais différent de ceux de l'article 194 par sa forme effilée , & ses feuilles plus éparées & moins inclinées ; un blanc ventru , feuilleté aussi , mais à feuilles moins saillantes , moins fines & plus serrées ; deux Magellaniques blancs nués de fauve , de la forme du précédent , à côtes longitudinales arrondies , & à stries transversales ; & un blanc de la Méditerranée , granuleux par compartimens , à queue & partie des levres recouvertes de Corail rouge.

199. Quatorze Buccins , dont dix par pendans ; sçavoir , deux rayés par fines zones de blanc & de brun , à sept orbes un peu bombés & à bouche blanche, nommés *Bouches de lait* * ; deux blancs , à trois zones marron-clair , dont deux sur le premier orbe & une sur les autres, à côtes longitudinales & à stries fines transversales , s'élevant sur les côtes ; un à-peu-près de même forme , blanc nué de fauve , à côtes longitudinales moins nombreuses & moins prononcées * ; un ventru à stries circulaires marron , & cannelures fauves , à levre extérieure dentée & en bourrelet , & à clavicule rentrante * ; un à tubercules blancs & cannelures marron * ; deux blancs réticulés , à bouche garnie de dents ,

* Gualt. tab.

43. litt. X.

List. tab. 83 ta

f. 55.

* Bonan. cl.


3. f. 343.

* List. tab.

940. f. 36.

* Ibid. tab.

828. f. 506

 & de forme bombée ; deux blancs nués de fauve à grosses côtes longitudinales , à stries transversales , & à bouche violette dentelée ; deux fousi & de même forme , mais à côtes moins élevées & stries circulaires plus grosses , & un très-finement strié , marbré de blanc , de noir & de couleur de rose.

VI. FAM.
BUCCINS.

200. Quatorze Buccins ; sçavoir , huit à stries circulaires granuleuses , interrompues par quelques gros tubercules longitudinaux , à bouche dentelée , & à levre extérieure garnie d'un large bourrelet , mais différens entr'eux par leurs couleurs , qui sont très-vives , & très-variées * ; deux *Bouches de lait* polies ; deux comme les troisième & quatrième , & deux comme les douzième & treizième de l'article précédent.

* Arg. pl. 9.
lett. K. Gualt.
tab. 49. litt. I.

201. Deux Buccins peu communs , blancs , marbrés de quelques taches brunes , à robe réticulée granuleuse , à tubercules disposés comme dans les huit premières de l'article précédent , & à petite queue retroussée *.

* Rumph. tab.
49. litt G.
lett. tab. 102.
f. 86.

202. Un très-rare Buccin du Golfe du Mexique , à robe brune , fasciée dans le premier orbe , de deux zones jaunes , dont la plus haute blanchissant peu-à-peu , suit la spirale jusqu'à la clavicule , à six pas larges & plats garnis de petites lames onduleuses , presque perpendiculaires à leur plan , & bordés chacun d'une suite d'ongles ou de serres en forme de crénelures ,

dont les premières sont creusées en bec de per- ~~roquet~~
roquet ; espèce qu'on peut nommer le *Buccin* VL. FAME
crênelé. BUCCINS.

203. Deux grands & beaux Buccins de l'Isle de France , fauves marbrés de marron-clair & de blanc , à stries circulaires , inégales , granuleuses , & quelquefois tuberculeuses , à bourrelets , disposés comme dans les deux de l'article 201 , & à petite queue recourbée , creusée en gouttière *.

204. Six Buccins ; savoir , un rare fauve taché de brun & de blanc , à grosses stries circulaires , rangées par paires assez distantes les unes des autres , à stries longitudinales obliques , peu apparentes , & assez distantes aussi les unes des autres , formant par leurs rencontres mutuelles de petits tubercules , à huit orbes renflés , & autant de pas obliques , à bouche dentelée , & à deux bourrelets longitudinaux * ; un fauve teint de jaune , à quatre orbes aplatis , ceints de grosses stries doubles peu prononcées sur le corps , à bourrelet situé en arrière de la levre extérieure , qui est en tranchant & non dentelée , & quatre de l'espèce de ceux de l'article précédent , mais plus petits , dont deux blancs nus de jaune.

205. Vingt-deux petits Buccins par pendants ; savoir , deux petits communs , dont un blanc & un fauve dans le corps , & marron à la clau-

* Gualt. tab.

49. litt. G.

Arg. pl. 106

lett. M. Séba,


tab. 57. n° 23.

& 24.

* Séba, pl.

57. n° 30.

148 COQUILLES UNIVALVES

 vicule, tous deux à côtes longitudinales un peu
 VI. FAM. sinueuses, formant au haut des orbes des cou-
 BUCCINS. rones de tubercules, à stries fines transversales, & à huit orbes; quatre blancs, dont deux fasciés de fauve-roux & deux de brun, à stries longitudinales & transversales, formant un réseau granuleux *; deux lisses, dont un grisâtre tacheté par zones de pourpre, à zone blanche tachetée des mêmes couleurs *, & un qui ne diffère du précédent que par son fond & les taches canelle; deux lisses à robe blanche tachetée par zones de marron; deux bleu-pâle, marbrés de roux *; deux blancs à côtes longitudinales & stries fines transversales, de forme bombée, à huit orbes, & à petite queue retroussée; deux blancs marbrés par zones de taches jonquilles dans l'un, rouffes dans l'autre, granuleux par compartimens, à bourrelet uni couvrant la levre extérieure, & se prolongeant dans une direction oblique sur tous les autres orbes, de forme oblongue, & un peu arquée; deux à-peu-près semblables, mais dont la spirale des bourrelets est composée de plus de révolutions, & quatre de l'espèce des douzième & treizième de l'article 199.

* Gualt. tab.
49, litt. E.

* List. tab.
322. f. 41.

* Gualt. tab.
46. litt. F.

206. Deux grands Buccins des Indes, ventrus, imitant le plumage de la perdrix, à trois rangs de bourrelets, & à levre extérieure dentelée, de l'espèce nommée *Trompe Marine* *,

* Séba, pl.
81.

ou *Conque de Triton* ; ils ont un pied cinq pou-
ces de long , & sont posés sur des pieds de bois
en pendant. —

VI. FAM.
BUCCINS.

207. Quatre *Trompes Marines* moins gran-
des que les précédentes , dont deux de l'Amé-
rique * , & deux de la Méditerranée.

* Séba , pl.

208. Six *Trompes Marines* par pendans , &
de grandeur propre à entrer dans des tiroirs * ;
sçavoir , deux des Indes , & deux d'Amérique ,
des plus vives couleurs , les deux autres sont
de nos Mers.

81.

* Rumph.
tab. 28. lit.

209. Deux Buccins ; sçavoir , un des Indes
peu commun , fauve-roux & recouvert d'un
fucus, ventru , à grosses stries noueuses , à lèvre
intérieure ridée , & extérieure garnie de grosses
dents qui laissent de profondes cannelures * ,
& une petite Trompe Marine de la Méditerra-
née , conservant l'animal desséché sortant de la
coquille avec son opercule.

* Bonan. cl.
3. n°. 289.
List. tab. 936.
n°. 31. Séba ,
pl. 57. n°. 30
& 31.

210. Un très-grand Buccin de l'espèce des
Trompes Marines , mais différent des précédens
en ce qu'il est d'un blanc-grisâtre , à côtes lon-
gitudinales & grosses stries transversales , avec
un rang de tubercules sur chaque orbe * ; il a
plus d'un pied , sept pouces de long.

* List. tab.
931.

211. Deux Buccins de la Méditerranée ,
blancs nués de fauve , à stries longitudinales &
transversales , dont les plus grosses forment un
treillis chargé de petits tubercules dans tous les

150 COQUILLES UNIVALVES.

VI. FAM. BUCCINS. points où elles se croisent, à deux rangs de bourrelets sur chaque orbe, & à lèvre extérieure frangée & dentelée.*.

* Gualt. tab.

30. litt. A.

List. tab. 235,

f. 39.

212. Trois Buccins, dont deux blancs marbrés de roux & rayés de brun, à orbes ceints d'un petit cordon granuleux, nommés en France *Tulipes*, & en Hollande *Agathines*, tous deux grands dans leur espèce, l'un desquels conserve son opercule* : le troisième est de l'espèce de ceux de l'article précédent.

* Arg. pl.

10. litt. K.

Séba, pl. 71.

Pl. 23-33.

213. Quatre *Tulipes* à fonds & rayes semblables aux précédentes, mais dont deux sont marbrées de jaune, & deux d'olivâtre.

214. Quatre autres *Tulipes* par pendans, dont deux marbrées d'orangé & de souci clair, & deux de brun obscur.

215. Quatre Buccins; sçavoir, deux blancs nués de fauve clair, à stries circulaires fines & un peu ondées, de forme approchante de celle de la *Tulipe*, & à clavicule en mammelon*, & deux *Tulipes* de moyenne grandeur, blanc nué de bleu, marbré de verdâtre, & rayé de même.

* Séba, pl.

13. Pl. 71.

216. Cinq Buccins; sçavoir, deux à stries circulaires serrées, & à orbes bordés d'une couronne de petits tubercules, à robe brune, bordée au-dessous de chaque pas de deux zones blanches, ce qui détermine l'espèce nommée en Hollande l'*Ethiopienne**, & en France la

* Séba, pl.

10. List. tab.

238. f. 32.

Minime ou la *Cordeliere*, l'un desquels a la tête entièrement recouvert de l'espèce de duvet qu'on nomme *Drap marin* ; un de même espèce, mais rare, en ce que la couleur en est fauve-pâle, & qu'il est destitué de zones ; & deux Buccins flambés de blanc & de roux, à stries circulaires inégales, & à tubercules plus petits encore que les précédens *.

VI. FAM.
BUCCINS.

* Arg. pl.
10. lett. H.

217. Deux Buccins rares de l'espèce de la *Cordeliere*, mais fauve-gri, & à plus gros tubercules.

218. Trois Buccins, dont un très-rare qui ne diffère de la *Cordeliere* qu'en ce que le fond en est cassé au lait, que les tubercules s'y remarquent à peine, & que la forme en est plus allongée, & deux *Cordelieres* de l'espèce des deux premières de l'article 216, mais plus grandes.

219. Trois Buccins rares, dont deux maron, à stries circulaires, & à sept pas aplatis, couronnés de tubercules * ; l'autre est blanc, veiné en longueur de rouge-brun, strié circulairement, à sept pas aplatis bordés de petits tubercules, & à tête peu élevée : on le nomme l'*Unique*, parce que la bouche en est posée à contre-sens des autres *.

* Arg. pl. 2.
lett. A. Séba.
pl. 17. n. 17
& 18.

220. Trois Buccins rares ; savoir, deux blancs nus de fauve clair, à stries circulaires très-fines, à six pas aplatis, dont les bords gra-

* Hist. nat.
207. f. 17.

152 COQUILLES UNIVALVES

VI. FAM. BUCCINS. ~~_____~~ nuleux rentrent en dedans du côté de la columelle, où ils forment un assez large fillon * ; & un de l'espèce des deux premiers de l'article précédent.

* Gualt. tab. 47. litt. A.

221. Quatre petits Buccins, dont deux *Uniques*, & deux de l'espèce des deux premiers de l'article précédent.

222. Deux Buccins rares, ventre de biche, striés circulairement, à sept pas, dont les bords sont chargés de petits tubercules * ; & un de l'espèce des deux premiers de l'article 220, mais blanc de lait.

* List. tab. 47. fig. 12.

223. Dix-neuf petits Buccins ; sçavoir, deux blancs, l'un à stries fines circulaires, l'autre lisse, de forme élevée, à sept orbes bombés * ; un à stries circulaires très-fines, de forme encore

* Ibid. tab. 913. f. 5.

plus ventrue & moins élevée * ; deux blancs nués de fauve, granuleux en treillis, à lèvre extérieure dentelée, & deux rangs de bourrelets


* Ibid. tab. 878. f. 3.

qui se prolongent sur tous les orbes * ; deux qui différent des précédens par une forme plus allongée, & un troisième rang de bourrelets * ;

* Gualt. tab. 49. litt. M. List. tab. 939. f. 34

* Gualt. ibid. litt. I.

deux de l'espèce de ceux de l'article 203 ; deux marron-foncé, à une petite zone blanche dans le bas, ventrus, pesants, à six orbes, & nommés *Plombs* ; un revêtu d'une incrustation épineuse brune, & où loge un *Bernard l'Hermite* ; deux *Bouches de lait* ; deux *Cordelières* ; trois *Tulipes*, dont une découpée en spirale, pour

en faire voir l'intérieur ; & cinq opercules de  nature cornée , qui ont appartenu à différens Buccins , dont un très-grand nommé vulgairement *Feuille de laurier* * ; & cinq autres moins grands , plus ou moins épais , nommés *Ongle odorant* ou *Blatta Bizantia* des Apothicaires *.

VI. FAM.
BUCCINS.

* Rumph. tab.
20. n°. 4.
Gualt. tab. 70d
litt. B.

* Rumph.
ibid. n°. 3.
Gualt. ibid.
litt. C. D.

224. Quatre Buccins blancs, épais & pesants, nommés *Marbres* (ou *Raves*,) dont deux à tête élevée, à lèvre intérieure armée de trois grosses dents , & à cinq orbes légèrement tuberculeux , se recouvrant l'un l'autre * ; & deux à tête moins élevée & orbes aplatis , à queue moins longue , & de forme plus ventrue que les précédens. Plus , deux petits Buccins peu communs , de forme approchante des précédens , à stries fines circulaires peu prononcées , à clavicle fort saillante , en forme de spirale cylindrique ou de tire-bourre , l'un à robe blanche piquetée par zones de points jonquilles , & couronné de petits tubercules * , & l'autre piqueté moins régulièrement de points bruns & orangés *.

* List. tab.
815. f. 25.
Gualt. tab. 46.
litt. C.

* Rumph. tab.
36 n°. 7.

* List. tab.
816. f. 26.

225. Trois grands Buccins , dont un blanc-fale , à tête peu élevée , à six orbes , dont les pas sont un peu aplatis & couronnés de tubercules * ; & deux beaux *Marbres* , blanc de lait , évidés en dedans , & gravés en dessus d'une espèce de mosaïque : cet ouvrage est des Indiens , à qui ces Buccins servent de tasse.

* Gualt. tab.
47. litt. B.

154 COQUILLES UNIVALVES

VI. FAM. BUCCINS. 226. Deux grands Buccins des Indes, rares, de forme un peu renflée, & à coque épaisse blanc de lait, à grosses côtes longitudinales formant dans leur rencontre, avec les plus grands cercles de chaque orbe, de gros tubercules oblongs, à neuf orbes, dont les pas sont légèrement réticulés, à lèvre intérieure garnie de trois plis ou dents, & à clavicule rentrante & creusée en manière de tire-bourre.

227. Cinq Buccins, dont un fauve revêtu de son épiderme marron, à lignes circulaires rousses, distribuées deux à deux, & à huit orbes chargés dans leur milieu de tubercules; nommé le *Tapis* ou la *Robe de Perse* *; deux blancs nus de fauve, légèrement striés à sept orbes bordés de tubercules *; & deux *Marbres* des deux espèces de l'article 224.

* Gualt. tab. 46. litt. B.
Lift. tab. 931.
f. 26.
* Lift tab. 884. Valen-
syn. univ. n°. 57 & 58.

228. Quatre Buccins, dont deux dépouillés, de l'espèce du premier de l'article précédent, & deux gris qui n'en diffèrent que par leurs tubercules moins prononcés.



GENRE QUATRIEME.

BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNE LONGUE QUEUE.

229. **U**N Buccin rare, dont la couleur fauve des premiers orbes s'éclaircit peu à peu dans les autres, jusqu'à devenir blanche dans les derniers, à stries transversales dans le bas, & longitudinales finement réticulées dans le haut, à bouche garnie d'une queue très menue, creusée en gouttière, & de l'espèce nommée *Fuseau* *. VI. FAM. BUCCINS.

230. Un *Fuseau* très-rare blanc, nué de fauve vers la queue, qu'il a plus longue que le précédent, à levre extérieure garnie de quatre dents, & nommé le *grand Fuseau à dents* : il porte cinq pouces huit lignes de long, & est de la plus belle conservation *. * Séba pl. 56.
n°. 3.
Arg. pl. 109
lett. A.

231. Un fuseau blanc à stries fines circulaires, de forme moins effilée que les précédens, à neuf orbes chargés dans leur milieu de tubercules, à levre intérieure saillante en-dehors en vive arrête, à très-longue queue, & nommé *Quenouille*; il a neuf pouces de long *. * Séba, pl. 56. n°. 2.
Arg. pl. 109
lett. D.

232. Une autre *Quenouille*, qui peut faire le pendant de la précédente, * Séba, la Coquille inférieure du milieu de la pl. 72.

156 COQUILLES UNIVALVES

233. Une semblable , mais plus effilée , & de huit pouces & demi de long.

VI. FAM.
BUCCINS.

234. Deux jolis Buccins en pendant, dont une *Quenouille* blanche de cinq pouces neuf lignes de long , nuée de fauve-roux vers la columelle, sur les lèvres, & le long de la queue , qui est recourbée à l'extrémité * ; & un *Fuseau* de même fonds & de même longueur , mais différent en ce que les quatre derniers orbes sont destitués de tubercules , & que la queue est un peu contournée.

* Arg. pl. 9.
lett. B.

* Liff. tab.
p. 18.

235. Deux *Fuseaux* , l'un blanc , différent de la *Quenouille* , en ce que les stries en sont moins prononcées , & les tubercules plus gros & plus arrondis * ; l'autre blanc , à stries transversales , & à grosses côtes longitudinales, dont les cannelures sont nuées de fauve roux *.

* Séba , la
coquille supé-
rieure du mi-
lieu de la pl.
79.

* Rumph.
tab. 19. litt. G.

236. Deux *Fuseaux* , l'un comme le premier de l'article précédent ; l'autre en diffère en ce qu'il est fauve-roux , nué de blanc , que les tubercules en sont plus petits , plus minces & plus nombreux , & les stries circulaires plus renflées.

237. Quatre *Fuseaux* par pendans ; sçavoir, deux blancs tachetés par zones de brun presque noir , à levre extérieure échancrée dans le haut , & nommés *Tours de Babel* * ; deux qui ne diffèrent des précédens qu'en ce qu'ils sont

* Liff. tab.
p. 17. f. 11.

entièrement blancs, & à stries plus saillantes. ~~—————~~

On peut nommer cette variété *Tour de Babel* VI. FAM. BUCCINS.
blanche *.

238. Douze petits *Fuseaux*, dont dix par morp. pl. 4^e lett. B
 pendans; sçavoir, un blanc lisse, à pas des or-
 bes, rentrans en-dedans, & à queue peu longue*; * List. tab. 915. f. 8.
 deux semblables au grand de l'article 229;
 deux petites *Quenouilles*; deux *Tours de Ba-*
bel blanches à taches rouges*; deux mar- * Arg. p¹. 9^e lett. M.
 ron noirâtre; deux entièrement blanches, &
 une comme les deux premières de l'article pré-
 cédent.

239. Quatorze Buccins par pendans; sça-
 voir, deux à stries circulaires & à grosses côtes
 longitudinales, dont les rencontres avec le
 haut des orbes forment autant de couronnes de
 tubercules, fauves sur les côtes, blancs dans
 les cannelures; deux nués d'aurore & de jaune- * List. tab. 922. f. 15.
 pâle, qui ne diffèrent des précédens que par
 leurs stries saillantes sur les tubercules en vive
 arrête*; deux bruns-marbrés de blanc à stries * Arg. pl. 106 lett. L.
 circulaires & à côtes longitudinales, un peu con-
 tournées*; deux blancs, qui ne diffèrent de ceux- * List. tab. 921. f. 14.
 ci que par leur forme moins allongée, & par
 leurs stries circulaires jaune-pâle dans l'un,
 orangé dans l'autre; deux petits fauves de mê-
 me forme, mais à côtes longitudinales plus
 nombreuses; deux blancs à huit côtes longitu-
 dinales aurore, un peu contournées, & du

158 COQUILLES UNIVALVES

VI. FAM. BUCCINS. reste semblables aux précédents ¹, & deux.
jaune-pâle à tubercules blanchâtres, fasciés de
rouge-brun ².

¹ List. tab.

920. f. 13.


² Bonan. cl.

8. f. 145.

SEPTIEME FAMILLE.

MUREX OU ROCHERS.

VII. FAM. ROCHERS. **C**E sont des Coquilles en volute qui
approchent beaucoup des Buccins, mais
qui en diffèrent à plusieurs égards. Leur
caractere le plus invariable est d'être
presque toujours renflées du milieu,
plus ou moins allongées vers les deux
extrémités, & garnies ou de pointes,
ou de tubercules, ou de clouds; ce qui
leur a fait donner le nom assez impro-
pre de *Rochers*. Leur bouche oblon-
gue est ou dentée ou non, & sans queue,
ou dentée avec une petite queue, ou
aîlée sans pattes, ou aîlée avec des pat-
tes; & c'est ce qui nous fournit la di-
vision de cette famille en quatre gen-
res; sçavoir,

1^o. Les Rochers à bouche dentée ou 
non dentée sans queue.

VII. FAM.
ROCHERS,

2^o. Les Rochers à bouche dentée &
à petite queue.

3^o. Les Rochers à bouche ailée sans
pattes.

4^o. Les Rochers à bouche ailée & à
pattes.

GENRE PREMIER.

*ROCHERS A BOUCHE DENTÉE OU NON
DENTÉE SANS QUEUE.*

240. **U**N grand Rocher de la Jamaïque rare,
marbré de blanc & de fouci très-vif dans le
corps, à tête & clavicule couleur de chair, à
bouche non dentée, à neuf orbes se recouvrant
l'un l'autre, & entourés de tubercules peu sail-
lans, nommé en Hollande *Pyramide* *.

* Séba, pl.

241. Trois grands & beaux Rochers des Indes, 83. n^o. 14.
dont un blanc-sale, & l'autre couleur de chair,
marbrés par grandes taches & par traits en
zig-zag de fauve-roux & de marron, à bouche
dentée & échancrée, à sept orbes couronnés de
tubercules pointus, & de l'espèce nommée en

VII. FAM.

ROCHERS.

* Séba, le
dernier rang
de la pl. 67.

Hollande *Chauves-Souris*, & en France *Fondres* *; & le troisième à fond orangé, veiné & taché par zones de marron-foncé, à levre intérieure dentée, & à couronnes de tubercules, dont les gros se prolongent en forme de côtes sur le dernier orbe, nommé en Hollande l'*Hébraïque* ou *Musique bâtarde*, & en France *Bois-veiné* *.

* Séba, pl.
57. n°. 1 & 2.
Arg. pl. 14.
lett. D.

242. Trois autres un peu moins grands; sçavoir, deux *Fondres* de forme plus raccourcie, à tubercules recourbés en - dedans, & creusés en forme de bec de perroquet *, & un *Bois-veiné*, comme le précédent, mais à fond blanc *.

* Séba, avant-
dernier rang
de la pl. 67.* Séba, pl.
57. n°. 3.

243. Trois Rochers; sçavoir, un *Bois-veiné* & deux *Fondres*, à-peu-près semblables à ceux de l'article 241.

244. Trois Rochers, dont deux en pendant, & grands dans leur espèce, marbrés de verd, de blanc, de marron & de brun, à deux zones formées de six lignes parallèles dans l'un, & de cinq dans l'autre, à intervalle des zones pointillé de rouge, & connus sous le nom de

* Séba, n°. 7 & 8.
Arg. pl. 14.
lett. F.* Séba, pl.
57. n°. 6.

Musique *, & un *Bois-veiné* *.

245. Trois autres de même grandeur, dont deux en pendant marbrés de blanc, de bleu & de brun, qui ne diffèrent des deux premiers de l'article précédent que par leur forme moins allongée, & par des taches oblongues, noires,
&

& plus marquées, qui leur ont fait donner le nom de *Plein-chant*, & un *Bois-veiné*, à taches moins foncées que le précédent.

VII. FAM.
ROCHERS.

246. Deux *Musiques* rares verd-céladon, pointillées régulièrement de brun, à cinq petites zones blanches, pointillées de même, espèce qu'on distingue par le nom de *Musique verte*.

247. Deux *Musiques* rares, couleur de rose, & nommées *Musiques couleur de rose*.

248. Trois variétés de *Foudre*; savoir, deux rares en ce que l'une a deux rangs de tubercules de plus sur le premier orbe *, & que l'autre a les orbes couronnés d'un simple cordon granuleux *; la troisième est de l'espèce des deux premiers de l'article 241.

* Séba, Coq.
du milieu de
la pl. 67.

* Séba, ibid.
litt. a & b.

249. Six Rochers; savoir, trois *Foudres*, dont un à tubercules en bec de perroquet, & deux de l'espèce ordinaire; deux *Plein-chants* en pendant, & une *Musique* à robe réticulée, différente de toutes celles ci-dessus décrites.

250. Sept Rochers; savoir, quatre *Foudres* & trois *Musiques*, dont une de l'espèce de celle de l'article précédent.

251. Un Rocher de la Chine très-rare, de forme fort renflée, rayé par petites zones de fauve, & de quelques points bruns, à trois rangs circulaires de tubercules tuilés, à six pas aplattis, recoûverts d'une suite de feuilles

VII. FAM. ROCHERS. couchées, retroussées vers le bord, & comme frisées, à levre extérieure dentelée, & umbiliqué.

. 252. Un de même espèce, mais un peu moins grand.

* Séba, pl. 71. n°. 3. 253. Deux gros Rochers fort renflés, fasciés de bleu sur un fond jaune, à spirale de six pas se recouvrant l'un l'autre, & séparés par un sillon : le premier a deux rangs de pointes seulement, dont un vers le bas, & l'autre vers la tête * ; le second, qui est très-rare, outre le rang de pointes du bas, en a encore trois autres vers la tête, dont le plus haut paroît s'être replié en forme de feuilles sur les sillons que laissent entr'elles les deux premières spires ; ils sont de l'espèce connue en France sous le nom de *Lard*, & en Hollande sous celui de *Toile à Matelas*.

254. Quatre variétés de *Lards* fasciés & rayés de fauve & de bleu ; sçavoir, deux à un rang de clouds vers le bas, & trois vers le haut ; un à un simple rang de clouds dans le haut, de même que dans le bas, & un totalement dépourvu de clouds.

255. Trois Rochers, dont un très-rare, blanc de lait, & imitant à cet égard la porcelaine, à stries longitudinales très-fines, & à côtes peu prononcées en même sens, finissant vers le haut en une couronne de tubercules,

qui se prolongent dans les six orbes dont est ~~composée~~ la spirale, & deux *Lards* bleuâtres VII. FAM. rayés de blanc, l'un à deux rangs*, l'autre ROCHERS. à trois de pointes dans le haut, & sous deux à * Séba, pl. 72. n°. 5. un rang dans le bas. Arg. pl. 15. lett. H.

256. Trois Rochers; sçavoir, deux d'Amérique blancs, à stries circulaires inégales, à huit orbes tous couronnés de tubercules, à quatre grosses stries tuberculeuses ou tuilées dans le bas & umbiliqués, nommés *Aigrettes**, & un *Lard* à un rang seulement de tubercules dans * List. tab. 310. f. 19. le haut.

257. Cinq Rochers; sçavoir, un rare blanc-grisâtre, à stries fines circulaires, à six orbes & à deux rangs de tubercules mouffes dans le corps, dont les plus élevés se prolongent d'orbe en orbe jusqu'à la clavicule; deux *Aigrettes* différentes des précédentes, en ce qu'elles sont toutes les deux recouvertes en partie d'un *Astrote*, & deux *Lards* de moyenne grandeur, l'un à deux rangs de pointes dans le haut, & un dans le bas, & l'autre à un seul rang de pointes, tant en haut qu'en bas.

258. Quatre Rochers; sçavoir, deux noisette-foncé, à stries fines circulaires, dont les canelures sont nuées de blanc, à trois rangs en même sens d'épines tuilées sur le corps, dont le plus haut se prolonge dans tous les orbes*, & deux *Aigrettes* des deux variétés ci-dessus * Séba, pl. 60. n°. 19.

164 COQUILLES UNIVALVES

~~_____~~ décrites, dont une chargée en partie d'un *As*

VII. FAM. *troïca*.

ROCHERS.

259. Deux très-belles *Aigrettes* en pendant, de l'espèce de celles de l'article 256.

260. Deux Rochers des Indes en pendant, noirs marbrés de blanc, à plusieurs rangs de pointes régnans dans toute leur longueur, grands dans leur espèce, & nommés *Chausse-trapes* *, ou *Murex à dents de Chien*.

* Arg. pl.
25. lett. E.
Litt. tab. 829.
f. 51.
Gualt tab. 55.
Litt. D.

261. Trois *Chausse-trapes* de moyenne grandeur, dont une blanche marbrée sur les côtes & les pointes de rouge-brun, nué d'orangé, & deux autres en pendant, dont la couleur est plus semblable à celle des précédentes.

262. Trois Rochers des Indes peu communs, dont un marron-clair marbré de blanc, à stries fines circulaires, & deux rangs de clouds, à tête peu élevée & presque entièrement enveloppée dans un retour blanc de la levre intérieure, qui est aussi évasée vers l'extrémité inférieure de la clavicule *, & deux *Chausse-trapes* des mêmes couleurs que celles de l'art. 260, mais qui en diffèrent en ce que la tête n'en est pas élevée, & qu'elles sont destituées de

* Séba, pl.
60. n°. 11.

* Ibid. n°. 8. stries transversales *.

Arg. pl. 14.
Litt. P.

263. Huit petits Rochers par pendans ; savoir, deux blancs à grosses côtes longitudinales bien prononcées & fort écartées, formant

sur les côtes des tubercules plus ou moins gros, à huit orbes aplatis, & umbiliqués; deux gris de forme approchante de celle du premier de l'article précédent, mais à quatre rangs de tubercules moins saillans; deux *Chausse-trapes* de l'espèce de celles du même article, & deux *Lards*, dont un marron, l'autre fouci, tous deux à zones blanches, & à deux rangs de clouds situés l'un en haut, l'autre en bas.

264. Dix-huit petits Rochers, dont douze par pendans; sçavoir, un très-rare blanc, ventru, umbiliqué, à stries transversales, & cinq rangs de tubercules marqués principalement vers le haut, à tête saillante couleur de noisette, & à bouche couleur de chair; un blanc-fale, à gros boutons noirs, rangés dans sept bandes obliques & cinq cercles, à bouche du plus beau lilas, étroite & dentelée des deux côtés, & de l'espèce nommée *Mure* *; une *Mure* peu différente, à tubercules marron, & à bouche blanche; deux petites à boutons & grains plus nombreux & plus serrés, de forme moins renflée, à tête plus élevée, & à bouche violette*; une blanche ventrue, à bouche fort ouverte, & à deux petites taches noires sur la levre intérieure *; un petit Rocher à stries fines circulaires, granuleuses, à robe grise hérissée de tubercules pointus, à bouche couleur de safran, & umbiliqué, nommé en Hollande *Hérif*.

VII. FAM.
ROCHERS.

* List. tab.
804. f. 13.

* Ibid. tab.
254. f. 5.

* Bonan. cl.
3. f. 174.
Gualt. tab. 66.
litt. BB.
List. tab. 920.
f. 50.

166 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. ROCHERS. *son*¹ ; un autre *Hérifson*, à-peu-près de même forme, mais fauve en-dessus, pourpre en-dedans & sans umbilic² ; deux autres blancs, hérissés de pointes fines, marron, fort saillantes, à levres dentelées & bordées de jonquille³ ; deux blancs-marbrés de brun-noirâtre, à pointes plus grosses, moins nombreuses, & à tête plus élevée que les précédens⁴ ; deux noirs marbrés de blanc, à trois rangs de clouds & à tête élevée⁵ ; un jaune-pâle en-dehors, jonquille en-dedans, de forme applatie, ceint de cinq rangs peu marqués de cordons un peu tuberculeux, qui finissent à la levre extérieure en un double rang de pointes, dont les deux plus hauts s'étendent en forme de pattes⁶ ; un petit Rocher marron à trois stries fines circulaires, à pas des deux premiers orbes aplatis, & couronnés de tubercules⁷, & deux ventrus blancs fasciés de brun, à un seul rang de gros tubercules⁸.

¹ Gualt. tab. 44. litt. S.
² Ibid. tab. 28. litt. R.
³ Ibid. litt. N. Arg. pl. 10. lett. A.
⁴ Gualt. tab. 43. litt. V.
⁵ Séba, pl. 60. n°. 38.
⁶ Ibid. n°. 48.
⁷ Ibid. n°. 32.
⁸ Lill. tab. 292. f. 52.

265. Vingt-deux petits Rochers, dont deux de l'espèce des deux premiers de l'article 258, mais différens en ce qu'ils sont dépourvus des trois rangs d'épines sur le corps, & ne conservent qu'un rang de petits tubercules, qui se prolonge sur tous les orbes⁹, & vingt autres presque tous des variétés déjà décrites.

⁹ Séba, pl. 60. n°. 9.

266. Deux Rochers rares, citron, lisses, à tête fort élevée, à dix orbes tuberculeux, bordés chacun vers le haut d'une raye blanche

punctuée de canelle , & à clavicule blanche.

VII. FAM.
ROCHERS.

267. Dix Rochers de moyenne grandeur , dont huit marbrés & bariolés de diverses couleurs , de forme approchante de celle des deux de l'article précédent * , & deux de même espèce , mais remarquables par divers accidens qui les rendent monstrueux.

* List. tab.
388. f. 9.
Séba , tab. 62.
n°. 38 & 39.
Arg. pl. 14.
lett. L.

268. Quatre grands Rochers ; sçavoir , un revêtu de son épiderme , marbré de blanc & de fauve-roux , & trois dépouillés , dont un couleur de chair , & deux ventre de biche , tous à fascies transversales onduleuses , & peu prononcées , à tête élevée , & à onze orbes couronnés de clouds fort saillans * : plus, trois petits à stries fines circulaires , à clavicule élevée , & à une couronne de clouds dans le premier orbe , qui se changent en petits tubercules dans les suivans *.

* Gualt. tab.
54. lett. M.

269. Quatre autres qui ne diffèrent des précédens qu'en ce qu'ils sont couleur de chair , teints de fauve & nués de brun , & que les clouds qui couronnent le corps y sont beaucoup plus saillans , & trois petits comme les derniers du même article.

* Arg. pl. 14.
lett. K.

270. Trois Rochers , dont un ventre-de-biche , de forme effilée vers le bas , renflée dans le corps , à six pas un peu concaves séparés par un petit fillon , & couronnés de tubercules un

168 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. ROCHERS. peu aplatis * ; un fauve-roux, qui en differe en ce que les pas n'en sont point séparés par des vuides, & que la tête est un peu plus élevée, & un plus petit, rare, blanc nué de verdâtre, imitant le jade, de forme effilée vers le bas, mais du reste à-peu-près semblable au précédent.

* Liff. ab.
185.

GENRE SECOND.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE ET A PETITE QUEUE.

271. **D**eux grands *Rochers triangulaires* fauve-roux, à fascies transversales nombreuses, élevées & tuberculeuses, à stries fines en même sens dans les intervalles des fascies, à trois rangs de bourrelets un peu aplatis, mais très-faillans, surtout celui de la levre extérieure, à queue retroussée, & nommés *Dragons* *.

* Séba, pl.
63. n°. 7 & 8.

272. Deux autres ventre-de-biche, nué d'orangé, à grosses côtes tuberculeuses transversales, & à plusieurs rangs de bossages fasciés de blanc & de marron, de forme très-irrégulière, à queue un peu contournée & retroussée; espèce que quelques Amateurs nomment *Rhina-*

* Arg. pl. 10. *ceros* *.
Litt. B.

273. Quatre Rochers; sçavoir, deux jaune-

pâle nué de blanc dans l'un , & d'aurore dans l'autre , à plusieurs rangs circulaires de tubercules granuleux , à quelques portions de côtes longitudinales tuberculeuses , à levre extérieure dentelée , & à très-petite queue, connus sous le nom de *Culotte de Suisse* * , & deux fauves , nués d'aurore , à côtes & fascies peu différentes de celles du *Rhinoceros* , mais moins saillantes & plus arrondies , à orbes bombés & à queue un peu longue, contournée & retroussée * ,

VII. FAM.
ROCHERS.

* Arg. pl. 9.
lett. D.
Rumph. tab.
28. litt. C.

274. Dix petits Rochers ; sçavoir , deux fauves nués de blanc , de forme bombée , à stries longitudinales & transversales , granuleuses aux points où elles se croisent , à trois côtes tuberculeuses , & à queue un peu longue recourbée ; un plus petit des mêmes forme & couleur , mais à deux bourrelets seulement ; deux blancs nués de fauve , à côtes & stries plus prononcées , & à longue queue recourbée * ; deux en treillis granuleux , à queue courte retroussée ; une *Culotte de Suisse* , & deux petits *Dragons* , dans l'un desquels la côte formant la levre extérieure est moins large & creusée en dedans , ce qui , suivant quelques Naturalistes , désigne le premier âge de la Coquille * .


* Gualt. tab.
37. litt. F.

* Arg. pl. 10.
lett. O.

* Séba , pl.
63. n°. 9 & 10.

275. Deux Rochers des Indes fauves nués de blanc , de forme aplatie , à deux rangs la-

170 COQUILLES UNIVALVES

 téraux de grandes épines , & à quelques rangs
VII. FAM. longitudaux de petites pointes , à levre ex-
ROCHERS. térieure dentelée , & à petite queue , nommés

* Séba , pl. en Hoïlande *Crapauds* *.

60. n°. 19.

List. tab. 949.

n°. 44.

276. Sept Rochers des Indes ; sçavoir, deux blancs nués de fauve & de marron , à stries transversales granuleuses , dont trois plus fortes chargées d'épines sur le corps , la plus élevée desquelles se prolonge dans tous les orbes , à deux côtes longitudinales & latérales tuberculeuses , & à très-petite queue , connus

* Gualt. tab. sous le nom de *Raccrocheuses* * ; quatre de mê-

49. litt. L.

Séba , pl. 60.

n°. 18.

me espèce , dont deux fauves-gris , & deux fauves nués de blanc , à pointes moins saillantes , & répandues dans moins de zones , l'un

* Ibid. n°. desquels n'a que deux petites bosses seulement* ,

25 , 16 , 17.

& une petite *Culotte de Suisse* , à bouche du plus beau lilas.

277. Deux Rochers des Indes rares , marbrés de blanc & de marron , chargés de gros tubercules granuleux , à deux grosses côtes latérales , d'où sortent en-dehors des pointes creusées en gouttière , à bouche à-peu-près semblable à celle de la *Culotte de Suisse* , & à petite queue retrouffée *.

* Arg. pl. 9.

lett. R.

Séba , pl. 60.

n°. 14.

278. Quatre Rochers par pendans, dont deux blancs marbrés de fauve, à stries longitudinales & transversales granuleuses dans leurs rencontres mutuelles, de forme bombée, & comme bossuée

en-dessus , mais aplatie en-dessous , à levres se rabattant en-dehors en une fraise plate , mince & dentelée des deux côtés , espèce que la forme de sa bouche a fait nommer *Grimace* * , & deux blanches , qui ne different des précédentes , qu'en ce que la robe en est formée d'un réseau plus régulier & à plus petits grains , & que la seule levre extérieure y est bordée d'une fraise ; on nomme cette variété *Grimace blanche*.

VII. FAM.
ROCHERS.

* Arg. pl. 2.
lett. H.

279. Cinq Rochers , dont un blanc nué de fauve , à tête élevée , à zones granuleuses , à deux rangs de tubercules dans le corps , qui se prolongent en diminuant de grosseur sur les autres orbes , & à deux rangs latéraux de côtes longitudinales ; deux *Culottes de Suisses* , & deux *Grimaces* des variétés de l'article précédent.

280. Deux Rochers des Indes , rares , couleur de chair , flambés par zones de rouge-obscur , à tête aplatie , à clavicule aigue , à petite queue fort retrouffée du côté de la levre intérieure & sinueuse à son extrémité , à levre extérieure coupée en vive arrête , ce qui les distingue de tous les autres *Casques* , dont le caractère spécifique est d'avoir cette levre retrouffée en bourrelet : ceux-ci nommés *Casques-Plumes* , sont très-grands dans leur espèce *.

* Rumph.

281. Deux *Casques-Plumes* de couleurs

t1b. 22. lit. B.

172 COQUILLES UNIVALVES

VII FAM. ROCHERS. plus pâles , & moins grands que les précédens.

282. Un Casque des Indes rare , blanc nué de fauve , à plis longitudinaux , laissant entr'eux de larges cannelures , à côte latérale tachetée de brun , de même que la cavité du bourrelet de la levre extérieure , à pas des orbes granuleux ,

* Séba , pl. 63. n°. 1 & 2. & à tête élevée *.

283. Un Casque des Indes peu commun , ventre de biche , marbré par taches rondes de blanc , à levre extérieure tachée de brun , & repliée en-dehors en gros bourrelet , à levre intérieure blanche , à un double rang de tubercules dans le premier orbe , & un seulement dans les autres , de forme bombée & à tête peu élevée *.

* Ibid. pl. 73. n°. 16.

184. Trois Casques des Indes lisses ; sçavoir , deux blancs nués de bleu , à grandes taches quarrées fauves , rangées par zones , à grande côte longitudinale , située en arriere de la levre intérieure , & à trois petites sur les orbes suivans , à clavicule aiguë , nommés *Casques pavés* ou *truités* , & grands dans leur espèce * ; & un verd de terrasse , à flammes longitudinales étroites & onduleuses fauves , & du reste semblable aux précédens *.

* Rumph. tab. 25. n°. 1. Arg. pl. 15. lett. I.

* Rumph. ibid. n°. 2. Arg. ibid. lett. D.

185. Quatre *Casques pavés* , dont deux de l'espèce des deux premiers de l'article précédent ; & deux verd de pavot qui n'en diffèrent

qu'en ce qu'ils sont moins grands , très-finement réticulés , à taches plus petites , & de forme un peu moins bombée *.

VII. FAM.

ROCHERS.

* Gualt. tab.

40. litt. B.

286. Quatre Casques ; sçavoir , deux *Pavés* du Golfe de Venise , blancs nués de fauve , à taches quarré-long , striés circulairement dans les premiers orbes finement réticulés dans les derniers , à tête un peu élevée , à coque mince & lèvre intérieure granuleuse * ; & deux des Indes , gris teint de verd d'eau , lisses dans le premier orbe , finement réticulés dans les autres , à pas aplatis bordés de petits tubercules , à lèvre extérieure finissant par trois dents sailantes en dehors , & à côte longitudinale située derriere le repli de la lèvre intérieure , espèce qu'on nomme *Casque Bézoard* , ou simplement *Bézoard* *.

* Bonan. cl.
3. n°. 158.

* Séba , pl.

71. n°. 12.

Gualt. tab. 40.
litt. A.

287. Trois Casques ; sçavoir , deux de la Méditerranée , qui ne diffèrent des premiers de l'article précédent , qu'en ce que les taches s'y joignent en forme de bandes longitudinales , que les cannelures transversales y sont beaucoup plus grandes , & la coque plus épaisse * ; & un gros *Bézoard* dépouillé , devenu par-là noisette , bordé de bleu pâle.

* Gualt. tab.
39. litt. B.

Séba , pl. 68.
n°. 14 & 15.

288. Treize petits Casques ; sçavoir , deux blancs à robe plissée en longueur , à pas des deux premiers orbes un peu tuberculeux , & à lèvre extérieure fort épaisse , tachetée de brun * ; deux rares qui diffèrent des précédens

* Gualt. tab.
39. litt. D.

Arg. pl. 14.
litt. G.

VII. FAM. ROCHERS. par le rebord de la lèvre extérieure, qui est très-mince, & par une large bande longitudinale oblique, tachetée de brun : ce qui les peut faire

* Arg. pl. 14. lett. H. Séba, pl. 53. n°. 18-23. nommer *Casque en baudrier* * ; deux blancs nués de fauve, à flammes étroites longitudinales rougeâtres, à lèvre extérieure comme les précédens *

* Gualt. tab. 39. litt. L. Séba, pl. 53. n°. 4. deux blancs réticulés, à pas du premier orbe aplati & bordé d'une couronne de petits tubercules, à lèvre extérieure dentelée en dedans sur toute sa longueur, & en dehors dans le bas seulement, l'un desquels est garni de plus sur le premier orbe d'une côte longitudinale qui

* Séba, la Coq. du milieu du haut de la pl. 69. reparoît encore dans l'orbe suivant * ; quatre réticulés, dont deux *Pavés* de l'espèce des deux derniers de l'article 285 ; deux qui en diffèrent en ce qu'ils sont à bandes longitudinales ondées, variété qu'on distingue par le nom de *Casques rayés* ; & un très-petit à stries circulaires, & à côte longitudinale située à l'opposite de la lèvre extérieure.

289. Cinq Casques des Indes ; sçavoir, trois de l'Isle de France, dont deux blancs veinés de gris, marbrés comme les *Casques plumes*, mais d'un rouge plus obscur, à stries longitudinales & cannelures transversales peu profondes, appelés en Hollande *Bonnets de Pologne* * ; un qui ne diffère des précédens que parce qu'il est entièrement blanc, excepté le repli de sa lèvre extérieure, qui est tacheté de brun, ce qui le

* Rumph. tab. 25. n°. 3. Séba, pl. 72. n°. 19-21.

rend très-rare ; & deux blancs à stries longitu-
dinales , & à lèvres tachetées de rouge-brun ,
dont un à pas des orbes un peu applatis &
couronnés de petits tubercules * , & l'autre à
pas des orbes sans tubercules , mais arrondis
en forme de gros bourrelets , & séparés les uns
des autres par un profond fillon ; ce qui le rend
aussi très-rare.

VII. FAM.
ROCHERS.
* Gualt. tab.
40. litt. C.

290. Seize Casques de différentes grandeurs ;
sçavoir , deux blanc - jaunâtre de la Méditerranée , de forme très-bombée , & à stries circu-
laires peu prononcées * : deux des Indes blancs ,
striés aussi circulairement , mais à pas des orbes
creusés en dedans en forme de fillon assez pro-
fond ; deux fauves nués de blanc , à cinq fascies
tuberculeuses sur le premier orbe , dont la plus
élevée se prolonge sur le haut du second & du
troisième orbe * ; deux blancs , lisses , tachetés
de marron autour de la spirale , & de brun sur
le bourrelet de la lèvre extérieure * ; un *Casque*
pavé lisse à petites taches * ; un *Casque rayé* de
l'espèce de ceux de l'article 288 ; deux comme
les deux premiers , & un comme les septième
& huitième du même article ; un qui diffère du
précédent , en ce que les pas des orbes en sont
moins applatis & simplement granuleux ; &
deux *Bonnets de Pologne*.

* List. tab.
999. fig. 64.

* Rumph. tab.
27. n°. 1.
List. tab. 1003.
fig. 68.

* Séba , pl.
53. n°. 9.
* Rumph. tab.
25. litt. B.

291. Dix Casques de moyenne grandeur ;
sçavoir , deux blancs de la Méditerranée , à
grosses stries granuleuses dans le haut , à lèvres

VII. FAM. ROCHERS.
 * Bonan. cl. 3. fig. 21.
 extérieure repliée en gros bourrelet, & intérieure granuleuse *; un de Saint-Domingue, de forme à peu près semblable, mais à stries circulaires moins prononcées & de couleur fauve; un des Indes, rose-sèche, lisse, couronné dans le haut du corps de petits tubercules, & umbiliqué; deux *Casques Bézoards*, dont un dépouillé; deux *Bonnets de Pologne*, & deux de l'espèce des cinquième & sixième de l'article précédent.

292. Deux Casques peu communs, blancs nués de fauve, à stries circulaires nombreuses, à lèvre extérieure relevée & saillante en dehors en vive arrête, & intérieure tapissant une portion de la base, & saillante aussi vers le bas, à petite queue peu retroussée, l'un à bouche dentelée des deux côtés, l'autre non *.

* Gualt. tab. 43. n°. 2.
 Bonan. cl. 3. f. 160.

293. Un grand Casque de la mer du Sud, rare, blanc nué de fauve, à stries longitudinales peu élevées en forme de rides, à quatre zones chargées de taches rousses, & dont la plus haute est un peu tuberculeuse, à huit orbes renflés, ornés chacun d'une couronne de petits tubercules, & au-dessus de cercles granuleux, à lèvres extérieure & intérieure saillantes en dehors

* Séba, pl. 71. n°. 12 & 13.

& applaties, & à côte mince longitudinale *.
 394. Deux grands casques des Indes, nués & marbrés de blanc, d'aurore & de brun de différentes nuances, à stries fines longitudinales, ceints

ceints d'un grand nombre de cordons circulaires =====
 tuberculeux , à bouche dentée des deux côtés , VII. FAM.
ROCHERS.
 & à lèvres retrouffées , l'extérieure fort épaisse ,
 l'intérieure ridée , noire en dedans , tapissant une
 partie de la base , & nommés *Turbans* *.

295. Deux *Turbans* de couleurs très-vives , * Séba , pl.
73. n°. 3, 4 & 6.
 moins grands que les précédens , & par-là pro-
 pres à être placés dans des tiroirs.

296. Deux semblables , mais moins grands ;
 & à lèvre extérieure fort mince , ce qui est rare
 dans cette espèce de Casques.

297. Deux gros Casques d'Amérique , gris-
 blanc , flambés par bandes longitudinales en
 zig-zag de fauve , de brun & de violet , de
 forme un peu triangulaire , à trois fascies trans-
 versales tuberculeuses , dont les deux premières
 sont peu prononcées , à tête aplatie , à lèvres
 teintes par grandes taches de brun-foncé , &
 nommés *Casques triangulaires* *.

298. Deux *Casques triangulaires* de moyenne * Gual. tab.
41. litt. A.
 grandeur , dont un à un seul rang de tubercu-
 les , & imitant par son dessein le point de Hon-
 grie * ; l'autre en diffère en ce qu'il n'a point de
 stries dans le corps , & que son milieu est * Séba , pl.
73. n°. 10 & 11.
 chargé de gros tubercules *.

299. Trois Casques ; sçavoir , deux blancs * Ibid. n°. 14 & 15.
 marbrés de fauve & de brun , à stries circulai-
 res & cannelures piquées régulièrement de pe-
 tits traits longitudinaux , par où ils imitent le

178 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. ROCHERS. dessous d'un ouvrage tricotté , à trois fascies tuberculeuses , & une couronne de clouds qui s'étend dans tous les orbes, dont les pas sont

applaties & se recouvrent l'un l'autre , nommés *Casques tricottés*, petits dans leur espèce , & par-là propres à entrer dans des tiroirs * ; & un de la variété du premier de l'article précédent , mais dont le rang de tubercules est à peine sen-

* Séba, pl. 73. n°. 7 & 8.
Gualt. tab. 40.
litt. D.

* Séba, ibid. n°. 19 & 20.

300. Trois *Casques* plus grands que les précédens , dont un *Tricotté*, & deux *Turbans*.

301. Deux grands *Casques*, dont un *Tricotté*, & un *Turban*.

302. Deux gros *Casques triangulaires*, à trois rangs de tubercules fort saillants , de la base de l'un desquels on a enlevé des portions pour mettre à découvert la structure intérieure.

303. Trois très-grands *Casques*, dont deux gris-jaunâtre , à deux rangs de tubercules sur le milieu du corps , & un de clouds très-saillans à l'extrémité , à lèvres applaties & extrêmement saillantes , sur-tout du côté de la tête qui est peu élevée , à coque très-épaisse & bouche dentée

* Litt. tab. 1008.

des deux côtés * ; & le troisieme gris , à stries circulaires encore plus distantes que dans le précédent , à trois fascies chargées de mammons peu élevés , à tête plate , & à lèvres applaties , plus saillantes vers les côtés que vers la tête , à côte plate longitudinale , couchée

sous la lèvre intérieure, & se prolongeant sur les orbes suivans, & à bouche tachée de rouge-brun, garnie de très-grosses dents. VII. FAM. ROCHERS.

GENRE TROISIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE SANS PATTES.

304. **U**N grand Rocher blanc un peu taché de jaune, à grande aîle cannelée transversalement, se repliant en dedans, s'étendant sur la tête, la dépassant, & échancrée vers le bas, à dix orbes couronnés de petits tubercules, & nommé l'*Aîle large* *.

305. Trois Rochers ailés, dont deux blancs, & un fauve nué de blanc en dessus, & blanc en dessous, à aîles moins grandes que celles du précédent, ne s'étendant que jusqu'au second orbe, & finissant par deux échancrures, à dix orbes couronnés de petits tubercules, & de l'espèce nommée *Tourterelle* *.

306. Six *Aîlées*; sçavoir, deux cannelée à quatre petites zones blanches, tachetées du fond, à aîle recourbée & striée en dedans *; deux blanches marbrées, par bandes longitudinales en zig-zag, de canelle, ventruës, à grande aîle recourbée en dedans, épaisse dans son bord,

* Rumph.

tab. 36. lit. L.

Séba, pl. 63.

n^o. 1 & 2.

* Séba, pl.

62. n^o. 21 &

22.

Rumph. tab.

36. litt. M.

* Séba, pl.

61. n^o. 15.

Rumph. tab.

37. litt. X.

180 COQUILLES UNIVALVES

& finissant par deux petites sinuosités * ; & deux *Tourterelles* fauves.

VII. FAM.

ROCHERS.

* Séba, pl.
62. n°. 18 &
29.

Arg. pl. 14.
lett. Q.

307. *Idem*, à quelque petite différence près.

308. Deux Aîlées blanches nuées de jaune, à stries transversales dans le bas, & cannelures longitudinales dans le haut, traversées de stries fines circulaires, à tête fort élevée, composée de neuf orbes réunis les uns aux autres par une moulure, à aîle recourbée, commençant & finissant par une échancrure, & à lèvre intérieure retroussée en dehors: on les nomme en Hollande

* List. tab. 852. fig. 8. *l'Artimon entortillé* *.

309. Deux *Artimons entortillés* peu communs, dont un blanc qui ne diffère de ceux de l'article précédent, qu'en ce qu'il est de forme plus effilée, & à onze orbes, dont les cannelures sont plus marquées & se prolongent même sur le corps * ; & un blanc nué de jaune, absolument de même forme, mais sans aîle, & par conséquent du premier âge de cette espèce.

* Séba, pl.
62. n°. 19.
List. tab. 855.
fig. inferior.

310. Cinq *Artimons entortillés* ; sçavoir, deux de l'espèce de ceux de l'article 308, à petites mailles orangé sur un fond blanc, & à trois zones blanches, chargées de chevrons aussi orangés * ; & trois papyracés du premier âge, dont deux marbrés de blanc & d'orangé, & un blanc avec une légère teinte de jaune.

* Séba, pl.
62. n°. 18 &
20.
Rumph. tab.
36. lit. O.

311. Quatre Aîlées peu communes, dont deux blanches à rayes circulaires & onduleuses

fanves très-serrées, un peu bossues dans leurs contours, à une échancrure dans le haut de l'aîle, & deux dans le bas, & à bouche lilas * ; & deux petites de même forme, marbrées de brun-jaunâtre, & à cinq zones blanches onduleuses *.

VII. FAM.
ROCHERS,
* Bonan. ch.
3. f. 150.

312. Deux Aîlées très-rares, blanches, à rayes circulaires pourpre, formées de traits interrompus & onduleux, à huit orbes, dont le premier est couronné d'un rang de tubercules, à triple échancrure dans l'aîle comme les précédentes, & à bouche citron ; on les nomme en Hollande *Buccins de la mer rouge*.

* List. tab.
847. fig. 1.
Arg. pl. 14.
lett N.
Rumph. tab.
371 lett. V.

313. Deux Aîlées rares, marbrées par grandes taches de marron clair & de blanc, à tête élevée, composée de neuf orbes traversés de cannelures longitudinales peu prononcées, à aîle bordée dans le haut d'un petit bourrelet, & de trois dents saillantes dans le bas, & à lèvre intérieure repliée en dehors *.

* Séba, p. 61. n°. 41-47.

314. Neuf Aîlées ; savoir, trois rares, dont deux blanches tirant sur le couleur de chair, à zones formées de hachures jaunes qui représentent, sur-tout vers l'aîle, des caractères Chinois, à tête aplatie, & composée de sept orbes se recouvrant l'un l'autre, & un peu tuberculeux, à aîle échancrée en haut & en bas : la troisième diffère des deux premières, en ce que la tête est un peu plus élevée, & que l'aîle n'en

182 COQUILLES UNIVALVES

est pas bien formée, ce que la plupart des Naturalistes jugent désigner le premier âge de la Coquille *; deux blanches à larges zones formées de chevrons fouci, à tête un peu élevée, à aîle échancrée comme celle des précédentes, & à bouche safran, à la lèvre intérieure près, qui est

VII. FAM. ROCHERS.

* Scba, pl. 51. n°. 13.

* Liff. tab. 851. fig. 6.

Rumph. tab. 57. litt. S.

Séba, pl. 61. n°. 11 & 12.

d'un beau noir *; quatre de même espèce, mais du premier âge, dont deux dépouillées, & devenues par-là blanc de lait.

315. Treize Aîlées; sçavoir, une rare blanc de lait, à stries circulaires inégales, peu prononcées, à huit orbes, dont les pas des premiers sont un peu aplatis & bordés d'une espèce de petit bourrelet, à clavicule aiguë, & aîle un peu recourbée, s'élevant jusqu'au troisième orbe; deux non moins rares, dont une blanche, & l'autre grise bariolée de jaune, toutes deux à stries fines transversales, à cinq rangs de petits tubercules d'inégale grosseur sur le corps, à huit orbes couronnés aussi de tubercules très-gros dans le premier, à bouche brune tirant sur le noir, & à aîle épaisse, échancrée

* Séba, pl. 52. n°. 17. & 18.

* Liff. tab. 817 fig. 13.

Séba, pl. 61. n°. 30 & 31.

en haut & en bas *; deux blanches nuées de gris & de verd de pavot, à l'exception du bord de l'aîle, qui est brun-noirâtre, ainsi que la bouche, à tête élevée, composée de huit orbes tuberculeux, & à petite queue, espèce qu'on nomme *Gueule noire* *; une autre *Gueule noire* fasciée de marron clair & de blanc; & sept au-

tres Aîlées de diverses couleurs & marbrures, ~~_____~~
& d'espèce approchante de celle des *Gueules* VII. F. ~~_____~~
noires *. ROCHERS.

316. Dix-huit Aîlées par pendans ; sçavoir, quatre marbrées & fasciées de blanc & de rouge-brun * ; quatre petites *Tourterelles*, dont deux cannelle, à petites zones blanches, & deux blanches nuées de fauve * ; deux *Gueules noires* ; deux comme les troisieme & quatrieme de l'article 306 ; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article 314 ; & quatre comme celles de l'article 311, à la couleur près des deux premieres, qui est blanche.

317. Deux grandes Aîlées de la Jamaïque, rares, blanches, marbrées par traits longitudinaux de roux, à trois grosses côtes longitudinales dans le corps, qui forment, dans la couronne du premier orbe, autant de gros tubercules oblongs, à dix orbes un peu creusés en doucine, & à aîle mince, sinueuse vers le bas, & très-faillante.

318. Trois Aîlées de la Jamaïque, peu communes ; sçavoir, une grande blanche, nuée de roux, à deux rangs de petits tubercules inégaux dans le milieu du corps, & un troisieme de gros, couronnant le premier orbe, & se prolongeant sur les suivans, à aîle épaisse vers le haut, & sinueuse vers le bas * ; une de moyenne grandeur, blanche nuée de couleur de rose, *

184 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. ROCHERS. de l'espèce de la précédente, mais où les deux fascies ne sont marquées que du côté de la lèvre intérieure, & à tubercules des orbes moins sail-
 * Séba, pl. 42, n°. 8. lants * ; & une de l'espèce de celles de l'article précédent, mais moins grande.

319. Deux Aîlées en pendant, de l'espèce de la première de l'article précédent, un peu moins grandes, mais riches en couleur : leur robe est canelle, nuée de verd de terrasse, & marbrée de blanc & de ponceau.

320. Quatre Aîlées en pendant ; savoir, deux blanches tachetées de brun de diverses nuances, à huit zones chargées de petits tubercules inégaux, à un cercle de bossages qui couronnent le premier orbe, & se prolongent en forme de tubercules sur les suivans, à aîle terminée en bourrelet épais, s'étendant vers le haut sur les quatre premiers orbes, à deux échancrures vers le haut, & autant vers le bas, de l'espèce nommée *Tête de serpent* *, & grandes dans cette espèce ; & deux aurore très-vif dans le corps, à tête blanche, à douze orbes, dont les premiers sont couronnés de clouds, & les autres de tubercules, à aîle échancrée dans le bas, & sinueuse dans le haut : on les nomme

* Ibid. n°. 11.
 Gualt. tab. 32.
 litt. A.

* Arg. pl. 15. *Oreilles de cochon* *.
 lett. A.
 Gualt. tab. 32.
 litt. B.

321. Cinq Aîlées ; savoir, trois *Oreilles de cochon*, dont deux semblables aux précédentes, mais de couleur plus foncée, & ornées chacune

d'une large zone plus claire que le fond ; la troisième a une zone semblable , mais le premier orbe est dépourvu de clouds , & les autres n'ont que de petits tubercules peu prononcés ; & deux *Têtes de serpent*.

322. Sept autres Aîlées ; sçavoir , quatre *Oreilles de cochon* , dont une rare & singulière , en ce que les clouds , au lieu d'être pointus , sont coupés quarrément comme les dents de certaines roues , une peu commune , en ce qu'elle est blanche en dessus , & pourpre en dedans ; deux comme les premières de l'article précédent , & trois *Tête de serpent* , dont une à aîle épaisse , une à aîle papyracée * , & l'autre sans aîle ou du premier âge *.

* Arg. pl.
35. lett. C.
* Séba , pl.
62. n°. 40.

323. Quatre très-grandes Aîlées d'Amérique , revêtues de leur épiderme fauve-roux , à grosses stries transversales , à orbes couronnés de tubercules très-faillants , & à bouche couleur de rose , nommées *Lambis* , dont une à aîle fort épaisse , deux à aîles plus minces , & la dernière du premier âge , c'est-à-dire , sans aîle *.

* Gualt. tab.
34. litt. A.

324. Trois gros *Lambis* du premier âge , dépouillés de leur épiderme , dont deux couleur de chair , & un couleur de rose.

325. Quatre Aîlées à peu près des couleurs & nuances des *Lambis* , mais moins grandes ; elles en diffèrent d'ailleurs en ce que la bouche n'en est point couleur de rose , que les tuber-

186 COQUILLES UNIVALVES.

VII. FAM. ROCHERS. cules du premier orbe en sont plus gros à proportion, & que ceux des autres orbes sont presque entièrement cachés sous les extrémités des orbes précédens : l'aîle est fort épaisse dans l'une, & papyracée dans l'autre : les deux dernières sont du premier âge ou sans aîle, à robe rose-pâle dans l'une, ce qui l'a fait nommer *Pomme d'Acajou*, & violette dans l'autre, que l'on nomme l'*Episcopale*.

326. Deux *Pommes d'Acajou* en pendant, & de couleurs très-vives.

327. Deux *Episcopales* aussi en pendant.

328. Six Aîlées de moyenne grandeur, par pendans ; sçavoir, deux marron foncé, marbrées & tachetées par zones de blanc & de brun, à grosses stries circulaires un peu onduleuses, à un rang de tubercules au haut du corps, dont les plus près de l'aîle sont les plus gros, à tête assez élevée, & à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée dans le bas, & s'éle-

* Séba, pl. 62. n°. 5 & 9. vant un peu vers le haut * ; deux couleur de tuile, semblables de forme aux précédentes, & qui en conservent la marbrure dans un petit cordon qui régné autour des spires ; & deux du premier âge de cette espèce, des mêmes couleurs & dessein des deux premières, mais sans

* Ibid. n°. aîles *.

35.

329. Six autres Aîlées par pendans, de fond & marbrure semblables aux premières de l'article

précédent ; sçavoir, deux du dernier âge, à ~~à~~ aîle bien formée, & du reste plus épaisse dans l'une, & papyracée dans l'autre ; deux qui ne différent de celles-ci qu'en ce que la lèvre extérieure, qui y est aussi papyracée, s'y élève à peine en forme d'aîle, ce qui les fait regarder comme l'âge moyen de la Coquille * ; & deux comme les dernières de l'article précédent, à lèvre extérieure papyracée aussi, & ne tenant point du tout de la forme d'aîle ; ce qui constitue le premier âge de cette Coquille. Ces trois variétés sont fort intéressantes.

VII. FAM.
ROCHERS.

* Séba, pl.
62. n°. 37.

330. Sept Aîlées ; sçavoir, deux du dernier âge de l'espèce des deux premières de l'article 328, mais un peu différentes pour le fond ; une de l'âge moyen, & quatre du premier âge, dont deux de la première variété du même article, & deux de la seconde.

331. Neuf Aîlées ; sçavoir, deux bariolées de marron, de fauve & de blanc, à stries circulaires un peu onduleuses & granuleuses, à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée en haut & en bas, & armée, au-dessus de l'échancrure d'en haut, d'une avance en forme de doigt, à petite queue échancrée & retroussée, nommées *Oreilles d'âne* * ; deux Oreilles d'âne, différentes des précédentes, en ce que l'aîle en est papyracée, & n'a ni échancrure, ni avance ; deux comme les première & troisième de l'ar

* Arg. pl.
14. lett. O.
Séba, pl. 61.
n°. 1 & 2.
Litt. tab. 872.
fig. 28.

~~Article~~ ticle 328, & trois variétés du premier âge de

VII. FAM. cette espèce *.

ROCHERS.

* Séba, pl. 61. n°. 8-10. 332. Les mêmes Coquilles que dans l'article précédent, à cette différence près que l'une des *Oreilles d'âne* de la première espèce est blanche, nuée de couleur de rose..

* Ibid. pl. 62. n°. 4

333. Quatre grandes Aîlées marbrées de blanc, de fauve & de roux, dont deux ne diffèrent des précédentes qu'en ce qu'elles sont couronnées de plus gros tubercules * ; les aîles des deux autres s'élèvent au niveau de la columelle, & jettent en avant une espèce de doigt qui se prolonge encore beaucoup plus loin, ce qui les fait nommer *Aile d'Ange* *.


* Ibid. pl. 62. n°. 1 & 2.
List. tab. 874.
fig. 30.

GENRE QUATRIEME.

ROCHERS. A BOUCHE AILÉE ET A PATTES.

* Séba, pl. 81.

Gualt. tab. 35.
list. B.

334.  TROIS grands Rochers des Indes, marbrés de blanc & de marron clair, à quatre fascies tuberculeuses, & de différens âges; sçavoir, un du dernier âge, à aîle armée de six grandes pattes crochues, creusées par-dessous en canal presque fermé, à lèvres chargées de petites stries aurore, nommé en France *Araignée mâle*, & en Hollande *Griffe du Diable* * ; un de l'âge

noyen, à pattes courtes fort larges & fort ouvertes, nommé l'*Araignée femelle*¹; & un du premier âge, à levre papyracée, dépourvue d'aîle & de pattes².

VII. FAM.
ROCHERS.

¹ Gualt. tab.
35. litt. A.

Rumph. tab.
35. litt. B.

² Séba, pl.
83. n°. 1.

Rumph. tab.
35. litt. C.

335. Idem, à quelques petites différences près dans les pattes de l'*Araignée mâle*, qui sont plus ouvertes que dans celle de l'article précédent.

336. Deux *Araignées mâles* d'une autre variété, & peu communes: elles sont à six pattes comme les précédentes, mais à fascies plus élevées, & ont non-seulement les lèvres, mais encore tout l'intérieur de l'aîle chargés de stries onduleuses blanches & de cannelures brunes³.

³ List. tab.

337. Quatre *Araignées* marbrées sur le corps des mêmes couleurs que les précédentes, & blanches seulement en dedans, à sept pattes, y compris la queue, nommées en Hollande *Crabes communs*, dont deux *mâles* ou du second âge, à pattes longues, étroites & fermées⁴, & deux *femelles* ou du premier âge, à pattes courtes, larges & ouvertes⁵.

870. f. 24.

⁴ Arg. pl.
14. litt. E.

Gualt. tab. 35.
litt. C.

⁵ List. tab.
866. f. 21.

Rumph. tab.
36. litt. G.

338. Deux *Araignées mâles* à sept pattes, plus grandes que les précédentes, l'une blanche marbrée de marron, remarquable par une grande queue recourbée, & l'autre blanche nuée de fauve, à petite queue. Plus une du premier âge de cette espèce.

339. Deux *Araignées mâles* de cette espèce,

VII. FAM. ROCHERS. ~~marbrées~~ marbrées de fauve au lieu de marron, dont une monstrueuse, en ce que trois de ses pattes partant d'un même pli, saillent fort en avant, & se replient même sur les autres; & une troisième sans aîle, comme la dernière de l'article précédent.

340. Deux grandes *Araignées mâles* à sept pattes, d'une espèce rare : elles diffèrent de toutes les précédentes, en ce que la clavicule comprenant les quatre derniers orbes, en est aplatie, & que les tubercules en sont moins gros; l'une revêtue de son épiderme, & à grandes pattes fermées en dessous, l'autre dépouillée, à pattes un peu moins grandes & ouvertes, toutes deux du dernier âge de cette espèce.

341. Deux autres de même espèce, mais moins avancées en âge; sçavoir, une du moyen âge ou *femelle*, à aîle très-saillante, peu épaisse, bordée de grandes dentelures formées par le prolongement des fascies circulaires, & s'élevant jusqu'à la clavicule sur laquelle elle se replie; l'autre du premier âge, parfaitement semblable à la précédente, à l'aîle près dont elle est dépourvue, & nommée dans cet état, par Klein, *Racine de Brione* *.

• Lift. tab.
382. f. 4.

342. Deux petites en pendant, de même espèce, à lèvre extérieure papyracée, & qui paroissent être d'un âge encore antérieur à la dernière de l'article précédent. Ces trois articles

réunissent sous un seul point de vue tous les ~~changemens~~ changemens d'état de cette Coquille.

VII. FAM.

ROCHERS.

343. Trois Rochers des Indes ; sçavoir, deux blancs marbrés de fauve - roux, différens des *Araignées* de l'article 337, en ce que les sept pattes en sont noueuses, la forme moins bombée, & la bouche striée, blanche & brune : on les nomme en Hollande *Crabes à nœuds* ou *goutteux*, & en France *Scorpions* * ; l'un mâle à longues pattes fermées, l'autre femelle à pattes courtes & ouvertes, & un différent des précédens, en ce que les pattes en sont à peine noueuses, que le dedans de la bouche en est orangé, & sans stries, nommé le *Scorpion orangé*.

* Arg. pl.
14. lett. B.
Rumph. tab.
36. litt. K.

344. Six Rochers ; sçavoir, quatre petits fauves nus de gris, à orbes tuberculeux & à tête élevée, deux desquels ont l'aîle partagée en quatre longs doigts, & se nomment en Hollande *Aîle de chauve-souris mâle* * ; les deux autres à aîle armée d'un seul doigt peu long, & nommées *Aîle de chauve-souris femelle* * : ces Coquilles sont encore connues sous les noms de *Hallebarde* ou de *Patte d'oie* ; & deux *Scorpions* mâles des variétés de l'article précédent.

* Gualt. tab.
53. litt. B. C.
Séba, pl. 62.
n°. 17.
* Gualt. tab.
53. litt. A.
List. tab. 865.
fig. 20.

345. Trois Rochers marbrés de blanc & de roux, à dix pattes, y compris la queue, à bouche couleur de chair, striée des deux côtés, nommés *Mille-pieds*, dont deux mâles à pattes

192 COQUILLES UNIVALVES

fermées¹, & le troisieme *femelle* à aîle papy-

VII. FAM. raccée, garnie de pattes courtes & ouvertes².

ROCHERS.

¹ Litt. tab.

868 & 869. f.

23.


Rumph. tab.

26. litt. f.

² Arg. pl. 15.

lett. B.

346. Trois Rochers; sçavoir, deux *Griffes du Diable*, dont une très-grande, & l'autre découpée en spirale, pour faire voir l'intérieur de la Coquille, & une *Araignée femelle* de la même espèce.



HUITIEME

HUITIEME FAMILLE.

P O U R P R E S.

CE sont des Coquilles en volute, ordinairement moins grosses & moins renflées du milieu que les *Murex*. Elles sont encore caractérisées par une petite bouche à peu près ronde & unie, par des côtes longitudinales plus ou moins nombreuses, placées à égale distance les unes des autres, & chargées ou de tubercules, ou de petits clouds aigus, ou de feuillages à bords découpés & frisés, ou enfin d'épines longues & fines. Elles ont toutes une queue creusée en gouttière plus ou moins longue, d'où nous tirerons leur division en deux genres ; sçavoir,

1°. Les Pourpres à queue un peu large, courte & recourbée.

2°. Les Pourpres à queue plus étroite, longue & droite.

Tome I.

N

VIII. FAM.
POURPRES.

 GENRE PREMIER.

POURPRES A QUEUE UN PEU LARGE ;
COURTE ET RECOURBÉE.

347. DEUX très-grandes Pourpres rameu-
 VIII. FAM. ses des Indes , blanches veinées de fauve , ren-
 POURPRES. flées , à stries fines circulaires , à trois côtes
 longitudinales , d'où naissent de grosses feuilles
 frisées , plus grandes dans l'une , & moins dans
 l'autre , sur le milieu des intervalles desquelles
 on voit un rang longitudinal d'assez gros tu-
 bercules , & à lèvre intérieure teinte de couleur
 de rose , variété qu'on peut nommer *Rameuse*
triangulaire *. C'est la *Chausse-trape* ou le *Che-*
val de frise de M. d'Argenville.

* Arg. pl.
 16. lett. C.
 Séba , pl. 77.
 n°. 4.

348. Deux semblables , mais moins grandes.

349. *Idem* , à cela près que le fond des deux
 Coquilles est rayé ici de brun & de marron.

350. *Idem* , à quelque différence près dans
 la grandeur & les nuances.

351. Deux *Pourpres rameuses triangulaires*
 des Indes , blanches , fasciées dans les canne-
 lures de brun , à stries fines circulaires , & au-
 tres plus grosses , dont le prolongement se ter-
 mine , le long des grosses côtes longitudinales ,

en feuilles frisées très-saillantes dans l'une *, & ~~fort peu dans l'autre.~~

VIII. FAM.

352. Deux *Pourpres rameuses triangulaires* POURPRES.
des Indes, fauve nué de noisette & de marron, * Séba, pl. 77. n°. 2 & 3.
à tête plus élevée que les précédentes, & à
feuilles frisées très-longues, recourbées en ar-
rière dans leur extrémité *.

* Ibid. n°. 26

353. Quatre *Pourpres rameuses triangulaires*
en pendans ; sçavoir, deux d'Amérique, cou-
leur de fuye, à feuilles très-serrées les unes con-
tre les autres dans chaque rang longitudinal, &
qu'on pourroit nommer *Enfumées* ; & deux de
l'espèce de celles de l'article précédent, mais
plus petites, & à feuilles plus minces, plus al-
longées à proportion, & plus recourbées *.

* Arg. pl.
16. lett. E.

354. Quatre *Pourpres rameuses triangulaires*
d'Amérique ; sçavoir, deux blanches à clavicule
marron clair, à stries circulaires très-fines ; &
deux *Enfumées*.

355. Deux *Pourpres rameuses triangulaires*
des Indes, noires, à quelques endroits près, qui
sont marqués de blanc dans le corps, à grandes
feuilles frisées & recourbées, à trois grosses
bosses situées entre les trois rangs longitudi-
naux de ces feuilles, & à lèvre intérieure cou-
leur de rose, espèce qu'on nomme *Brulés* *.

* Ibid. lett.

H.

356. Trois *Pourpres rameuses triangulaires* ;
sçavoir, une de l'espèce de celles de l'article Séba, pl. 77.
n°. 9 & 10.

196. COQUILLES UNIVALVES

352; & deux *Brulées*, où il paroît plus de blanc que dans celles de l'article précédent.

VIII. FAM. POURPRES.

357. Quatre Pourpres rameuses en pendant, des deux espèces de l'article précédent.

358. Six Pourpres rameuses en pendant; savoir, deux blanches, semblables à celles de même couleur de l'article 354; deux *Brulées*, & deux comme les dernières de l'article 353.

359. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, rares & en pendant, ventre de biche, à stries circulaires brunes, à feuillages peu saillans, mais bien dessinés, & d'un beau couleur de rose, à lèvres bordées de même, de forme oblongue, & à tête fort élevée.

360. Deux autres, dont une de la variété des précédentes, mais plus grande, plus foncée en couleurs, & dont les feuilles montrent moins de couleur de rose; & une qui ne diffère de la précédente qu'en ce que le fond & les cannelures en sont de couleur blanche, & que les feuilles & les stries sont marron foncé *.

* Séba, pl.
77. n°. 11 &
12.
List. tab. 246.
f. 41.

361. Trois Pourpres rameuses triangulaires; savoir, une semblable à la première de l'article précédent, mais plus foncée en couleurs, & à feuilles dont l'intérieur est lilas vif; & deux blanches à stries circulaires brunes, de la forme des précédentes, à cela près qu'on y remarque trois rangs de bosses longitudinales entre chaque paire de côtes feuillues.

362. Trois autres de la variété des articles précédens ; ſçavoir , une blanche nuée de fauve à feuillages couleur de roſe ; une fauve à ſtries brunes , & à deſſous des feuillages couleur de chair , & la dernière marron à ſtries noires & à feuillages lilas vif.

VIII. FAM.
POURPRES.

363. Quatre Pourpres triangulaires d'Amérique , à ſtries circulaires granuleuſes , alternativement groſſes & menues , à trois groſſes côtes longitudinales , & à deux petites intermédiaires , ſur leſquelles s'élevent les groſſes ſtries du corps , formant ſur celles-ci de petits tubercules , & ſur les autres des feuillages très-courts & peu nombreux , toutes de couleur grife , mais dont deux à côtes blanches & bouche jonquille , & deux à côtes blanches & brunes , & à bouche couleur de roſe.

364. Six Pourpres triangulaires en pendant ; ſçavoir , deux des Indes , rares , à ſtries fines circulaires , à trois groſſes longitudinales , & à tubercules qui ſe continuent trois par trois dans chaque orbe , à petite queue armée de deux épines , à lèvres teintes en dedans de cériſe , à coque très-épaiſſe & de forme renflée ; deux de la Méditerranée , blanches , nuées de fauve , à groſſes ſtries circulaires en forme de cordons granuleux , à profondes cannelures , à trois côtes longitudinales , chargées de plis aſſez fail-
lans * , l'une deſquelles conſerve ſon opercule.

* Arg Zoo-
morph pl. 4-
fig. 2.

198 COQUILLES UNIVALVES

~~_____~~ & deux de l'espèce des dernières de l'article

VIII. FAM. 353.

POURPRES.

365. Huit Pourpres triangulaires rares ; savoir, quatre des Indes, dont une blanche, & trois blanches à taches peu nombreuses rousses plus ou moins foncées, à stries circulaires, & à trois grosses côtes longitudinales qui s'étendent sur tous les orbes, & dans l'intervalle desquelles on en remarque trois plus petites, de même extension, de forme oblongue, à tête très-élevée, à lèvre extérieure en bourrelet aplati & dentelé, avec une petite avance plate en forme de commencement d'aîle ; & quatre petites du Sénégal, dont deux blanches, & deux blanches marbrées de brun brûlé dans les intervalles des côtes, qui sont ailées & tranchantes dans le premier orbe, arrondies dans les autres, & à queue fermée comme un tuyau,

* Adanf. Hist.
du Sénég. pl.
9. fig. 21.

nommées par M. Adanson *le Jarou* *.

366. Une *Pourpre triangulaire ailée* des Indes, très-rare, blanche, à stries circulaires très-fines, & à trois côtes longitudinales, de chacune desquelles, & principalement de celle qui borde la lèvre, s'élèvent de longues avances papyracées en forme d'aîle, à tête très-élevée, composée de sept orbes un peu renflés, & à lèvres en vive arrête ; elle porte trois pouces trois lignes de long.

367. Une *Pourpre ailée* différente de la pré-

cédente, en ce que les stries en sont plus prononcées, que les aîles s'y prolongent jusqu'à le clavicule, que la tête en est moins élevée, quoique composée de neuf orbes, que les intervalles des côtes aîlées y sont chacun chargés d'une bosse, que la queue en est recourbée en dessus, & divisée en une espèce de fourche, & qu'elle n'a que deux pouces de long.

VIII. FAM.
POURPRES.

368. Une Pourpre aîlée semblable à la précédente, à cela près que les aîles en sont fort contournées, que celle du côté extérieur de la bouche en est fort large, & que la queue en est à peine fourchue.

369. Une *Pourpre rameuse* des Indes, à coque mince, blanche, chargée de six rangs de feuilles noires très-déchiquetées, & connue sous le nom de *Ratie* * ; elle est grande dans son espèce.

* Arg. pl.
16. lett. E.

370. Deux *Raties* en pendant, moins grandes que la précédente.

371. Deux Pourpres rameuses des Indes ; à zones alternatives blanches & jaune-foncé, à six rangs longitudinaux de petites feuilles jaunes très-frisées, ce qui leur a fait donner le nom de *Chicorée* *.

* Ibid. Item

372. Cinq Pourpres, dont trois *rameuses*, & deux *épineuses* ; savoir, une rameuse brune, à six côtes longitudinales, dont cinq chargées de très-petites feuilles, & la dernière, qui borde

la lèvre extérieure, d'autres très-grandes, lar-
VII. FAM. ges & applaties à l'extrémité ; ce qui a fait
POURPRES. donner en France, à cette espèce, le nom de

* Arg. pl. *Patte de crapaud* *, & en Hollande celui de
 16. lett. D. *Bois de cerf* ; deux petites *Pattes de crapaud*,
 Séba, pl. 77. dont une canelle à côtes peu prononcées, & à
 n°. 13-16. deux rangs de longues feuilles, l'autre blan-

Valent. uni-
 val. f. 37. che *, semblable du reste à la première ; & deux
 * Valent. ib.
 f. 36. petites *épineuses* blanches nuées de fauve, à
 stries circulaires, & à six côtes longitudinales
 un peu obliques, chargées d'épines peu lon-
 gues, mais très-aiguës, & à tête très-élevée,
 composée de neuf orbes. *

373. Onze Pourpres de diverses grandeurs ;
 sçavoir, la plus grande, *rameuse* d'Amérique,
 à coque mince fauve, à stries circulaires iné-
 gales, à six côtes longitudinales chargées de
 feuilles grandes & petites marron, à sept orbes
 bombés, & à lèvre intérieure teinte de couleur
 de rose ; six de la Méditerranée par pendans,
 fasciées de blanc & de marron, à stries fines
 circulaires, à côtes longitudinales tuberculeu-
 ses, garnies d'un appendice couché dans le
 même sens en forme d'écorce, & à couronne
 de tubercules, se prolongeant dans les second
 & troisième orbes * ; une qui ne diffère des
 troisième & quatrième de l'article 364, qu'en
 ce qu'elle a six côtes longitudinales ; elle loge
Bernard-l'Hermite ; deux *Chicorées*, & une *Rôtie*.

* Roman. cl.
 3. f. 272.
 Gual. tab. 31.
 litt. C.

374. Une petite Pourpre épineuse des Indes, ~~très-rare~~, fond blanc, à stries circulaires de même, à huit côtes longitudinales obliques, noires, hérissées de longues pointes aiguës de même couleur, qui régnerent de la tête à la queue, à tête bombée, composée de cinq orbes, à clavicule blanche, espèce qu'on doit regarder comme une variété de celle que M. d'Argenville appelle *Radix à feuillages noirs* *, & qu'on peut nommer le *Radix à pointes noires*.

VIII. FAM.
POURPRE.

* Arg. append.
pl. 2. lett. K.

375. Une grande Pourpre rameuse des Indes, rare, blanche, veinée & fasciée de couleur de rose, à bouche & grand umbilic aussi couleur de rose, de forme ventrue, à tête assez élevée, & à neuf rangs longitudinaux de feuilles plus ou moins grandes, repliées en pointe dans les deux premiers orbes.

G E N R E S E C O N D.

*POURPRES A QUEUE PLUS ÉTROITE ,
LONGUE. ET DROITE.*

376. *UNE* Pourpre des Indes , couleur de chair , marbrée de noirâtre , de brun & de blanc ;
VIII. FAM. *POURPRES.* à stries fines circulaires , à trois grosses côtes longitudinales , & à trois rangs intermédiaires de petits tubercules , à bouche couleur de rose , & à très-longue queue , nommée *Tête de bécasse* * , très-grande dans son espèce , & de la plus belle conservation.

* Arg. pl.
 66. lett. B.
 Séba , pl. 78.
 n°. 6.

377. Une grande *Tête de bécasse* , à queue moins longue que la précédente , & deux petites en pendant , blanches , nuées & tachées de fauve , à stries fines circulaires , à tête aplatie , bordée d'une strie plus saillante , à clavicule en mammelon couleur de chair , & qui n'ont ni côtes , ni tubercules , comme l'espèce précédente.

378. *Idem.*

379. Une Pourpre des Indes , blanche , veinée de fauve , à trois côtes longitudinales chargées , dans toute leur longueur , d'épines fines ou arrêtes , longues , pointues & recourbées , à queue longue , creusée intérieurement en canal ,

espèce nommée en France la *grande Bécasse épineuse* *, & en Hollande l'*Araignée* ; elle est grande & très-bien conservée.

VIII, FAM.
POURPRES.

* Arg. pl.

380. Une *Bécasse épineuse*, de même espèce, fauve-clair, moins grande que la précédente.

16. lett. A.
Séba, pl. 78.
n°. 1 & 2.

381. Une autre, gris-cendré, un peu moins grande encore.

382. Cinq Pourpres ; sçavoir, quatre *Bécasses épineuses*, d'espèce moins rare que les précédentes, dont deux des Indes, grises, nuées de fauve, à épines moins nombreuses & moins longues, mais du reste semblables à celles de l'article 379 * ; & deux d'Amérique, blanches, veinées de fauve, à épines plus courtes & plus grosses, à queue fourchue & recourbée dans son milieu. La cinquième est une grosse *Tête de Bécasse* de l'espèce déjà décrite.

* Liff. tab.
902. f. 22.
Séba, pl. 78.
n°. 4.

383. Six Pourpres ; sçavoir, deux *Têtes de Bécasse* d'Amérique, l'une de moyenne grandeur, & fauve nué de verdâtre, l'autre petite & marron-clair, toutes deux à robe réticulée, & à côtes un peu épineuses * ; & quatre *Bécasses épineuses* comme celles de l'article précédent, à cela près que celles des Indes sont blanches.

* Rumph.
tab. 26. litt. P.

384. Une grande Pourpre des Indes, rare, blanche, à stries circulaires légèrement granuleuses, à six côtes longitudinales un peu applaties, chargées de deux rangs circulaires de

grandes épines, celles d'en-haut plus fortes, & VIII. FAM. les autres moins, à deux rangs obliques de pe-
POURPRES. tites épines sur la queue, à tête aplatie, & à
lèvre intérieure saillante en dehors, espèce qu'on

* Séba, pl. nomme la *grande Massue d'Hercule* *.
71. n°. 7.

385. Une *Massue d'Hercule* un peu plus grande que la précédente, mais à queue & épi-

* Ibid. n°. 8, nes moins longues à proportion *.

386. Sept *Massues d'Hercule*, dont six par pendans; sçavoir, quatre de la Méditerranée, fauves de diverses nuances, différentes des précédentes, en ce que la tête en est plus élevée, qu'elles n'ont chacune qu'un rang d'épines sur la queue, & qu'outre les deux rangs du premier orbe, elles en ont un troisième sur les deux or-

* Gualt. tab. bes suivans *; l'une d'elles conserve son aper-
30. litt. F. cule; deux d'Amérique, peu communes, fau-
Rumph. tab. ves, nuées de gris & de blanc, qui différent
26. n°. 1. de celles-ci, en ce qu'au lieu d'épines, elles

* Ibid. n°. 4. n'ont que des tubercules terminés en pointes *;
& une petite de la Méditerranée, fauve & rare, en ce qu'elle a sur le corps trois rangs d'épines, mais semblable du reste aux premières de cet article.



NEUVIEME FAMILLE.

TONNES OU CONQUES SPHÉRIQUES.

CE sont des Coquilles à peu de volutes, rarement tuberculeuses, de forme très-renflée, à bouche large & évasée, ordinairement dépourvue de dents, à tête petite ou peu élevée, dont elles sont même quelquefois entièrement privées. Leur bouche est entière ou échancrée, ou garnie d'une petite queue, ce qui nous fournit leur division en trois genres, qui sont,

IX. FAM.
TONNES.

- 1°. Les Tonnes à bouche entière.
- 2°. Les Tonnes à bouche échancrée.
- 3°. Les Tonnes à bouche garnie d'une petite queue.



GENRE PREMIER.

TONNES A BOUCHE ENTIERE.

- 387. HUIT** Tonnes par pendans ; sçavoir ,
 IX. FAM. fix différentes par leurs marbrures , mouchetures
 TONNES. & nuances , à coque mince , de forme ovale ,
 à bouche évasée vers le bas , & à tête creusée
 en dedans en spirale en forme d'ombilic , espèce
 * Gualt. tab. qu'on nomme *la Muscade* ou *la Noix* * ; & deux
 12. litt. E. blanches nuées de fauve , de forme encore plus
 Séba , pl. 38. oblongue , à stries fines circulaires , & à bouche
 n°. 34 & 38. fort évasée vers le bas , nommées *Oublies* ou
Papier roulé , toutes deux grandes dans leur
 * Bonan. cl. espèce * .
 3. f. 3.
 List. tab. 714. **388.** Dix *Noix de mer* de moyenne gran-
 f. 71. deur ; sçavoir , deux blanches , de forme ap-
 prochante de la sphérique , à stries circulaires
 très-fines , à coque papyracée , & à bouche dé-
 bordant les deux extrémités du corps , variété
 nommée *la Bulle d'eau* * ; deux *Muscades* mou-
 * Arg. pl. chetées l'une fauve & gris , l'autre fauve &
 17. litt. Q. rouge-brun , & à deux petites zones bleu-
 Séba , pl. 38. foncé * ; deux autres *Muscades* nuées & mou-
 n°. 45. chetées de fauve , d'amarante & de couleur
 * Ibid. n°. de chair * ; deux autres nuées d'olive , mar-
 41 & 43. 39 & 42.

brées par bandes longitudinales de bleuâtre, ~~de~~
 de forme plus oblongue, & à bouche plus
 étroite que les précédentes * ; & deux *Oublies* **IX. FAM.**
 couleur de paille. Plus, deux petites Tonnes **TONNES.**
 papyracées, à larges zones gris de lin, séparées *** Gualt. tab.**
 les unes des autres par de petits cercles noirs. **12. litt. F.**
Bonan. cl. 34.
fig. 3. altera.

389. Vingt-deux petites Tonnes, sçavoir,
 une rare, blanche, fasciée par zones de taches
 rouges quarré-long, à stries circulaires bien
 prononcées, à tête un peu élevée, à petite bou-
 che, & à lèvre intérieure armée d'une dent;
 une peu différente de la précédente, non moins
 rare, à cordons circulaires fort ferrés, semés
 de petites taches quarrées alternativement blan-
 ches & noires, & à deux petites zones blan-
 ches, espèce qui vient de l'Isle de France, où
 on la nomme *Pistache* * ; Quatre *Pistaches* un
 peu plus petites, à taches blanches & grises *** Litt. tab.**
 moins marquées; deux *Muscades* rares, papy- **992. f. 54.**
 racées, à robe blanche, rayée de petits cer-
 cles ondés-bruns * ; deux rares encore, aussi *** Séba, pl.**
 papyracées, à larges zones alternatives blan- **38. n°. 49.**
 ches & couleur de rose, séparées les unes des
 autres par de petits cercles bruns; quatre *Bulles*
d'eau blanches papyracées * ; six *Oublies* blan- *** Gualt. tab.**
 ches papyracées *, & deux *Muscades* de la va- **13. litt. D.**
 riété des cinquieme & sixieme de l'article pré- *** Ibid. lit. 24.**
 cédent.

GENRE SECOND.

TONNES A BOUCHE ÉCHANCRÉE.

390. DEUX très-grandes Tonnes couleur de noisette, umbiliquées, à tête peu élevée, à lèvre extérieure unie & mince, & à pas des orbes creusés en forme de fillon, dont une à grosses & petites fascies circulaires, celles-ci placées dans les cannelures de celles-là; & l'autre à grandes cannelures sans petites fascies intermédiaires *.

* Gualt. tab.
42. litt. A.

* Séba, les
deux grandes
Coq. de l'an-
g^{le} gauche
du haut de la
pl. 69.

391. Deux autres moins grandes, dont une rare, fauve, à petites cannelures, & à larges fascies, tachées par chevrons quelquefois en zig-zag de blanc, de gris & de marron de diverses nuances *; & une comme la première de l'article précédent, à la lèvre extérieure près, qui est bordée d'une espèce d'excroissance tufée.

* Ibid. les
deux grandes
Coq. au des-
sous de celles
que nous avons
citées dans la
pl. 69.

392. Trois autres un peu moins grandes; sçavoir, deux en pendant de l'espèce de celles de l'article 390; & une blanche *, à larges cannelures, & à fascies ornées de taches fauves quarrées, également distantes les unes des autres.

393. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux

deux à fascies peu larges, fauves, & à larges cannelures blanches ; & deux fauves à fascies larges & applaties , à cannelures étroites, umbiliquées , & de l'espèce nommée *Perdrix* *, dont une à taches blanches uniformes sur toutes les fascies , & une autre plus rare à cinq zones intermédiaires , où ces taches sont disposées par intervalles beaucoup plus larges.

IX. FAM.
TONNES.


* Arg. pl.
17. lett. A.
Gualt. pl. 524
lett. E.

394. Quatre Tonnes ; sçavoir, une blanche tachée de fauve de l'espèce de la première de l'article 391 ; une comme la dernière de l'article 392 , mais à cannelures plus larges, chargées chacune de trois stries ; & deux *Perdrix* de la variété de la première de l'article précédent.

395. Trois jolies Tonnes ; sçavoir, une toute blanche, à fascies disposées comme dans la première de l'article 390 , mais différente en ce qu'elle est à tête plus élevée , à clavicule marron , à lèvre extérieure retroussée en bourrelet , & chargée en-dessous de plusieurs paires de dents ; une qui ne diffère de la précédente que par ses cannelures simples & par cinq larges zones fauves qui se perdent à quelque distance de la lèvre extérieure ; & une qui diffère de la dernière de l'article 392 , en ce que sa lèvre extérieure est un peu retroussée & dentelée.

396. Huit petites Tonnes par pendans ; sçavoir, deux blanches marbrées de jaune-pâle &

210 COQUILLES UNIVALVES.

 de fauve, à fascies circulaires un peu arrondies, à cannelures peu profondes, à lèvre extérieure saillante & convexe en dehors, & ar-

* Arg. pl. mée, ainsi que l'intérieure, de grosses dents * ;
17. lett. L.
Gual. tab. 51. deux *Perdrix*, dont une fauve foncé, à petites taches grises *, & l'autre entièrement blanche ;
17. lett. C.
* Séba, la
Coquille du deux comme les premières de l'article 393,
milieu du bas
de la pl. 69. mais de couleurs moins vives, & deux comme

* Arg. pl. la dernière de l'article précédent *.
17. lett. C.

397. Deux très-grandes Tonnes en pendant, à robe lisse, canelle, à tête aplatie, dont les trois premiers orbes, à pas concaves, sont couronnés de clouds tuilés, & les trois derniers faillent de la couronne intérieure en forme de mammelon, à bouche fort évasée, espèce nommée en Hollande *Gondole mammillaire*, & en

* Séba, pl. France *Couronne d'Éthiopie* *.
65. n°. 1 & 2.

398. Deux *Couronnes d'Éthiopie*, moins grandes & de couleur un peu plus foncée que les précédentes, & à deux rangs seulement de spires couronnées *.

* Séba, pl.
65. n°. 4.
Gualt. tab. 29.
lett. I. 399. Deux *Couronnes d'Éthiopie* en pendant, & peu communes ; elles diffèrent de l'espèce précédente, en ce qu'elles sont marbrées par grandes taches blanc de lait & canelle foncé, flottantes dans deux larges zones ; elles ont deux rangs de spires couronnées comme

* Séba, pl. celles de l'article précédent *.
65. n°. 12.

400. Deux autres petites & non moins rares,

fauves, à taches brunes disposées en deux zones, & à une seule spire couronnée *.

IX. FAM.

401. Cinq petites Tonnes ; sçavoir, trois **TONNES.**
Couronnes d'Ethiopie, dont une canelle à large * Séba, pl.
 zone du milieu moins foncée, & à une seule 65. n°. 10.
 spire couronnée * ; une à zone blanche nuée de List. tab. 797.
 fauvé, & la troisieme marbrée de blanc & de f. 4.
 marron ; ces deux dernieres ont un gros mam-
 melon & un commencement de couronne ;
 une rare, paille nuée de jonquille, qui ne dif-
 fère des *Couronnes d'Ethiopie*, qu'en ce qu'elle
 est plus oblongue, plus mince, sans couronne,
 & que le mammelon, qui en est plus gros, y
 est formé d'un seul orbe, variété qu'on nomme
Prépuce, & un *Prépuce* qui ne diffère du pré-
 cédent qu'en ce que le pas de sa spirale en est
 un peu concave *.

* Séba, pl.
66. n°. 13 &

402. Deux *Gondoles mammillaires* très-ra-
 res, en pendant, à robe marron-clair, mar-
 brée dans trois zones, & par chevrons, de ta-
 ches blanches, à six révolutions de spire, se re-
 couvrant l'une l'autre, & dont les cinq dernie-
 res composent un mammelon fort élevé, peu
 différent de la clavicule du *Prépuce* *.

* Bonan: pl.

403. Une grande *Gondole mammillaire* peu
 commune, couleur de tuile, à trois rangs de
 larges taches brunes, disposées par zones, de
 forme très-renflée, & à mammelon peu sail-
 lant *.

3. f. 101

* List. tab.
799. n°. 6.
Séba, pl. 64
n°. 5 & 6.

404. Quatre Gondoles; ſçavoir, une *mam-*
IX. FAM. *millaire* fauve-roux foncé, à quatre orbes, dont
TONNES. les premiers ſont ſéparés par un fillon très-

* Séba, pl. profond * ; une ſans mammelon, veinée de
 364. n°. 3. blanc, de fauve & de gris de lin, à extrémité
 de la lèvre un peu ſinueuſe vers le haut, nom-

* Ibid. pl. 65. mée *Taſſe de Neptune* * ; une blanche à pas du
 365. 3. premier orbe faillant en dehors en vive arrête,
 concave en-deſſus, & à très-petit mammelon,
 eſpèce qu'on nomme à Paris *Cuiller de Nep-*
 * Ibid. n°. *tune* *, & une *Couronne d'Ethiopie* de la va-
 366. 6. riété de celles de l'article 398.

405. Deux très-grandes *Gondoles*, ventre
 de biche, ſans mammelon & même ſans tête,
 mais dans le ſommet deſquelles un prolonge-
 ment de la lèvre extérieure ſe replie ſur l'inté-
 rieure, & y forme une eſpèce de petit umbi-
 lic *. On a enlevé une portion du deſſous d'une
 * Liſt. tab. 32, f. 8, 8a. de ces *Gondoles*, pour en faire voir le dedans.

406. Une *Harpe* très-rare, marbrée par
 zônes inégales, de rouge-pâle tirant ſur l'au-
 rore, de brun & de blanc, à un grand nombre
 de côtes longitudinales laiſſant entr'elles des
 cannelures très-profondes; ces côtes ſe prolon-
 gent vers le haut dans tous les orbes, formant
 au bord du premier, qui eſt un peu concave,
 une eſpèce de couronne de petits tubercules,
 & ſe terminant vers le bas à un bourrelet qui

naît de la lèvre intérieure : on nomme cette ~~espèce~~
 espèce *Harpe noble* *,

IX. FAM,

TONNES.

407. Deux grandes *Harpes* peu communes
 en pendant, à quinze côtes étroites, rayées de
 traits en zig-zag blancs & bruns, placées à dis-
 tances égales, & laissant entr'elles de larges
 cannelures petit gris : c'est la belle Harpe, ou
 le *Harpa nobilis* de M. d'Argenville *.

* Arg. Ap.

pend. pl. 24.
lett. F.

* Arg. p. 12

17. lett. D.

408. Deux autres *Harpes* en pendant, à
 quatorze côtes plus larges & plus inclinées que
 celles des précédentes, marbrées, ainsi que les
 cannelures, de traits ou chevrons couleur de
 rose, fauves, blancs & marron, à large zone
 intermédiaire un peu plus foncée, & à deux
 grandes taches brunes en-dessous *.

* Séba, pl. 12.

409. Deux autres, l'une à douze, l'autre à
 treize côtes inégales ; elles diffèrent d'ailleurs
 des précédentes, l'une par les couleurs moins
 foncées, l'autre par des chevrons plus nom-
 breux, placés les uns près des autres en zig-
 zag, & par des stries longitudinales mieux pro-
 noncées.

70.

Bonan. cl. 3.
f. 185.

410. Neuf *Harpes*, dont six très-variées par
 leurs marbrures & leurs couleurs ; une de l'es-
 pèce de celles de l'article 407, & deux dont
 on a enlevé les cannelures & conservé les cô-
 tes, ce qui met leur columelle à découvert.

411. Six Tonnes par pendans ; sçavoir, deux
 grises à stries circulaires, à grand nombre de

214 COQUILLES UNIVALVES

~~IX. FAM.~~ fascies étroites, formées de petits quarrés longs
TONNES. alternativement blancs & violet foncé, à large
 bouche & à lèvre intérieure tirant sur l'aurore,
 espèce qu'on nomme en Hollande *le Rodolphe*,
 & en France *Conque Persique* ou *Pourpre de*
Panama * ; deux grises à stries fines circulaires,
 & grosses fascies chargées vers le haut de tuber-
 cules, ressemblantes d'ailleurs à la *Conque Per-*
sique, & à bouche aurore-vif * ; & deux autres
 de même espèce, couronnées de plus gros tu-
 bercules, & dont la tête est recouverte de
 glands de mer.

412. Deux très-grandes *Conques Persiques*,
 polies, de la variété des deux premières de l'ar-
 ticle précédent, & d'un très-grand éclat.

413. Treize Tonnes, dont douze par pen-
 dans ; sçavoir, deux orangées, marbrées par
 zones inégales de blanc, à stries circulaires un
 peu rabotteuses, de forme oblongue, & à tête
 presque conique * ; quatre *Conques Persiques*
 d'Amérique, dont deux grandes & deux petites
 à fascies tuberculeuses violettes plus nombreu-
 ses, à robe un peu marbrée de blanc, & à bou-
 che de même couleur que le fond : c'est la *Mûre*
 de M. d'Argenville * ; deux à fascies légére-
 ment tuberculeuses, dont les taches sont alter-
 nativement blanches & marron, & à bouche

* orangé * ; deux de la variété des premières de
 l'article 411 ; deux comme les troisième & qua-

* Arg. pl. 17.
 Lett. E.

Gualt. tab. 51.
 Lett. L

Séba, pl. 72.
 n^o. 10.

* Gualt. tab.
 51. Lett. A.

List. tab. 288.
 f. 48.

* Séba, pl.
 73. Lett. T.

* Arg. pl. 17.
 Lett. H.
 List. tab. 289.
 f. 49.

* Séba, pl.
 74. n^o. 12. 15.

même du même article, mais à fascies tuberculeuses plus prononcées * ; & une petite fort jolies, dont les marbrures blanches, noires & jaunes imitent le point d'Hongrie.

IX. FAM.
TONNES.

* Seba, pl.
52. n°. 13 &
14.

414. Onze Tonnes, dont dix par pendans & des espèces ci-dessus décrites ; sçavoir, deux grandes *Oublies*, deux *Prépuces* de la variété du dernier de l'article 401 ; deux d'une autre variété plus renflée*, desquelles on a enlevé une portion de la base, pour en faire voir la colonne ; une *Cuiller de Neptune*, deux grandes *Harpes*, & deux *Conques Persiques* qui ne diffèrent des premières de l'article 411, que par de petites fascies blanches moins interrompues de taches violettes *.

* Lill. tab.
796. f. 3.

* Seba, pl.
72. n°. 11.



 GENRE TROISIEME.

 TONNES A BOUCHE GARNIE D'UNE
 PETITE QUEUE.

415. **T**ROIS Tonnes ; sçavoir, deux blan-
 ches nuées de couleur de chair, à robe réticu-
 lée, à tête aplatie & de forme un peu allongée,
 nommées *Figues blanches* * ; & une blanche
 nuée de jaune, à stries circulaires qui ne sont
 bien prononcées que vers la queue, qui est
 étroite & un peu contournée, à coque mince,
 renflée de corps, umbiliquée, & à tête plate,
 espèce nommée *le Radix* *.
416. Quatre Tonnes par pendans ; sçavoir,
 deux fauve-clair nué de gris, à stries circulaires,
 dont trois plus grosses & tuberculeuses, à tête
 un peu élevée, à pas aplatis couronnés de tu-
 bercules, & séparés par un petit fillon, à co-
 que épaisse umbiliquée *, & qu'on peut regarder
 comme une autre espèce de *Radix* ; & deux
Figues blanches plus grandes que les précé-
 dentes.

 IX. FAM.
 TONNES.

 * Gualt. tab.
 26. litt. M.
 Séba, pl. 68.
 n°. 1-4.

 * Arg. pl. 17.
 litt. K.
 Séba, pl. 68.
 n°. 7 & 8.

 * Liff. tab.
 294. f. 14.

417. Trois Tonnes ; sçavoir, deux *Figues*
 bariolées de gris, de jaune-pâle & de brun, à
 quatre zones plus blanches, à rézeau très-fin &
 très-ferré, & à bouche violette, ce qui les a

fait nommer *Figues violettes* * ; & un Radix à coque mince de l'espèce de celui de l'article 415. IX. FAM. TONNES.

418. Un beau *Radix* plus grand que les précédens, à stries fines circulaires s'étendant sur toute sa robe, & à queue couleur de rose. * Arg. pl. 17. lett. O. Séba, pl. 68. n°. 5.

419. Trois *Figues* ; sçavoir, deux peu communes ; à coque plus épaisse & à queue plus longue que les précédentes, dont une blanche nuée & flambée de jaune, à stries fines circulaires, à pas aplatis, bordés d'un cordon dentelé, & séparés par un sillon ; une qui ne diffère de la précédente que par ses flammes plus foncées, & par les pas un peu moins aplatis, dépourvus du bord dentelé * ; & une qui diffère de celles de l'article 417, en ce qu'elle est à bouche blanche, à rézeau mieux prononcé, à robe grise nuée de jaune, & marbrée par grandes taches de brun-roux. * Ibid. n°. 19 & 20.




DIXIEME FAMILLE.

V F S.

X. FAM.
VIS.

CE sont des Coquilles contournées à grand nombre de spirales, de forme conique très-effilée, à bouche petite, oblongue ou arrondie, & à tête fort élevée. Elles sont ou *lisses*, ou *striées*, ou *tuberculeuses*, & se divisent ainsi naturellement en trois genres, qui sont :

- 1°. Les Vis lisses.
- 2°. Les Vis striées.
- 3°. Les Vis tuberculeuses.



GENRE PREMIER.

V I S L I S S E S.

420. **D**EUX grandes & belles Vis, fond blanc, à zones obliques suivant la spire, à raison de deux par chaque révolution, & formées de taches brunes nuées de rougeâtre; inégales entr'elles, qui représentent quelquefois des caractères, à bouche un peu oblongue & échancrée, espèce qu'on peut nommer *Vis à caractères* * : c'est le *Cloud* de M. d'Argenville.

X. FAM.
VIS.

421. Deux très-belles *Vis à caractères* de grandeur moyenne, & semblables aux précédentes, à cela près que les taches de chaque révolution de spire y représentent des caractères mieux formés.

* Guast. tab.
56. litt. I.
Séba, pl. 56.
n°. 6.
Arg. pl. 11.
lett. A.


422. Deux très-belles Vis de forme fort effilée; sçavoir, une très-grande à vingt-deux révolutions de spire, blanche, à deux rangs de taches brunes sur chaque révolution *; & une moins grande & moins effilée qui en diffère encore en ce que chaque révolution de spire s'y amincit dans le tiers le plus élevé de sa hauteur, & est chargée de trois zones de taches, toutes deux de l'espèce nommée *Vis tigrées* *.

* Séba, pl.
56. n°. 28.
Guast. tab. 56.
litt. B.

423. Deux très-belles Vis peu communes,

* Séba, pl.
56. n°. 27.

220 COQUILLES UNIVALVES

 de couleur fauve , à dix-sept révolutions de spire , dont la moitié supérieure est un peu renflée & chargée d'une zone de taches blanches , rondes dans l'une , ovales dans l'autre *.

X. FAM.
VIS.

* Rumph.
tab. 30. litt. D.
Séba, pl. 56.
n^o. 14.

424. Quatre Vis ; sçavoir , deux rares couleur de chair , à dix-sept révolutions de spire , flambées de traits longitudinaux blancs , excepté dans la partie supérieure qui est un peu rentrante , & forme une espèce de ruban de la couleur du fond ; & deux *Vis tigrées* de la variété de la première de l'article 422.

425. Six Vis par pendans , dont deux de l'espèce des deux premières de l'article précédent : deux à caractères , & deux tigrées.

426. Quinze Vis de moyenne grandeur & petites ; sçavoir , quatre , dont deux blanches , l'une fasciée en zig-zag , & l'autre ponctuée de canelle , & deux bariolées de blanc , de fauve & de brun , toutes de forme un peu cylindrique , à bouche très-oblongue , & s'élargissant vers le bas , espèce nommée la *Tarriere* ou l'*Ai-*

* Arg. pl. 11.
lett. G.

Litt. tab. 738.
f. 30 & 31.

* Arg. pl.
11. lett. Q.

* Ibid. let. Z.

* Séba , pl.
56. n^o. 35 &
36.

guille à coudre * ; une blanche ponctuée de canelle dans le bas de chaque révolution , & de forme effilée , nommée le *Poinçon* * ; une encore plus effilée , à lignes longitudinales orangées , nommée l'*Alène* * ; deux blanches à une large zone bleu-foncé , quelquefois interrompue , régnant vers le haut de chaque révolution de spire * ; une à révolutions de spire un peu ren-

flées vers le haut, où elles sont pointillées de marron, & à taches longitudinales de même couleur dans la partie rentrante des spires qui, avec les points supérieurs, imitent les caractères Hébraïques; deux *tigrées*, deux à *caractères*, & deux de l'espèce des premières de l'art. 424.

X. FAM.

VIS.

G E N R E S E C O N D.

V I S S T R I É E S.


427. **V**INGT-QUATRE Vis striées; savoir, deux marbrées de gris & de lilas, à douze orbes bombés diminuant proportionnellement, & chargés chacun de petits bourrelets longitudinaux qui se raccordent & tiennent ensemble d'un orbe à l'autre, comme dans la *Scalata*, sans cependant laisser de jour entr'eux, comme dans celle-là *, à laquelle ces Vis ressemblent d'ailleurs, ce qui les a fait nommer *fausses Scalata* *; deux *fausses Scalata* blanches de nos mers *; deux autres petites d'Amérique, lie de vin obscur; une autre aussi d'Amérique, grise nuée de blanc, & à stries plus en vive arrête que celles des précédentes; une plus petite, blanche, à moins de révolutions, & fort ventrue; deux *fausses Scalata* de l'espèce des secondes de cet article, à orbes découpés, &

* Voy. l'art. 55 des Coq. de notre Catalogue.

* Bonan. cl. 3. f. 111.

* List tab. 588. f. 51.

222 COQUILLES UNIVALVES

 dont il ne reste plus que les stries, ce qui permet d'en voir l'intérieur; & quatorze Vis pendants, de l'espèce nommée *Enfant au maillet*, dont deux rares d'Amérique, blancs, de forme cylindrique & bombée, à stries en forme de rides sur le premier orbe seulement, à bouche garnie de deux dents, à lèvre extérieure retroussée en dehors, umbiliqués, & grands dans cette espèce; deux rares de forme courte & renflée, & à bouche dépourvue de dents; deux de forme un peu plus allongée, à bouche garnie de deux dents ¹; deux encore plus longs ²; deux à stries plus nombreuses & moins prononcées ³; deux de nos mers ⁴; & deux rares des Indes, lisses & blancs, à trois larges bandes bleues, à bouche dépourvue de dents, & qu'on nomme plus particulièrement *Vis à tête tronquée*.

¹ List. tab. 388. f. 47.
² Ibid. f. 48.
³ Ibid. f. 49.
⁴ Séba, pl. 59. n°. 21.

428. Une Vis des Indes, marron-brun, à stries circulaires bien prononcées, à stries longitudinales fines en forme de rides, & à base presque plate, espèce nommée en Hollande la *Bouée*, en France le *Télescope*, & grande dans cette espèce ⁵.

⁵ Arg. pl. 11. lett. B.
 Séba, pl. 50. n°. 1-4.

429. Une Vis des Indes, brune nuée de fauve & de verdâtre, à révolutions de spire chargées chacune de trois stries circulaires & de plis longitudinaux qui les rendent onduleuses, à lèvre extérieure fort évasée & un peu retroussée en

dehors, espèce nommée à Paris la *Cuiller à pot* :
celle-ci porte cinq pouces de long, & est d'une belle conservation *.

X. FAM.

V I S.

* Séba, pl.

430. Une autre *Cuiller à pot* un peu moins grande que la précédente.

50. n°. 13 & 14.

431. Un *Télescope*, & une *Cuiller à pot* de moyenne grandeur.

432. Une très-belle *Aiguille* des Indes de plus d'un demi-pied de long, marron s'éclaircissant de plus en plus depuis le bas jusqu'à la clavicule qui est blanche, à trente-quatre orbes bombés, chargés chacun de six stries séparées par de profondes cannelures, & à bouche presque ronde, nommée par Séba *Aiguille faite en vis de tambour* *.

* Ibid. pl. 58.

433. Deux *Aiguilles* en pendant de l'espèce de la précédente, mais de forme moins allongée, de couleur fauve, & de vingt-trois orbes seulement.

n°. 12.

Gualt. tab. 58.

litt. A.

Arg. pl. 11.

litt. D.


434. Une grande *Vis* blanche nuée de fauve, à orbes chargés de stries circulaires très-fines, & de trois plus marquées, dont une très-saillante en vive arrête, à pas des orbes formant avec leurs voisins des angles rentrants, & à bouche semblable à celle des précédentes, espèce que l'on connoît sous le nom de *Vis de pressoir* *.

* Gualt. tab.

435. Deux *Vis de pressoir* en pendant, moins grandes que la précédente, & qui en diffèrent

8. litt. B.

224 COQUILLES UNIVALVES

 d'ailleurs, en ce qu'au-dessus de la grande arête qui forme la sommité de chaque orbe, on y en remarque une seconde un peu moins forte, laissant entr'elle & l'autre une large cannelure*.

X. FAM.
VIS.

* Arg. pl. 11.
lett. C.
Gualt. tab. 58.
lett. C.

* Ibid. tab.
57. litt. N.
List. tab. 837.
f. 64.

* Gualt. tab.
58. litt. E.
Séna, pl. 56.
n°. 33 & 34.

* List. tab.
591. fig. 56.

436. Treize Vis, dont douze par pendants; sçavoir, deux peu communes, & grandes dans leur espèce, nuées de blanc, de fauve & de bleu, à bouche oblongue, à révolutions de spires séparées chacune en deux par un sillon vers les deux tiers de leur hauteur, & chargées de cannelures longitudinales très-serrées*; deux marbrées de brun, de blanc & de fauve-roux, à stries circulaires grosses & fines, à révolutions de spires applaties & séparées par un léger sillon, à bouche presque ronde, & grandes dans leur espèce*; deux de forme à peu près semblable, à dix retours de spire, chargés chacun de trois cordelettes noires, séparées par des cannelures blanches; deux blanches de la variété de celles de l'article 433; deux petites grises de la même espèce; deux grises nuées de fauve, qui n'en diffèrent que par des stries plus grosses au haut de chaque orbe*; & une *Vis de pressoir* de la variété de l'article 434,

437. Vingt Vis de différentes grandeurs, dont seize par pendants; sçavoir, deux *Aiguilles* peu communes, à taches quarré-long, alternativement rouges & incarnates, à stries circulaires

laïres traversées de hachures longitudinales qui les rendent granuleuses , & à révolutions de spire , bordées chacune , tant en haut qu'en bas , d'une espèce de bourrelet * ; quatre autres petites fond bleu ou verd de pavot , à révolutions de spire , chargées de stries longitudinales , & bordées dans le haut d'une zone blanche ponctuée de rouge-brun , espèce nommée le *Perçoir* ou le *Foret* * ; deux couleur de chair , tachées par zones d'aurore ; elles diffèrent des précédentes par leurs stries moins prononcées , & par leur bordure de même fond que le reste ; une de même espèce , dont les stries ne sont sensibles que vers la tête ; deux à robe réticulée , aurore nuée de blanc ; une couleur de chair de l'espèce des premières de l'article précédent ; deux de l'espèce des troisième & quatrième du même article , mais à stries circulaires plus fines ; deux de même forme , blanc-sale , marbrées par traits longitudinaux de fauve-roux , à stries circulaires très-fines , & à deux grosses parallèles entr'elles sur chaque orbe * ; une blanche de la variété de celles de l'article 433 ; deux petites de la même espèce , fauve teint de gris de lin , & une *Vis de pressoir*.

X. Fam.
Vis.

* Rumph. tab.
30. litt. H.

* Arg. pl. 111
lett. R.
List. tab. 979
f. 36.

* Ibid. tab.
592. f. 604



GENRE TROISIÈME.

VIS TUBERCULEUSES.

438. QUATRE grandes Vis des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches bariolées de rouge & de bleu foncé, à stries circulaires, à douze orbes chargés de gros tubercules, à lèvre extérieure épaisse & dentelée, & à petite queue*; & deux qui ne diffèrent de celles-ci qu'en ce que la lèvre extérieure en est mince, recourbée en dedans & sans dentelures.

* Gualt. tab.
57. litt. G.
List. tab. 1023.
fig. 87.
Séba, pl. 50.
n°. 15 & 16.

439. Cinq Vis, dont quatre par pendans; sçavoir, deux blanches tachées & pointillées de brun, à orbes garnis d'un rang de tubercules, à lèvre extérieure épaisse, & à petite queue retroussée, espèce que l'on nomme *Chenille bariolée**; deux gris-de-fer, chargées de deux rangs de tubercules, l'un sur le milieu de chaque orbe, l'autre vers le haut, à lèvre extérieure moins épaisse, & petite queue moins retroussée que les précédentes, espèce nommée *Chenille noire**; & une comme les premières de l'article précédent.

* Arg. pl. 11.
lett. H.
Séba, pl. 50.
n°. 37.

* Gualt. pl.
56. litt. L.
Bonan. cl. 3.
fig. 82.

440. Quatorze jolies Vis de moyenne grandeur par pendans; sçavoir, deux marron-brun, à révolutions de spire, formées de cordons gra-

nuleux d'inégale grosseur, & nommées le *Clo-*
cher ou l'*Obélisque Chinois* * ; une qui diffère
des précédentes, en ce que le haut de chaque
orbe est couronné de tubercules blancs, & le
milieu ceint de deux stries granuleuses fauves,
espèce qu'on nomme l'*If* * ; un *If* marron-brun
en entier ; deux *Vis* peu communes, marron,
l'une clair, l'autre plus brun, à côtes longitu-
dinales, & à stries circulaires quelquefois gra-
nuleuses, à bouche presque ronde, à lèvre ex-
térieure renflée, très-faillante en dehors, & se
repliant sur l'intérieure en avant de la petite
queue qu'elle ferme en tuyau, ce qui la rend
très-singulière * ; deux autres non moins rares,
fauve-noirâtre, réticulées, à huit orbes bom-
bés, à bouche ronde échancrée, à lèvre exté-
rieure relevée en dehors en bourrelet, & à cla-
vicule tronquée ; deux blanches réticulées &
granuleuses dans les angles du réseau, à bou-
che ovale finissant par une petite queue retrouf-
fée, espèce qu'on peut nommer *Chenille blan-*
che réticulée * ; deux fauve-grisâtre, à stries cir-
culaires granuleuses, & nommées *Chenilles gra-*
nuleuses * ; & deux *Chenilles bariolées*.

X. FAM.

Vrs.

* Arg. pl. 11.

lett. F.

* Ibid. let. &c.

* Rumph. tab.

30. litt. T.

* List. tab.

1020. f. 84.

* Ibid. tab.

1018. f. 80.

441. Neuf *Vis* de moyenne grandeur, peu
communes ; sçavoir, une fauve, à douze orbes
formés chacun de quatre rangs de stries gra-
nuleuses, à six côtes longitudinales granuleuses
aussi, qui en rendent la forme approchante de



X. FAM.

Vis.

celle d'une pyramide hexagone , à une couronne de tubercules plats sur le premier orbe , à bouche ronde & à lèvre extérieure fort saillante , espèce nommée le *Clocher Gothique* : on en trouve l'analogue fossile à Courtaignon ; un *Clocher*, verd-clair , à stries circulaires très-fines , à révolutions de spire , chargées chacune de huit gros bossages , à bouche ovale , & à lèvre extérieure mince ; deux blancs , tachés par zones inégales de marron clair , à dix orbes bordés dans leur milieu de tubercules aigus , & séparés les uns des autres par de larges pas en doucine , de forme conique vers le bas , à bouche oblongue , & à lèvre extérieure mince , échancrée vers le haut ; une Vis marbrée de marron , de blanc & de bleu clair , à côtes longitudinales , & stries fines transversales formant un rézeau , à bouche oblongue , à lèvre extérieure échancrée en haut & en bas , & dentelée ; trois blanches , dont une marbrée de fauve , à stries circulaires , à dix orbes tuberculeux , & à bouche semblable à celle de la première de cet article ; & une blanche à stries circulaires granuleuses , à neuf révolutions de spire , concaves vers leur milieu , & bordées vers le haut de cercles tuberculeux plats , à un rang de petites côtes longitudinales sur le premier orbe , à lèvre extérieure échancrée vers le haut , & à umbilic.

442. Neuf Vis peu communes, dont huit par pendans ; sçavoir , deux blanches à quinze ré- X. FAM.
VIS.
volutions de spire , couronnées de plis longitu-
dinaux peu saillans , à bouche oblongue finissant
par une petite queue retroussée , grandes dans
leur espèce , & nommées *Chenilles blanches* * ;
deux fond blanc , à révolutions de spire , tachées * Arg. pl. 12.
lett. P.
Gualt. tab.
57. litt. D.
List. tab. 1020.
F. 83.
vers le bas de couleur de chair , entre deux cer-
cles ponctués de même , & couronnés vers le
haut de petits tubercules , à bouche oblongue
& échancrée dans le bas * ; deux d'Amérique ,
blanches , à vingt retours de spire concaves , * Séba , pl.
56. n° 2 & 10.
chargées dans leur milieu de feuilles inclinées ,
bordées en haut & en bas d'une cordelette , &
séparées par un sillon , à bouche presque ronde ,
& qu'on peut nommer *Vis feuilletées* ; deux *Vis*
feuilletées blanches , tachées & fasciées de fauve-
roux ; & une blanc de lait , très-rare , assez sem-
blable de forme aux précédentes , dont elle dif-
fere en ce qu'on apperçoit , au lieu de feuilles ,
des enfoncemens irréguliers qu'on croiroit faits
à coups de marteau , ce qui lui peut faire don-
ner le nom de *Martelée* *.

443. Quatorze Vis , dont dix par pendans ; * List. tab.
587. f. 53.
sçavoir , deux *Chenilles granuleuses* blanches ,
nuées & tachetées de brun-roux , & à stries cir-
culaires très-fines entre les stries granuleuses * ;
une marron obscur , de forme effilée , à révolu- * Séba , pl.
51. n° 26.
tions de spire , composées chacune de trois petits.

230 COQUILLES UNIVALVES

~~COQUILLES UNIVALVES~~
 X FAM. *Chenilles noires* ; une de même forme , mais à
 V 14. tubercules plus allongés ; une *Chenille bariolée* ;
 une *Chenille blanche* ; deux *Chenilles blanches*
réticulées ; deux *Is* , & deux grandes *Tigrées* ,
 des orbes desquelle. les interstices ont été enlevés
 pour mettre à jour la columelle & la rampe un
 peu concave qui tourne autour.

ONZIEME FAMILLE.

V O L U T E S.

Nous rangeons sous ce nom toutes

 les Coquilles dont les spires compri- XI. FAM.
VOLUTES. mées & roulées les unes sur les autres, se terminent d'un côté en une tête aplatie ou peu élevée, & forment de l'autre tantôt une pyramide plus ou moins conique, ce qui constitue le genre des *Cornets*, & tantôt une espèce de cylindre, ce qui constitue celui des *Rouleaux*. Toutes ont une bouche étroite & longue; mais, dans les *Rouleaux*, la lèvre intérieure est ou cachée en dedans comme celle des *Cornets*, cas où nous les appellerons simplement *Rouleaux*, ou cette lèvre se montre en dehors, & est alors garnie de dents avec une échancrure vers le bas, ce qui caractérise les *Rouleaux* proprement dits, appelés *Olives*. Nos trois genres de *Volutes* sont donc,

1°. Les Volutes coniques, ou Cornets.

2°. Les Volutes cylindriques, ou Rouleaux.

3°. Les Volutes échancrées, ou Olives.

GENRE PREMIER.

VOLUTES CONIQUES, OU CORNETS.

444. **U**N Cornet des Indes, très-rare, blanc nué de couleur de rose, à deux larges zones orangées, & à grand nombre de petites du fond, tachetées de rouge-brun, à stries fines, à tête élevée, & à pas un peu concaves, connu sous le nom d'*Amiral d'Orange*, & grand dans

* Arg. Ap- son espèce *.
pend. pl. 1.
terr. I.

445. Un autre *Amiral d'Orange*, de couleurs plus foncées, de forme plus oblongue, & pas moins concaves que le précédent.

Rumph. tab.
34. litt. A.
Séba, pl. 48.
n°. 7.

446. Un Cornet marbré de larmes blanches sur un fond rouge-brun, & à trois larges zones jaunes, dont une sur le haut du corps, l'autre en bas, & la troisième au milieu; celle-ci est divisée en deux par une bandelette de la mar-

brure du fond : on nomme cette Coquille l'Amiral *.

447. Un *Amiral* de même espèce que le précédent.

448. Un *Amiral* de même fond & marbrure, & à trois larges zones jaunes comme le précédent ; il en diffère seulement en ce que celle d'en haut est suivie d'une autre petite zone de même couleur, & que celle du milieu est chargée de deux bandelettes, dont une de la marbrure du fond, & l'autre formée de simples traits bruns, ce qui met cette Coquille dans l'espèce de celles qu'on nomme *Amiraux à deux bandes* *.

XI. FAM.

VOLUTES.

* Arg. pl. 11.

lett. N.

Séba, pl. 48.

n°. 5.

* Ibid. n°. 4.

449. Un *Cornet* de même fond & marbrure que les précédens, qui ne diffère de l'*Amiral* de l'article 446, qu'en ce que la zone du milieu n'y est point chargée d'une bandelette : on le nomme *Vice-Amiral* *.

* Arg. pl. 12.

lett. H.

450. Un *Vice-Amiral* de même espèce, mais à taches blanches plus grandes.

451. Un *Cornet des Indes*, rare, de même fond & marbrure que les précédens, mais différent en ce qu'on n'y remarque que la zone jaune du bas, & un léger vestige de celle du milieu, ce qui pourroit le faire nommer *Amiral masqué*.

451. bis. Un très-beau *Cornet des Indes*, rare, peu différent des précédens pour le fond & la marbrure, mais d'un volume beaucoup plus

234 COQUILLES UNIVALVES

**XI. FAM.
VOLUTES.**

* Arg. App.
pl. 1. lett. S.

fort, à clavicule élevée, & à une zone de trois petites bandelettes de points vers les deux tiers de sa hauteur, nommé l'*Amadis*, & grand dans cette espèce *.

* Séba, pl.
48. n°. 26.

452. Quatre Cornets; sçavoir, deux d'Amérique, blancs nués de couleur de rose, à flammes longitudinales aurore, interrompues dans le milieu par une zone irrégulière du fond, à stries circulaires, & à pas des orbes un peu concaves, nommés *Amiraux d'Angleterre* *; & deux des Indes, marron, marbrés de larmes blanches, sur-tout dans une zone près du milieu, à pas un peu concaves, & nommés *Vice-Amiraux de Rumphius* *.

* Rumph.
tab. 34. lit. F.
Arg. App. pl.
1. lett. L.

453. Quatre Cornets; sçavoir, un blanc de forme effilée, à stries circulaires peu prononcées, nommé le *Bout de chandelle*; un *Amiral d'Angleterre*, & deux *Vice-Amiraux de Rumphius*, un peu moins grands que les précédens.

* Arg. pl. 12.
lett. V.

Rumph. tab.
34. litt. G.

Séba, pl. 48.
n°. 1-3.

454. Un Cornet à robe ornée de zones inégales, jaune clair, blanches & couleur de chair, marquetées de taches brunes, nommé en Hollande *Volute de Guinée*, & en France l'*Aîle de Papillon*; il est des plus grands de cette espèce *.

Rumph. tab.
34. litt. G.

Séba, pl. 48.
n°. 1-3.

455. Une *Aîle de Papillon*, un peu moins grande & de couleurs un peu plus foncées.

456. Une autre, dont les zones mouchetées sont un peu moins larges.

457. *Idem*, à cela près que les zones en sont ~~plus multipliées.~~

XI. FAM.
VOLUTES.

458. Quatre jolis petits Cornets par pendans ; sçavoir, deux blancs, à deux zones formées d'un réseau canelle très-fin, l'une large, située au haut du corps, & l'autre étroite, placée un peu au-dessous du milieu * ; & deux *Aîles de Papillon*.

* Arg. pl. 12.
lett. P.
List. tab. 58.
f. 41.

459. Deux Cornets rares, à tête élevée, dont un marron clair, marbré vers le haut par bandes longitudinales peu régulières de blanc, & à une zone blanche ponctuée dans son milieu de même couleur que le fond, ce qui le peut faire ranger parmi les *Amiraux* ; & un marron marbré par flammes longitudinales étroites de blanc, à petites fascies circulaires, dont les cannelures sont piquetées de très-petits trous.

460. Quatre jolis Cornets par pendans ; sçavoir, deux peu communs, à tête élevée, à robe marron clair tirant sur le roux, marbrée de taches blanches nuées de bleu, & à deux zones de même couleur, chargées de traits en zig-zag du fond, espèce nommée par quelques-uns *faux Amiral de Guinée* ; & deux à pas des orbes un peu concaves, à clavicule élevée & aiguë, à robe fasciée de trois zones blanches, & de deux plus larges, intermédiaires, canelle, chargées les unes & les autres de bandes longitudi-

236 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM. VOLUTES. **nales** onnées pourpre foncé, & nommées *Flamboyantes* *.

* Arg. pl. 12.
lett. I.
Gualt. tab. 20.
lett. G.

461. Quatre autres des mêmes espèces; savoir, deux *faux Amiraux de Guinée*, à tête un peu moins élevée, & à taches plus blanches; & deux *Flamboyantes* à bandes longitudinales plus fines, & à zones moins larges que les précédentes.

462. Quatre autres des mêmes espèces; savoir, deux *faux Amiraux de Guinée*, dont un comme ceux de l'article 460, & un qui en diffère en ce que le bleu domine davantage dans la robe, qui est fasciée de deux larges zones marron clair, marbrées du fond, & d'une petite zone blanche intermédiaire, toutes ponctuée de marron dans les parties de la robe, qui ne sont point de cette couleur; & deux grandes *Flamboyantes*, à zones brunes plus larges à proportion que celles des précédentes.

* Séba, pl.
44. n°. 20 &
22.

463. Six Cornets des Indes par pendants, tous à tête élevée; savoir, deux peu communs; blancs marbrés de taches souci en forme de nuages, à cercles légèrement granuleux vers le bas, & à spirale de dix orbes tuberculeux*; deux de forme à peu près semblable, fasciés & tachetés de blanc, de verd de terrasse, & de rouge foncé, avec quelques cercles rougeâtres presque imperceptibles; & deux *Flamboyantes*

à zones brunes comme les précédentes, mais ~~mais~~
 dont les zones blanches, sur-tout celle du mi- XI. FAM.
 lieu, ont un ou deux rangs de points bruns VOLUTES.
 plus ou moins distans les uns des autres.

464. Quatre Cornets rares des Indes & à tête élevée; sçavoir, un blanc à grosses stries & profondes cannelures circulaires, chargées vers le haut de stries onduleuses très-fines, & à dix orbes, dont les pas sont un peu renflés, formant une seconde variété de l'espèce nommée *Bout de Chandelle*; deux blancs à deux zones jaunes interrompues, dont celle d'en haut beaucoup plus large, à un grand nombre de cercles granuleux, & à dix orbes tuberculeux, nommés *la Peau de chagrin* *; & un à zones alternatives * Arg. pl.
12. lett. R. inégales en largeur, les unes blanches, bariolées de rouge foncé & de bleu pâle, les autres vertes, chargées de quelques cercles légèrement granuleux.

465. Six Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, blancs nués de bleu, à trois rangs de petites taches longitudinales vertes ondées, ponctués par zones de marron clair, & à tête peu haute, mais dont s'élève une clavicule très-fine *; deux blancs, * Rumph.
tab. 32. litt. R.
Séba, pl. 43.
n°. 32. à deux zones fauve clair, à stries fines & larges cannelures circulaires, & à bas du corps violet; & deux *Flamboyantes*.

466. Six autres par pendans; sçavoir, deux

blancs à gros traits longitudinaux en zig-zag
 XI. FAM. orangés, le réunissant quelquefois, & formant
 VOLUTES. des espèces de caractères bizarres, à fillons cir-

* Lf. tab. culaire peu prononcés, & à coque très-mince.*;
 783. f. 30. deux de l'espèce des deux premiers de l'article
 Rumph. tab. précédent, mais un peu différens pour les cou-
 32. litt. S. leurs; & deux *Flamboyantes*, des zones de l'une
 desquelles la moitié de dessus est rouge-brun,
 & celle de dessous jaune.

467. Six autres par pendans; sçavoir, deux
 orangés, à deux zones, l'une de taches blan-
 ches dans le haut, l'autre toute blanche vers le
 bas, à quatre stries granuleuses au-dessus de
 cette dernière zone, & à pas des orbes un peu
 * Séba, pl. concaves * ; deux de l'espèce des premiers de
 42. n°. 40-42. l'article précédent; & deux *Flamboyantes* com-
 me la dernière du même article.


468. Deux Cornets des Indes, très-rare &
 en pendant, blancs, à deux zones de taches
 rouge-brun, celles d'en haut un peu déchir-
 quetées, & à grand nombre de petits points de
 même couleur, rangés circulairement sur tout
 le corps & sur la spirale.

469. Neuf petits Cornets; sçavoir, un blanc
 à deux larges zones orangé, & à trois bandes
 blanches, chargées chacune de deux rangs de
 points de la couleur du fond, mais dont celles
 du haut & du bas sont presque masquées, à pas
 des orbes un peu concaves, & qu'on peut ran-

ger parmi les *Amiraux*¹ ; deux verds de di-
 verses nuances, à stries longitudinales très-fines, XI. FAM.
 formant avec les transversales, qui sont mieux VOLUTES.
 prononcées, une espèce de rézeau, à tête ap- 1 Séba, pl.
 platie, à clavicule aiguë, & à dix orbes tuber- 14. n°. 11 &
 culeux; deux qui peuvent se rapporter aux deux 12.
 premiers de l'article 458, mais différens, le pre-
 mier, en ce que les mailles du rézeau des zones
 y sont plus grandes, le second, en ce que le ré-
 zeau s'y étend presque sur tout le corps; deux
 de l'espèce de ceux de l'article précédent; une
Aîle de Papillon, & un *Amiral d'Angleterre*.

470. Douze petits Cornets par pendans;
 sçavoir, deux à robe verd-de-terrasse & granu-
 leuse vers le bas, violets en dedans, à spirale
 de dix cordons tuberculeux, & nommés en
 Hollande *Fromages verds*; deux de même es-
 pèce, mais dépouillés, dont la moitié supérieure
 du corps est devenue violet couronné de blanc,
 & la moitié inférieure est restée verd de ter-
 rasse; deux blancs, marbrés par zones de taches
 quarré-long orangé vif, & nommés en Hol-
 lande *Nattes d'Italie*²; deux blancs à taches 2 Ibid. pl. 55.
 irrégulieres fouci, disposées par zones, & ponc- n°. 4-10.
 tués de même dans les intervalles; deux blancs
 à trois zones de taches larges un peu oblon-
 gues, violet foncé, à stries granuleuses dans le
 bas, & à spirale chargée de taches semblables,

240 COQUILLES UNIVALVES

 espèce nommée l'*Hébraïque* ¹; & deux blancs

XI. FAM. marquetés par zones de petites taches quatrées
VOLUTES. noirâtres ².

¹ Arg. pl. 12.

lett. G.

Gualt. tab. 25.

lett. T.

List. tab. 779.

f. 25.

² List. tab.

7, 4. f. 20.

471. Trois Cornets, dont deux d'Amérique en pendant, blancs, à un grand nombre de cercles ponctués de souci, & à deux zones de bandes longitudinales, larges & irrégulières, de même couleur, à pas des orbes un peu concavés, & tachés de même que le corps; & un *Fromage verd* dépouillé, marbré par larges bandes longitudinales de fauve & de gris nué de violet, à une zone partie blanche, partie violette, située dans le milieu du corps, & très-grand dans l'espèce.

472. Douze petits Cornets; sçavoir, cinq variétés d'*Hébraïque*, dont une comme celles de l'article 470; une qui en diffère par ses taches rouge-brun; une dont les taches du premier rang sont longues & ondées, & celles du second rang ne sont au contraire que de simples points fort distans les uns des autres; une couverte presque en entier de taches longitudinales ondées, violet-noir, & à cannelures circulaires; & une qui diffère de cette dernière, en ce que les taches en sont interrompues dans le haut & vers le milieu par deux petites zones blanches ³; un Cornet couleur de chair, à une zone blanche au-dessous du milieu, à stries circulaires,

³ Ibid. f. 26.

Gualt. tab. 25.

lett. Q.

culaires, à tête élevée & tuberculeuse; un blanc ~~bariolé de canelle foncé~~, à deux zones de même, & à pas des orbes un peu concaves; deux *Nattes d'Italie*, une très-jolie *Flamboyante* à zones jonquille, & deux comme les derniers de l'article 470.

XI. FAM.
VOLUTES.

473. Trois Cornets des Indes, peu communs; sçavoir, deux blancs à trois zones fauves peu prononcées dans l'un, à flammes longitudinales brunes, étroites & ondées, striés vers le bas & dans toute la spirale*; & un blanc couvert en entier de points orangés, gros & petits, disposés par zones nombreuses, à stries circulaires très-fines, à pas des orbes un peu concaves, & à clavicule élevée, espèce qu'on pourroit nommer *Cornet ponctué*.

* Guate. tab.
25. litt. S.

474. Un très-grand & beau Cornet des Indes, souci, tacheté par zones de points rouge-brun, à tête aplatie, formée d'orbes un peu bombés, & tachetés de lignes ondées de même couleur, à clavicule aiguë, & nommé *Pelotte* ou *Tine de beurre*.*

475. Deux *Tines de beurre*, moins grandes que la précédente, l'une paille à points plus distans & moins nombreux, & l'autre jonquille foncé à taches plus grandes.

* Séba, pl.
44. n°. 1-4.
Rumph. tab.
31. litt. C.

476. Deux Cornets des Indes en pendant; l'un fauve clair, rayé transversalement, & fort ferré de brun; à tête aplatie & clavicule aiguë,

242 COQUILLES UNIVALVES

~~nommé~~ nommé *Minime* *, & grand dans cette espèce;

XI. FAM. & une *Tine de beurre* de moyenne grandeur,
VOLUTES.

* Arg. pl. jaune pâle, & rare en ce que les cercles de
12. lett. A. points y sont fort près les uns des autres.

Rumph. tab.

31. lett. V.

Séba, pl. 54.

n°. 3 & 4.

477. Deux grands Cornets des Indes, peu communs, l'un aurore, l'autre marron clair, tous deux cerclés de raies fines plus foncées, semblables à celles du *Minime*, ornés vers le bas d'une zone blanc-sale, assez large, & d'une autre plus étroite dans le haut *.

* Ibid. n°. 1

& 2.

Valentyn. uni-

val. n°. 34.

478. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux blancs à zones formées de grandes & petites taches irrégulières, d'espèces de caractères, de lignes interrompues & de points rouge-brun, nommés *Spéctres*, & grands dans leur espèce *; & deux *Minimes*.

4 Arg. pl.

12. lett. C.

Séba, pl. 44.

n°. 14 & 25.

Gualt. tab. 21.

lett. D.


479. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux rares bleuâtres, à grand nombre de zones formées de lignes interrompues ou traits rouge-brun qui se répondent mutuellement en longueur, & à une zone blanche dans l'un, qui ne paroît point dans l'autre, à tête applanie, tachetée d'amaranthe, & qu'on nomme *Minimes*

* Séba, pl. bleus *; & deux *Spéctres* moins grands que ceux

54. n°. 5.

de l'article précédent, & de dessein un peu différent.

480. Quatre Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc nué de couleur de chair & de bleu pâle, à

grandes taches verd foncé, étendues sur la robe  en forme de nuages, dans deux zones interrompues; & un verd foncé, à une zone de taches blanches nuées de bleu, & quelques autres taches semblables vers le haut, tous deux à tête aplatie, couronnée de tubercules, à clavicule élevée, & à quelques stries circulaires granuleuses peu prononcées *; & deux *Spéctres* à zones de points plus nombreuses que dans les précédens.

XI. FAM.
VOLUTES.

* Séba, pl.
44. n°. 16.


481. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux de l'espèce des deux premiers de l'article 471, mais dont un n'est composé presque en entier que de cercles ponctués de rouge-brun; & deux *Tines de beurre* de moyenne grandeur.

482. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux blancs nués & veinés d'orangé, en forme de filamens un peu onduleux, & à deux larges zones brunes, dont la plus basse termine la Coquille, à tête peu élevée, & à révolutions de spire comme collées l'une contre l'autre, espèce nommée le *faux Amiral* ou *Navel* *; & deux qui ne diffèrent des deux premiers de l'article 471, qu'en ce que leurs taches & leurs points sont de couleur brune.

* Arg. pl. 12.
lett. L.
Séba pl. 44.
n°. 24 & 25.

483. Un Cornet des Indes de cinq pouces quatre lignes de long, blanc, à deux larges zones jonquilles, interrompues du fond, & cerclé dans les intervalles de traits, de taches &

244 COQUILLES UNIVALVES

 de points plus ou moins gros de même couleur, à tête aplatie, & nommé la *Spéculation* *.

VOLUTES.

* Séba, pl.
45. n°. 9.
Gualt. tab. 22.
lit. B.

484. Quatre Cornets par pendans ; sçavoir, deux *Navets*, différens de ceux de l'article 482, en ce que les deux premières révolutions de spires, au lieu de se trouver dans le plan des suivantes, s'en retirent en spirale, particularité qu'on remarque rarement dans les Volutes ; & deux *Spéculations* de moyenne grandeur.

* Séba, pl.
44. n°. 8-11.
Gualt. tab. 21.
lit. E.

485. Trois Cornets des Indes ; sçavoir, deux en pendant, jaune-roux, marqués vers le haut, à la tête, & dans une zone du milieu, de taches blanches, à tête peu élevée, à pas des orbes un peu concaves, striés circulairement, & à pointe brune un peu recourbée, nommés *Aumusses* * ; & une grande *Spéculation*, remarquable en ce que certains de ses cercles, sur-tout ceux d'en haut, paroissent formés d'une suite de caractères, parmi lesquels on distingue des A, des X & des Y très-bien formés.

486. Deux très-beaux Cornets des Indes, blancs, cerclés de plusieurs rangs de points, de traits & de taches rouge-brun, imitant des caractères, fasciés dans les intervalles de cordons jonquille pâle, dont quelques-uns sont aussi ponctués de rouge-brun, nommés *fausses Ailes de Papillon*, & des plus grands de cette es-

* Arg. pl.
32. lett. Q.
Séba, pl. 44.
n°. 5.

487. Cinq Cornets de moyenne grandeur ;

ſçavoir, une *fauffe Aîle de papillon*, deux *Spé-*
culations, un *Naver*, & une *Tine de beurre*. XI. FAM.
VOLUTES.

488. Deux grands Cornets des Indes en
 pendant, blancs, à taches violet foncé, de for-
 me à peu près quarré-long, distribuées par zô-
 nes, à tête plate, & nommés *Damiers* *. * Séba, pl.
44, n°. 1.
Gual. tab. 21.
litt. O.

489. Quatre grands Cornets; ſçavoir, deux
Damiers en pendant, une *Aumuffe*, & un *Na-*
vet.

490. Quatre autres par pendans; ſçavoir,
 deux *Damiers* ornés chacun de trois zones jau-
 nes, ſur lesquelles les taches noires ne s'éten-
 dent pas moins que ſur le fond, & nommés
 pour cette raiſon *Damiers à bandes*; & deux
Aumuffes qui diffèrent dans leur marbrure des
 précédentes *.

491. Quatre Cornets des Indes par pendans;
 ſçavoir, deux noirs parſemés de grandes taches
 blanches, à peu près triangulaires, à tête ap-
 platie, à paſ des orbes concaves & légèrement
 tuberculeux, eſpèce nommée *Tigre noir* *; &
 deux *Damiers à bandes jaunes*, nués de cou-
 leur de chair. * Séba, pl.
45, n°. 16 & 17.
* Gual. tab.
22. litt. D.
Séba, pl. 46.
n°. 3 & 4

492. Quatre autres comme les précédens,
 à cela près que les bandes de l'un des *Damiers*
 ſont jonquille tendre.

493. Deux très-grands *Tigres noirs* en pen-
 dant, dont quelques-unes des taches blanches

246 COQUILLES UNIVALVES

**XI. FAM.
VOLUTES.**

se réunissent en longueur, ce qui les fait paroître ondées & dentelées.

494. Un très-beau Tigre, dont le fond est jaune-orangé, & qu'on nomme par cette raison *Tigre jaune* *.

* Arg. pl. 12.
let. M.
Séba, pl. 46.
n°. 3 & 4.

495. Six Cornets de moyenne grandeur, pendants; sçavoir, deux *Damiers à bandes jaunes*, deux *Tigres noirs*, rares en ce que les taches y sont moins fréquentes, sur-tout vers le haut *, & deux *Spéculations*.

* Ibid. n°. 9 & 10.

496. Dix Cornets de moyenne grandeur, pendants; sçavoir, deux *Tigres* d'un roux-noir, rares en ce que les taches blanches ne paroissent que dans deux zônes, ce qui les a fait

* Ibid. n°. 5 & 6.

* Arg. pl. 12. nommer *Amirales* par quelques Hollandois *; un *Tigre* à fond roux, appelé *Tigre rouge* *; un *Tigre jaune*; deux *Damiers à bandes jaunes*; deux *Tines de beurre*, & deux *Nattes d'Italie*.

lett O.

497. Six Cornets par pendants, sçavoir, deux *Damiers à bandes jaunes*; un *Tigre noir*, remarquable par une petite bandelette jaune, située vers le haut, & interrompue par les taches; un *Tigre rouge* & deux *Aumusses*.

498. Deux Cornets d'Amboine, rares, même dans le pays, blancs, couverts dans tout le corps d'un dessein de traits recourbés jonquilles, laissant entr'eux des taches du fond en forme d'écailles, & à tête aplatie, chargée de taches

* Séba, pl. 43.
n°. 13 & 14.

quarrées de même couleur que les traits *.

499. Deux grands & beaux Cornets blancs à pointe violette, à tête peu élevée, où les révolutions des spires ne sont marquées que par des traits, espèce nommée en Hollande la *Mennonite*, & en France l'*Onix*, le *Cigne* ou le *Cierge blanc* *.

XI. FAM.
VOLUTES.

* Seba, pl.

500. Deux *Cierges blancs* en pendant, un peu moins grands que les précédens.

47. n°. 9.

Rumph. tab.

31. litt. E.

List. tab. 754.

fig. 2.

501. Deux grands Cornets en pendant, blancs, cerclés dans toute leur longueur de lignes interrompues, & de points noirs, quelquefois verts ou fauves, chargés de plus de deux larges fascies vertes & fauves, à tête aplatie & couronnée de crenelures qui vont en diminuant jusqu'au sommet, ce qui leur a fait donner le nom de *Couronnes impériales* *.

* Arg. pl. 12.

lett. F.

Seba, pl. 47.

n°. 18-20.

Rumph. tab.

34. litt. M.

502. Deux *Couronnes impériales* en pendant, un peu moins grandes que les précédentes, & un peu différentes en nuances de couleurs.

503. Deux autres moins grandes.

504. Deux *Couronnes impériales* de moyenne grandeur, rares, & qui ont cela de particulier que leurs zones, verd de terrasse foncé, sont comme déchiquetées; cerclées de lignes rougeâtres, & que les intervalles des déchiquetures sont ponctués de rouge-brun *.

* Ibid. lit. I.

505. Six Cornets, dont quatre par pendans; sçavoir, un *Cierge* ventre de biche clair, nommé le *Cierge jaune*; une *Couronne impériale*;

 deux *Damiers à bandes*, & deux *Tigres noirs*.

XI. FAM.
VOLUTES.

506. Un très-gros Cornet, rare, blanc, bariolé de petites lignes fauves, se joignant de diverses manières en forme de fils de toile d'araignée, à deux zones de taches marron foncé, à tête peu élevée & chargée de petits tubercules, nommé en Hollande la *Toile d'Araignée*, & en

* Arg. App. France l'*Esplandian* *.
pl. 1. lett T.

507. Un semblable qui peut servir de pendant au précédent.

508. Un autre un peu moins grand.

509. Deux autres en pendant.

510. Deux *Esplandians* différens des précédens, en ce que le rézeau en est moins serré & brun-clair, & qu'ils offrent jusqu'à trois zones brun-foncé.

511. Huit Cornets de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux verd-jaunâtre, à deux zones blanches, l'une en haut, l'autre un peu au-dessous du milieu, bordées l'une & l'autre de taches noires oblongues & un peu obliques, mais qui, dans celle d'en haut, s'étendent sur tous les orbes de la tête, qui est plate, & dont le fond est blanc aussi, espèce nommée

* Séba, pl. 42. n° 31 & 35. *Queue d'hermine* *; deux semblable à ceux-ci, à cela près que les taches des zones y sont plus nombreuses & moins régulières, que le fond en est de plus chargé, dans les intervalles des zô-

nes, de cercles ponctués bruns, & que la forme en est plus renflée, variété nommée simplement *Hermine**; deux *Tigres rouges*, & deux *Damiers à bandes*.

XI. FAM.
VOLUTES.

* Gualt. tab.
22. litt. M.

Séba, pl. 426
n°. 30.

List. tab. 780.
f. 27.

§ 12. Dix autres par pendants; sçavoir, deux orangés, à quelques taches blanches dans le haut, à une zone de même au-dessous du milieu, plus prononcée dans l'un, & moins dans l'autre, à stries granuleuses dans le bas, & à tête peu élevée, marbrée du fond & de blanc*; deux *Hermes*, deux *Minimes*, deux *Damiers à bandes* & deux *Tigres noirs*; plus un Cornet coupé en deux transversalement, pour faire voir les révolutions intérieures des spires.

* Séba, pl.
426 n°. 41 &
42.

§ 13. Dix autres Cornets, dont huit par pendants; sçavoir, une *Couronne impériale*, un *Cierge jaune*, deux *Damiers à bandes*, deux *Hermes*, deux *Tigres noirs* & deux *Flamboyantes*.

§ 14. Treize Cornets des Indes; sçavoir, un paille à stries circulaires très-fines, orangé faible, à une zone blanche peu prononcée, & à clavicule élevée, nommé la *Fileuse**; deux blancs marbrés par grandes taches longitudinales irrégulières marron, à tête peu élevée, & légèrement striés vers le bas*; un violet à deux zones blanches, l'une en haut, l'autre au milieu, à tête aplatie & clavicule peu élevée*; un jaune clair à une zone blanche dans le mi-

* Gualt. tab.
20. litt. B.

* Rumph.
tab. 32. litt. Q.

* Séba, pl.
426 n°. 39.

250 COQUILLES UNIVALVES.

XI. FAM.
VOLUTES.

lieu, & à tête plate; un jaune foncé, à trois zones blanches, l'une large en haut, l'autre très-fine un peu plus bas, & la troisième au-dessous du milieu, à tête plate & blanche, tachetée de marron; un de l'espèce des deux derniers de l'article 470; un comme les deux premiers de l'article 466; un comme ceux de l'article 468, un *faux Amiral de Guinée*; une *Flamboyante*, & deux *Hermes*.

515. Vingt-six petits Cornets; savoir, deux verd de terrasse, marbrés par taches longitudinales interrompues de blanc, à pas des orbes * s'ba, pl. tuberculeux, & nommés *Papiers marbrés* *; 44. n°. 39 deux blancs à petites cannelures circulaires & à tête peu élevée; deux citron, & deux souci, à tête plate & clavicule peu élevée; un marron teint de bleu, à deux zones étroites blanches; un gris nué de bleu, à deux zones blanches & à tête plate; & les seize autres des variétés déjà décrites, entr'autres, un *Vice-Amiral de Rumphius*, un *Tigre jaune*, une *Queue d'hermine*, une *Hermine*, deux *Navets* & deux *Nattes d'Italie*; plus un petit Cornet coupé en deux pour en faire voir l'intérieur.

516. Quarante petits Cornets fort jolis, des espèces déjà décrites, très-variés dans le dessin, la forme & les couleurs.



GENRE SECOND.

VOLUTES CYLINDRIQUES, OU ROULEAUX.

517. **D**eux très-grands Rouleaux des Indes, blancs, à raies longitudinales en zig-zag, brunes & rouge-sanguin, se joignant fréquemment les unes aux autres, & laissant entr'elles quantité de petits vuides du fond en forme d'écailles ou de cœurs, & chargés de plus de trois larges zônes jonquille, ce qui les a fait nommer *Drap d'or fascié* *.

XI. FAM.
VOLUTES.

518. Un très-grand & beau *Drap d'or fascié*, & un de même espèce, dépouillé, devenu par-là du plus beau blanc.

* Arg. pl. 13.
lett. I.
Séba, pl. 47.
n^o. 14 & 15.
Rumph. tab.
32. litt. P.

519. Deux *Draps d'or fasciés*, moins grands que les précédens, mais qui ne leur cèdent en rien pour la beauté.

520. Deux Rouleaux qui ne diffèrent des précédens qu'en ce que les taches jonquilles n'y sont point jettées tout-à-fait par zônes, & qu'on nomme par cette raison simplement *Draps d'or* *.

521. Trois beaux *Draps d'or*, dont un rare, différent des précédens, en ce que le fond en est bleu, que les zig-zags y sont nombreux,

* Arg. pl. 13.
lett. F.
Séba, pl. 47.
n^o. 16 & 17.

251 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM. VOLUTES. très-ferrés & d'un beau rouge-sanguin, variété qu'on nomme *Drap d'or à fond bleu*; & deux, dont un à bandes; de forme plus renflée & plus courte, mais d'ailleurs semblables à ceux des

* Séba, pl. 43. n°. 11. & 12. articles précédens *.

522. Six *Drap d'or* par pendants, formant trois autres variétés; savoir, deux à fond bleu, mais moins chargés de cette couleur que les précédens, & à trois zones mieux prononcées; deux *Drap d'or* ordinaires, à rézeau moins ferré, & à taches blanches, plus grandes que dans ceux de l'article 520; & deux de forme très-allongée, dont le rézeau fort ferré ne laisse paroître en certains endroits que de très-petits

* Ibid. pl. points blancs *.

47. n°. 13.
Rumph. tab.
72. litt. O.

523. Trois grands *Drap d'or*, dont deux à peu près semblables à ceux de l'article 530; & un de la dernière variété décrite dans l'article précédent, mais à rézeau moins ferré.

524. Un grand & rare Rouleau fond blanc, à rézeau jaune foncé, & à grandes taches de même couleur, répandues principalement en deux zones, de forme un peu renflée par le haut,

* Ibid. tab. 53. n°. 4. & nommé *Drap d'or de la Chine* *.

525. Un grand Rouleau de la Chine, peu commun, fond jonquille marbré de taches blanches, à stries fines circulaires, de forme oblon-

* Arg. pl. 13. lett. D. Séba, pl. 43. n°. 4 & 5. gue & effilée, à tête un peu élevée, & nommé *Drap orange* *.

526. Deux *Drap*s orangés en pendant, à fond moins vif, à taches plus fréquentes, & à tête moins élevée que le précédent *.

XI. FAM.

VOLUTES.

* Séba, pl.

43. n°. 1 & 2.

527. Six Rouleaux par pendans, peu communs; sçavoir, deux blancs à stries circulaires chargées à distances égales de points rouge foncé qui se répondent aussi en longueur, à taches longitudinales orangé brun, & de forme effilée, espèce nommée *Drap d'or piqué de la Chine* *; deux *Drap*s orangé à taches blanches, petites & peu nombreuses, & à grand nombre de bandes longitudinales étroites orangées sur un fond jonquille; & deux *Drap*s d'or à fond bleu.

* Mt. tab.

741. fig. 35.

528. Deux rares & jolis Rouleaux en pendant, fond blanc nué de bleu, marbrés l'un par taches longitudinales onnées, l'autre par taches disposées en deux zones de verd foncé nué de marron, & cerclés de plus de fines zones & de points rouges-bruns, à tête élevée, & nommés *Tulipes* *.

* Arg. pl.

13. lett. B.

Séba, pl. 48.

n°. 39 & 40.

529. Deux Rouleaux; sçavoir, un rare, fond gris de lin, teint de blanc & de bleu, marbré par trois larges zones & par bandes longitudinales de fauve roux nué de verd, & cerclé comme les précédens *; & un fond blanc, parsemé d'assemblages de petites taches noires, plus serrées dans deux espèces de zones, espèce

* Ibid. n°.

36.

254 COQUILLES UNIVALVES.

~~nommée~~ nommée *Piqûre de mouches*, ou *Drap d'ar-*

XI. FAM. *gené* *.

VOLUTES.

* Arg. pl.

13. lett. E.

Gualt. tab. 25.

lett. O.

530. Huit jolis Rouleaux par pendans ; sçavoir, deux blancs bariolés de taches aurore, & à deux zones de même couleur, nommés

* Arg. pl.

13. lett. H.

Omelette * ; deux blancs un peu tachés de bleu, à grandes taches longitudinales verd foncé, interrompues par une zone blanche peu prononcée dans l'un, tous deux cerclés, sur-tout vers le bas, de traits & de points bruns, à tête assez élevée, terminée par une clavicule couleur de chair, espèce nommée la *Nébuleuse* ou les *Nua-*

* Séba, pl.

44. n°. 29 &

30.

ges * ; deux *Tulipes* & deux *Drap d'argent*.

531. Six Rouleaux peu communs ; sçavoir, deux rouge-sanguin, nué de rouge plus clair & de gris de lin, légèrement marbrés, l'un principalement dans une zone du bas, l'autre par bandes longitudinales ondées & en zig-zag de

* Ibid. pl.

43. n°. 34.

* Ibid. n°.

35.

blanc * ; deux blancs nués de bleu & de gris de diverses nuances * ; & deux, dont un brun nué de gris de lin, & un bariolé des mêmes couleurs, tous de l'espèce nommée *Papier de la Chine*.

532. Un très-grand Rouleau des Indes, marron, à suites ou traînées longitudinales, transversales & obliques, de taches blanches, en

* Arg. pl. 13.

lett. G.

Séba, pl. 47.

n°. 10.

Rump. tab.

33. n°. 3.

forme d'écailles, laissant entr'elles de grands espaces du fond, espèce nommée *Brunette* *.

533. Deux grandes *Brunettes* en pendant,

dont une peu commune à fond canelle & à taches plus larges, l'autre fond rouge-brun, à taches plus nombreuses.

XI. FAM.
VOLUTIS.

534. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, deux *Brunettes* de forme plus effilée * ; & deux *Draps d'or*.

* Séba, pl.
47. n°. 11 &
12.

535. Trois Rouleaux; sçavoir, deux en pendant, blancs nués de couleur de chair, à grandes taches en forme de nuages, formées d'un assemblage de raies brunes ou bleu foncé, à tête peu élevée, dont les orbes sont concaves & marbrés comme le corps, nommés l'*Ecorchée* *, & très-grands dans leur espèce : & une *Brunette*.

* Arg. pl.
13. lett. C.
Séba, pl. 47.
n°. 22 & 23.
Rumph. tab.
31. litt. F.

536. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, deux *Ecorchées* un peu moins grandes que les précédentes, & deux *Brunettes*.

537. Six Rouleaux par pendans; sçavoir, deux *Ecorchées* différentes des précédentes, en ce que l'une n'a qu'un petit nombre de taches brunes, en forme de flammes longitudinales distribuées en deux zones, & que la seconde est bariolée de taches noirâtres, déchiquetées en forme de lambeaux, à deux zones près, où elles sont plus larges; deux *Draps d'or* & deux *Draps d'argent*.

538. Deux grands Rouleaux de l'Isle de France, en pendant, gris de lin nué de couleur de chair, à bandes longitudinales de taches

256: COQUILLES UNIVALVES

rouge - brun, en forme de rézeau, & à deux
XI. FAM. zônes de grandes taches de même couleur, à
VOLUTES. tête aplatie, à pas des orbes tuberculeux, &
à coque mince, espèce nommée le *Brocard de*

* Arg. pl. *soie* *.

12. lett. A.

Séba, pl. 42.

n°. 1-3.

List. tab. 747.

fig. 41.

539. Quatre Rouleaux par pendans, dont
deux *Brocards de soie* & deux *Ecorchées*.

540. Quatorze Rouleaux par pendans; sça-
voir deux blancs, pointillés sur-tout dans deux
zônes, & par bandes longitudinales ondées de
points bruns, à côtes longitudinales peu pro-
noncées, à pas des orbes tuberculeux, & nom-

* Arg. pl. 12.
lett. S.

Séba, pl. 55.

n°. 1.

Gualt. tab. 25.

lett. P.

més *Moires* * ; quatre autres, dont deux mar-
brés de blanc & de fousi, & deux de mar-
ron & de violet, tous les quatre ceints du haut
jusqu'en bas de traits & de points bruns, variété

* Séba, pl.
42. n°. 16 &
17.

nommée le *Taffetas* * ; deux *Nuages*, deux
Ecorchées, & quatre *Draps d'or*, dont deux
fasciés, & deux de la variété des derniers de
l'article 522.

541. Seize autres, dont quatorze par pen-
dants; sçavoir, deux petits verd foncé, ceints
de traits alternativement bruns & blancs, & à
une petite zone blanche vers le bas; deux pe-
tites *Brunettes* rares, en ce que les traînées de
taches blanches y serpentent dans quatre ban-
des longitudinales régulières; un *Drap d'or* jon-
quille, marbré dans trois bandes longitudinales
& trois zones de blanc teint de gris de lin, &

veiné

veiné du fond ; trois autres *Draps d'or*, dont ~~un à fond bleu~~, & deux de la variété de l'arti-
 cle 520 ; deux *Taffetas* de la première des deux
 variétés de l'article 540 ; deux *Draps d'or pi-*
quetés de la Chine, deux *Nuages* & deux *Moirs*.

X. FAM.
 VOLUTES.

GENRE TROISIEME.

VOLUTES ÉCHANCRÉES, OU OLIVES.

542. **D**EUX Olives des plus rares, en pen-
 dant, blanches, ponctuées de gris, semées çà
 & là de traits transversaux brun-foncé, la plû-
 part en zig-zag, à plis longitudinaux peu pro-
 noncés, à carne circulaire peu saillante vers le
 tiers de la hauteur, à petite tête, dont les spires
 sont creusées en gouttière, à lèvre extérieure
 aplatie en dehors, & intérieure couleur de
 chair. Cette Coquille ne se trouve pas même
 dans les Cabinets de Hollande.

543. Trois Olives des Indes ; sçavoir, une
 couleur de chair, à bandes longitudinales on-
 dées, & un peu en zig-zag, orangé-ombré de
 bleu pâle, & à tête élevée * ; une verd céladon,
 ornée dans toute sa robe de chevrons couchés
 violet noir, imitant le point d'Hongrie, à petite
 tête, dont les premières révolutions renrent

* Arg. pl,
 13. lett. O.

 l'une dans l'autre, & nommée en Hollande *Drap*

X. FAM. *mortuaire*¹; & une verd de terrasse, semée de VOLUTES.

¹ Rumph. quelques zig-zags violet-noir, & à tête ap-
tab. 39. n^o. 4. platie².

² List. tab.

737. f. 29.

Séba, pl. 53.

lett. a.

544. Deux grandes Olives de la mer du Sud, couleur de chair nué de bleu, couvertes d'un grand nombre de traits orangé-brun, qui, descendant d'abord de la tête en forme de chevelure, se prolongent ensuite dans tout le corps en divers zig-zags plus ou moins grands & serrés, laissant des intervalles triangulaires du fond à peu près comme dans les *Draps d'or*, à tête peu élevée & à pas des orbes creusés en fillon, espèce nommée *Porphyre* ou *Olive de Pana-*

³ Arg. pl. 13. *ma*³.

lett. K.

Gual. tab. 24.

lett. P.

545. Deux *Olives de Panama*, un peu moins grandes que les précédentes.

546. Quatre Olives par pendans; sçavoir, deux grandes jaune pâle, marbrées de traits longitudinaux en zig-zag bruns, & à trois fascies de taches de même couleur, à tête élevée, à pas des orbes creusés d'un profond fillon, & légèrement dentelés, & à bouche aurore vif⁴;

⁴ Arg. pl. 13.

Séba, pl. 53.

lett. A. B.

Gual. tab. 24.

lett. O.

deux *Olives de Panama* de moyenne grandeur.

547. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux comme les premières de l'article précédent, & deux qui en diffèrent par leur marbrure

⁵ Séba, pl.

3. l. lett. C. D.

Rumph. tab.

9, n^o. 3.

plus brune, & leur bouche blanche⁵.

548. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux

blanches, teintes par traits longitudinaux & en zig-zag de ventre de biche, à une zone blanche oblique vers le bas, & à une petite fascie au-dessous, qui se termine à l'échancrure de la bouche, de forme renflée, ainsi que le haut de la lèvre intérieure, & à tête blanche peu élevée; deux de même espèce, mais dépouillées, & dont la robe est devenue par-là marron foncé, bariolée de blanc; mais la zone, la fascie & la tête sont restées blanches *; deux ventre de biche clair, ornées d'un dessin en réseau violet pâle, plus foncé dans deux espèces de zones, & deux de la variété des dernières de l'article précédent.

XI. FAM.
VOLUTES.

* Arg. pl. 13.
lett. M.
List. pl. 723.
fig. 10.

549. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux très-brunes, appelées *Moresques* ou *Négresses* *; deux jaune-souci, dont une tirant un peu sur le verdâtre *; deux blanches, & deux dépouillées, de la variété des premières de l'article précédent.

* Séba, pl.
33. lett. L.
* Ibid. lett. K.

550. Seize Olives par pendans; sçavoir, deux peu communes, teintes de gris & de verd de pavot dans les deux tiers de leur hauteur, & noisette dans le reste, de forme effilée, & à tête très-élevée *; deux blanches tachetées de fauve & de lilas, à tête peu élevée, & à carne circulaire peu saillante vers le tiers de leur hauteur *; deux verd d'olive, marbrées l'une par taches en zig-zag peu nombreuses, l'autre par

* List. tab.
722. fig. 9.
Séba, pl. 53.
lett. P. Q.

* Gualt. tab.
23. lett. L.
Séba, pl. 53.
lett. W.

XI. FAM. VOLUTES. *** Séba, pl. 53. lett. M.** zones interrompues de brun obscur, à quelques côtes longitudinales peu prononcées & à tête aplatie * ; deux blanches marbrées par traits obliques & en zig-zag de cannelle & à tête élevée * ; deux nuées de verd céladon & de jonquille, marbrées de violet, & du reste semblables aux précédentes * ; deux de l'espèce des premières de l'article 548, dont une dépouillée, deux *Négresses* & deux olivâtres.

*** Gualt. tab. 83. lett. PP.**

551. Onze Olives peu communes : sçavoir, deux blanches à bandes longitudinales en zig-zag cannelle ; une de même couleur, mais à simples traits en zig-zag cannelle foncé ; une blanche presque entièrement recouverte de grands traits longitudinaux, verdâtres, nués de jaune, à tête élevée, à pas des orbes plats, & à une strie oblique en vive arrête dans le bas ; une verd céladon clair, à espèce de flammes transversales lilas & noisette ; une gris de lin à trois zones vertes, dans les intervalles desquelles est un dessin en treillis de même couleur * ; une gris verdâtre, & une verd de terrasse, tachées dans deux zones de violet noir ; une *Négresse*, & deux grandes de la variété des dernières de l'article 547.

*** Séba, pl. 53. lett. V.**

552. Dix Olives des Indes, d'une belle grandeur & d'un très-beau choix.

553. Trente-six petites Olives par pendans ; sçavoir, deux jonquilles ponctuées par compar-

timens de brun , & à bouche violette * ; deux à-
 peu-près semblables , mais de couleur plus fon-
 cée , de forme plus oblongue , & à points distri-
 bués moins régulièrement * ; deux de forme
 bombée , blanches , semées de petites taches peu
 apparentes gris de lin , à deux zones brunes dans
 l'une , cannelle dans l'autre ; deux de forme à-
 peu-près semblable , blanc-verdâtre , à traits en
 zig-zag , & grandes taches longitudinales brun
 obscur * ; deux blanches ornées de traits en zig-
 zag violet foncé , & à bouche rouge-brun ;
 deux blanches bariolées de traits , le plus sou-
 vent en zig-zag gris de lin ; deux blanches nuées
 de ventre de biche , terminées par une large
 zone orangée ; deux couleur de chair pâle , ba-
 riolées de traits fauves en forme de chevrons ;
 deux , dont une blanche & une verte , fasciées
 de brun obscur ; deux bariolées de gris & de verd
 foncé , à deux larges zones brunes , & lèvre in-
 térieure orangée * ; deux blanches nuées de ci-
 tron , marbrées dans trois zones interrompues
 de verd de pavot ; deux grises nuées de jaune
 pâle , chamarées de traits en zig-zag verds , imi-
 tant le point d'Hongrie ; deux *Négresses* ; deux
 gris de souris ; deux blanches ; deux blanches
 ponctuées de bleuâtre , à une large zone de mê-
 me couleur dans le haut ; deux comme les neu-
 vième & dixième de l'article 550 : & deux blan-
 ches marbrées de cannelle clair , & du reste

XI. FAM.

VOLUTES.

¹ Gualt. tab.²³ litt. T.² List. tab.

72 L. & 7.

³ Ibid. tab.

735. & 25.

⁴ Séba , pl. 53.
lett. O.

262 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM.
VOLUTES.

semblables aux troisieme & quatrieme de l'article 548.

554. Trente-neuf petites Volutes échancrées: sçavoir, une blanc de lait, à tête élevée formée de six orbes en doucine granuleux, teints d'orangé; une blanche de forme bombée, à stries circulaires, & à six orbes reticulés & granuleux; une blanche tachée par zônes & par bandes longitudinales de fauve-roux, de forme moins bombée, mais du reste semblable à la précédente *; une petite de même espèce, mais de forme très-effilée; une peu commune blanche, ceinte de diverses zônes de très-petits points verts se répondant exactement en longueur d'une zone à l'autre, à lèvre extérieure en bourrelet, & jaune d'or, ainsi que le haut de l'intérieure, qui est armée de très-grosses dents, à tête se confondant avec le corps, & à petite clavicule jaune *; quatre autres de forme à-peu près semblable à la précédente, dont deux blanches fasciées de petites zônes orangé *, & deux ponctuées par compartimens de même couleur *; deux blanches marbrées de brun de diverses nuances, à trois grosses fascies circulaires, & à six côtes longitudinales, tuberculeuses dans les points où elles se croisent *; & vingt-huit *Olives* par pendans d'un joli choix.

* Gualt. tab.
32. litt. O.

* List. tab.
803. fig. 11.

* Ibid. f. 9.
Gualt. tab. 28.
litt. B.

* List. tab.
803. f. 10.
Gualt. tab. 28.
litt. D.

* List. tab.
791. f. 44.
Gualt. tab. 22.
litt. I.

DOUZIEME FAMILLE.

P O R C E L A I N E S.

CE sont des Coquilles de forme ovoïde aplatie en-dessous, ne montrant que peu ou point de spirales. Leur bouche oblongue est plus ou moins étroite, & nous servira à les diviser en deux genres; sçavoir,

XII. FAM.
PORCELAINES.

1°. Les Porcelaines à bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'à l'une des deux lèvres.

2°. Les Porcelaines à bouche plus étroite, en forme de fente, dentée des deux côtés.



G E N R E P R E M I E R.

PORCELAINES A BOUCHE MOINS ÉTROITE, DÉPOURVUE DE DENTS, OU N'EN AYANT QU'À L'UNE DES DEUX LÈVRES.

555. **U**N E Porcelaine des Indes, très-rare, blanche, à lèvre extérieure en bourrelet, & dont les extrémités se prolongent en deux longues avances c'euées en gouttiere, nommée *Navette de Tisserand*, & grande dans cette es-

* Arg. pl. pièce *.

18. lett. I.
List. tab. 711.

f. 63.
Séba, pl. 55.
n° 14.

556. Deux Porcelaines en pendant, papyracées, blanches tant en dessus qu'en dedans, & dont les extrémités ne se prolongent que peu en dehors : dans l'une, la lèvre extérieure se recourbe un peu en dedans, tandis que celle de l'autre, qui paroît être du premier âge, finit en tranchant : toutes deux rares & grandes dans leur espèce, nommée l'*Œuf papyracé*.

557. Deux Porcelaines en pendant, plus grosses que les précédentes, dont elles diffèrent d'ailleurs en ce que la coque en est plus épaisse, la lèvre extérieure renflée & dentée en forme de rides, & le dedans orangé : variété que l'on

* Arg. pl. 18.
lett. A.

List. tab. 711.
f. 65.

Enalc. tab. 15.
list. A.

nomme simplement l'*Œuf*.*

558. Sept Porcelaines peu communes : sça-

voir , une petite papyracée blanche nuée d'incarnat , formant une seconde variété de *Navette* plus effilée que la précédente * ; deux blanches , à un pli en forme de bosse vers le milieu du corps , à extrémité des lèvres couleur de rose , au-dessus desquelles sont deux boutons ou verrues , & à lèvre extérieure garnie de dents , espèce nommée *la Bossue* * ; deux blanches nuées d'aurore , à un anneau très-saillant sur le milieu du corps , & à bouche dépourvue de dents , autre variété de *Bossues* , nommée *Bossue sans dents* , & deux *Œufs papyracés* des deux variétés de l'article 556.

XII. FAM.
PORCELAINES.

* List. tab. 711. fig. 66.

* Arg. pl. 18. lett. M.
List. tab. 712. f. 67.
Séba , pl. 55. n°. 17.

* Arg. pl. 18. lett. Q.
List. tab. 711. f. 64.

Séba , pl. 55. n°. 18.

559. Trois Porcelaines peu communes : savoir , deux marron , marbrées principalement dans quatre zones & vers la tête de taches blanches , à lèvre extérieure en bourrelet , & garnie de dents , à petite bosse sur le dos , à coque mince , & à petite clavicule * ; & un *œuf* de la variété de l'article 557.

* List. tab. 675. f. 23.

560. Onze Porcelaines , dont dix par pendans : savoir , une grise nuée de bleu , mouchetée par zones de grandes taches brunes & rousses de diverses nuances , à lèvre extérieure tranchante , à coque mince , & à clavicule aplatie ; deux de forme plus oblongue & moins bombée , tachetées de fauve & de roux , & du reste semblables à la précédente * ; deux fauves de forme encore plus al-

* Ibid. tab. 748. f. 42 & 43.


266 COQUILLES UNIVALVES

XII. FAM. PORCELAINES. longée, & fasciées, l'une d'orangé, l'autre de verdâtre; deux bariolées de gris & de brun, à deux fascies gris de lin, à bouche violette, & à clavicule un peu élevée: c'est le *Potan* de M.

* List. tab. Adanson *; deux petites brunes de même espèce; deux mouchetées de canelle, de la variété des premières de cet article *. Plus, un

* List. tab. grand nombre de petites Porcelaines blanches, 741. f. 37. Adans. Hist. du Sén. pl. 5. n°. 1. enfilées en façon de collier, toutes de la variété

* Adanson, que M. Adanson a nommée le *Falier* *, connue 749. f. 44. aussi sous le nom de *Monnoie de Guinée*; & deux petites de même espèce, attachées ensemble, dont une a la bouche à gauche, & l'autre à droite, & forment ainsi l'*Unique* & la *Contre-unique* de cette espèce. Toutes les Porcelaines de cet article peuvent être rangées dans le genre que M. Adanson a nommé le *Manieter*.



GENRE SECOND.

*PORCELAINES A BOUCHE PLUS ÉTROITE,
EN FORME DE FENTE, DENTÉE DES
DEUX CÔTÉS.*

561. **D** E U X Porcelaines fauve pâle, ornées de traits longitudinaux, fins, ferrés & hachés, canelle, interrompus dans le milieu par une bande longitudinale onnée, d'où partent de côté & d'autre de petits rameaux, à taches rondes plus ou moins grandes vers le bas, & nommées *Cartes Géographiques* ou *Mappe-mondes* *; toutes deux grandes dans cette espèce.

XII. FAM.
PORCELA-
INES.

* Arg. pl. 38.
lett. B.
Rumph. tab.
38. litt. B.

562. Quatre Porcelaines par pendants : savoir, deux à coque mince, blanche nuée de gris de lin, à taches nombreuses brunes & rousses, à deux espèces de fascies, & à petite tête aplatie *; & deux *Géographiques* moins grandes que les précédentes.


* List. tab.
672. f. 18.

563. Deux très-grandes Porcelaines couleur de chair pâle nuée de bleu, à taches rondes brunes & noires, à une bande longitudinale étroite & onnée tirant sur le jaune, à coque épaisse, & nommées *Peaux de Tigre* *.

* Ibid. tab.
682. fig. 29.
Rumph. tab.
38. lit. A.

564. Quatre grandes *Peaux de Tigre*, dont

268 COQUILLES UNIVALVES

XII. FAM. PORCELAINES.  deux blanches , à taches plus petites & moins nombreuses : une à fond blanc teint d'orangé , & la dernière remarquable par une large tache rouge-brun sur le dos.

565. Quatre autres par pendans , dont deux à taches petites & nombreuses , & deux de la variété de celles de l'article 563.

566. Six Porcelaines par pendans : sçavoir , deux *Peaux de Tigre* , à large bande longitudinale blanche sur le milieu du dos ; deux des variétés déjà décrites ; & deux de l'espèce des deux premières de l'article 562.

567. Dix Porcelaines : sçavoir , deux fauve-brun parsemées de taches blanches , à deux fascies peu prononcées , & nommées *Neigeuses* * ; deux brun foncé parsemées dans le milieu du corps de taches rondes à-peu-près égales , grises , & blanc sale , interrompues par une petite bande longitudinale de même couleur , à coque épaisse , & à base plate , espèce nommée par Rumphius *Porcelaine à tête de serpent* * ; une autre variété de cette espèce , recouverte en entier de taches , à coque mince , & à base plate du côté de la lèvre extérieure , mais arrondie de l'autre ; deux fauves , marbrées de marron , à extrémités des lèvres fort saillantes & applaties , s'enfonçant vers le bas dans l'intérieur de la Coquille , nommée *le Lapin* ; un autre *Lapin* gris-bleuâtre & à coque mince ; & deux *Peaux de Tigre*.

* List. tab. 676. f. 23.

* Ibid. tab. 703. f. 52.
Rumph. tab. 88. litt. E.

* List. tab. 687. f. 34.

568. Seize Porcelaines par pendans : sçavoir, deux peu communes fauve nué d'orangé, à tête aplatie & enfoncée, à lèvre extérieure un peu saillante vers le haut, à dos élevé, & à deux fascies presque imperceptibles * ; deux marron clair & foncé, à deux zones blanchâtres bien prononcées, à lèvre extérieure tranchante dans l'une, recourbée & dentée dans l'autre * ; deux à large base, bariolées sur les flancs de blanc & de fauve clair, ayant sur le milieu du corps une large bande longitudinale blanche, tachetée dans toute sa longueur de brun-noir, espèce nommée *le Léopard* * ; deux à bouche, base & bords du corps noir, à dos blanc teint de bleu pâle, à une bande longitudinale fauve dans le milieu, & nommées *Agates* * ; deux blanches, teintes en quelques endroits de bleu pâle & de fauve-roux, à taches brunes peu nombreuses sur les côtés, & à cannelures des deux lèvres aurore, espèce nommée *Truitée* * ; deux fauves nuées de noisette, à trois larges zones plus claires que le fond, & à petite tête aplatie ; deux *Neigeuses*, & deux *Porcelaines à tête de serpent*.

XII. FAM. PORCELAINES.

* List. tab. 670. f. 16.
Gualt. tab. 16.
Litt. I.


* List. tab. 667. f. 11.

* Rumph. tab. 39. lit. S.

* Arg. pl. 184
lett. E.

* List. tab. 683. f. 30.

569. Deux grandes Porcelaines de forme oblongue, marbrées par grandes taches de blanc & de brun, & dont la robe est en plusieurs endroits comme saupoudrée de blanc : on remarque sur le dos de l'une, quelques taches blanches & relevées, semblables à des gouttes de

 suif figées : toutes deux sont de l'espèce nom-
 XII. FAM. mée *Lièvre* ¹, mais la seconde est appelée *Liè-*
 PORCELAINE *vre à gouttes de suif*.

RES.

¹ Rumph.
 tab. 38. litt. C.

* Arg. pl.
 18. litt. D.
 Rumph.
 tab. 38. litt.
 D.

¹ List. tab.
 659. f. 46.

570. Trois grandes Porcelaines, dont deux
 fauves nuées dans deux zones & sur les côtés
 de petit gris, chargées de cercles grands & pe-
 tits, canelle vif, & à deux grandes taches brunes
 sur chacune des lèvres, espèce qu'on nomme le
Grand Argus * ; & une olivâtre chargée dans
 toute l'étendue de sa robe de taches rondes &
 blanches, ou de taches brunes cerclées de blanc,
 & dans son milieu, d'une bande longitudinale
 plus claire que le fond, espèce nommée *faux*

Argus *

571. *Idem*.

572. Trois Porcelaines, dont deux *Argus* de
 couleurs très-vives ; & un *faux Argus* dé-
 pouillé, devenu par-là violet obscur.

573. Quatre Porcelaines, dont une rare,
 blanche nuée par intervalles de fauve ou de
 gris-bleu, ornée dans toute sa robe de traits
 fouci, qui laissent un grand nombre de taches
 rondes ou polygones du fond, ferrées les unes
 contre les autres, & à bande longitudinale de
 même couleur, espèce que l'on nomme *Arle-*
 quine * ; deux qui ne diffèrent de celle-ci, qu'en
 ce que les traits qui sont entre les taches, y sont
 rouge-brun, jettés comme par hachures, la
 plupart longitudinales, que les taches y sont

* List. tab.
 659. fig. 51.

trois régulières, moins serrées, & séparées par des hachures de même couleur que les taches, variété nommée *fausse Arlequine*, & qui est très-bien représentée dans l'appendice de M. d'Argenville *; toutes très-grandes dans leur espèce; & une *fausse Arlequine* différente des précédentes par son dos en forme de bosse.

XII. FAM.
PORCELAINES.

* Arg. Append. pl. 2. lett. B.
Rumph. tab. 38. litt. M.

574. Dix Porcelaines par pendants: sçavoir, deux gris de lin, à quatre larges zones gris-brun, interrompues en forme de taches quadrées, & nommées *la Taupe* *; deux *Taupes* d'une autre variété, à robe fauve-roux, fasciée de trois zones blanchâtres, & à base brun-noir*; deux aurore foible, à trois zones gris-blanc, & à bouche lilas, nommées *Caffé au lait*, & grandes dans leur espèce *: deux *faux Argus*, dont un de la variété de l'article 570, l'autre en diffère en ce qu'on n'y voit point de taches brunes cerclées de blanc, mais de simples taches blanches; & deux *fausses Arlequines*.

* Arg. pl. 18. lett. H.
Gualt. tab. 16. litt. O.

* Gualt. ibid. litt. M.
Rumph. tab. 38. litt. I.
* Gualt. tab. 13. lett. H.

575. *Idem.*

576. Dix Porcelaines par pendants: sçavoir, deux grises tirant sur le fauve, à deux zones gris plus clair; & à deux taches rouge-brun en forme d'yeux à chaque extrémité, espèce nommée *la Souris* *; deux, dont une gris de lin, & l'autre fauve, chargées de traits longitudinaux & hachés violet foncé, à extrémités des

* Arg. pl. 18. lett. C.
Lift. tab. 671. f. 17.

~~lèvres~~ **XII. FAM. PORCELAINES.** lèvres couleur d'or, & nommées l'*Isabelle*¹; deux jaunes tirant sur le verd parsemées de taches blanches, rondes & à-peu-près égales en-

¹ Arg. pl. 18. tr'elles, nommées le *Petit Argus*²; deux marbrées principalement par zones & par chevrons couchés imitant le point d'Hongrie, de noisette

² Arg. pl. 18. & de blanc bleuâtre, à coque mince, & à clavicule un peu élevée³; une *Arlequine*, &

³ Arg. ibid. une *fausse Arlequine*.

⁴ Arg. ibid. 577. Les mêmes Coquilles, avec cette différence que l'une des deux *Souris* est gris-brun & sans zones.

⁵ Arg. ibid. 578. Trente petites Porcelaines par pendans: sçavoir, deux rares, canelle, parsemées de petites taches rondes blanches, au centre de quelques unes desquelles se trouvent de très-petits points noirs, & à bande longitudinale verd céladon⁴; deux blanches, parsemées dans les flancs de points violets, bariolées dans le dos de jaune pâle, à bande longitudinale du fond, & à bouche orangée⁵; deux marron nué de bleu pâle, à cinq zones de chevrons blancs couchés en forme de point d'Hongrie⁶;

⁶ Arg. pl. 18. deux fouci tachetées principalement sur le dos de petits points blancs, & à base jonquille;

⁷ Gualt. tab. deux qui ne diffèrent de celles-ci qu'en ce que le fond de la robe & les côtés en sont rouge-brun, & que les points blancs laissent des pe-

⁸ Rumph. tab. 39. litt. B, tites taches du fond en forme d'étoiles⁸; deux petites

petites *Porcelaines à tête de serpent*, formant la troisieme variété de cette espèce, ; deux verd de pavot bariolées de gris, sur le milieu du dos desquelles est une large tache irréguliere jaune foncé, représentant, suivant M. d'Argenville, la figure d'un animal ²; deux blanches, à trois larges zônes brunes, nommées le *petit Ane* ³; & quatorze *Pucelages* ou *Coliques*, formant sept variétés: sçavoir, deux blanc de lait parfaitement lisses ⁴; deux blanches, ceintes dans le milieu du corps d'un petit cordon jonquille ⁵; deux semblables, à cela près que le cordon en est plus large & d'un beau violet; deux, dont le dos est devenu entièrement violet par le dépouillement, & dont le bas de la robe est resté blanc ⁶; deux blanches, bossues sur les flancs, nommées plus particulièrement *Thorax* ou *Kauris des Maldives* ⁷; deux *Kauris*, l'un jonquille, & l'autre soufre; & deux dépouillés, à flancs & extrémités blanches, & dos d'un beau lilas.

579. Quinze Porcelaines: sçavoir, une qui diffère du *Léopard*, décrit article 568, par une bande longitudinale plus étroite, presque entièrement brune, & par une large tache de même couleur, placée entre deux petites bossés, variété que quelques-uns nomment le *Crapaud*; une blanche parsemée d'un grand nombre de taches & de points fauve-roux, à deux zônes

XII. FAM.
PORCELAINES.

¹ Rumph. tab. 38. litt. F. List. tab. 701. f. 50.

² Arg. pl. 18. lett. Y.

Rumph. tab. 39. litt. E.

³ Arg. pl. 18. lett. T.

Rumph. tab. 39. litt. M.

⁴ Ibid. litt.

⁵ Gualt. tab. 14. n°. 2.

⁶ Bonan. c. 3. f. 241.

⁷ Arg. pl. 18. lett. K.

Gualt. tab. 14. n°. 3 & 4.

List. tab. 709. f. 59.

274 COQUILLES UNIVALVES

du fond tachées de même , & à coque mince* ;

**XII. FAM. une comme les septieme & huitieme de l'arti-
PORCELAI- cle 576 ; une *peau de Tigre* ; deux *Porcelaines*
NES.**

*** Gualt. tab. à tête de serpent , de la premiere variété de l'ar-
16. litt. R. ticle 567 ; un *Lapin* ; deux *Taupes* des deux va-
riétés de l'article 574 ; un *Caffé au lait* ; une
Neigeuse ; deux *fausses Arlequines* ; deux de la
même espèce , dépouillées & devenues par-là
d'un très-beau violet. Plus, deux *Porcelaines*
coupées , l'une dans sa longueur , l'autre trans-
versalement pour mettre à découvert les spirales
intérieures.**

**580. Huit grandes Porcelaines : sçavoir , un
faux Argus de la grande espèce , différent de
* List. tab. tous les précédens* ; deux *Porcelaines à tête de*
697. fig. 44. *serpent* ; deux *Peaux de tigre* ; & trois Porce-
laines dépouillées , dont une violette & deux
blanches. Plus , un *faux Argus* coupé transver-
salement pour en faire voir la spirale.**

**581. Trente-cinq petites Porcelaines très-
intéressantes , dont trente-quatre par pendants :
sçavoir , deux marron nué de jaune , à deux
zônes plus claires que le fond , à petites taches
de même peu prononcées , à base & côtés oran-
gés* ; deux rares blanches , à grandes taches
* Gualt. tab. jaune foncé tenant les unes aux autres , & dis-
83. litt. P. posées sur la robe en façon de parterre ; deux
papyracées , blanches ponctuées principale-
ment dans quatre zônes de jaune foncé* ; deux
* Ibid. tab.
16. litt. P.**

grises ponctuées de noir , & à deux zones plus claires que le fond * ; deux de forme bombée , dont une roux foncé , à deux zones blanc sale , & une fauve-roux , à deux taches brunes à chaque extrémité ; deux verdâtres ponctuées de gris , à lèvre extérieure renflée & tuberculeuse , & à base blanche tachetée de violet * ; deux de forme à-peu - près semblable , grises ponctuées de jaune , & à deux fascies plus claires , nommées *Peau d'âne* * ; deux de forme bombée à extrémités des lèvres , un peu saillantes en dehors , dont une blanche * , & une fauve ponctuée de rouge * ; deux bleues , mouchetées de marron , à flancs blancs tachetés de brun , à quatre petits yeux placés comme dans la *Souris* , & de forme semblable à celle du *Petit-âne* * ; deux blanches , mouchetées de canelle , & à coque mince * ; deux de l'espèce des treizieme & quatorzieme de l'article 578 ; deux *Truitées* ; deux *Petit-âne* ; deux très-petites grises , à trois rangs de taches brunes , à stries circulaires , & à sillon longitudinal dans le milieu du dos , nommées le *Pou de mer* * ; deux *Poux de mer* blancs nus de couleur de chair , à stries circulaires comme les précédens , mais sans sillon longitudinal * ; une rare , fauve tirant sur le gris , à dos très-élevé , à stries circulaires fort saillantes , nouvelles le long du sillon longitudinal qui est fort large , ainsi que les intervalles des stries , & à

XII. FAM.
PORCELAINES.

* List. tab.
660. f. 4.

* Gualt. tab.
15. litt. X.

* I . litt.
A. bid

* Ibid. tab.
14. litt. M.

* Ibid. litt. N.

* Rumph.
tab. 39. litt. O.

* List. tab.
684. f. 31.

* Arg. pl. 18.
lett. L.

List. tab. 706.

f. 56.

* List. tab.

707. f. 57.

base plate, dont les bords sont renflés en es-

XII. FAM. Porcealai- pièce de bourrelet, nommée la *Tortue* * ; deux blanches, à stries circulaires granuleuses obli-

NES. * *List. tab.* ques, & se croisant l'une l'autre, à fillon lon-
706. f. 55.
Bonan. cl. 3. gitudinal, vers le milieu du dos, & à extrémités
f. 250. des lèvres saillantes, nommée par M. d'Argen-

* *Arg. pl. 18.*
lett. V.
Gualt. tab. 14.
lett. S.

ville, *Petite vérole* * ; & deux gris de lin de la


* *Arg. pl. 18.*
lett. S.
Gualt. tab. 14.
lett. T.

forme des précédentes, mais plus petites, gra-
nuleuses sans stries, & jaunes dans les deux
bouts. C'est le *Cloporte* du même Auteur *.





COQUILLES DE MER.



CLASSE SECONDE.

BIVALVES.

ON range dans cette classe toutes les Coquilles composées de deux pièces à peu près égales, nommées *Valves* ou BIVALVES *Battans*, & où l'on ne remarque aucun repli sensible qu'on puisse regarder comme des spires. Nous les diviserons en six familles, qui sont,

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1°. Les Huitres. | 4°. Les Cœurs. |
| 2°. Les Peignes. | 5°. Les Tellines. |
| 3°. Les Cames. | 6°. Les Moules. |



PREMIERE FAMILLE.

HUITRES.

I. FAM.
HUITRES.

CES Coquilles sont caractérisées par l'excès plus ou moins grand de l'une de leurs valves sur l'autre , & par la propriété générale & constante de s'attacher entr'elles ou à d'autres corps. Toutes celles que nous connoissons peuvent se rapporter à l'un des quatre genres suivans ; sçavoir ,

1°. Celles dont les valves sont composées de plusieurs couches ou lames, formant une surface quelquefois lisse & le plus souvent raboteuse : ce sont les *Huitres proprement dites*.

2°. Celles qui sont couvertes de feuilles relevées , plissées , comme frisées & finissant en festons , nommées par cette raison *Huitres feuilletées*.

3°. Celles qui sont chargées de stries longitudinales , hérissées d'épines gran-

des & petites, & dont le sommet de la valve inférieure est applati, prolongé en dehors, & plus ou moins recourbé, nommées *Huitres épineuses*, *Spondiles*, ou *Huitres à talon*.

I. FAM.
HUITRES.

4°. Celles enfin dont le sommet de la valve inférieure est percé d'un petit trou, & recourbé en forme de bec sur celui de la valve supérieure, nommées généralement *Anomies* ou *Térébratules*.



GENRE PREMIER.

HUITRES PROPREMENT DITES.

I. FAM. HUITRES. 582. **U**NE Huitre des Indes, rare, brune nuée de blanc & de verdâtre, nacrée tant en dedans qu'en dehors, de forme presque ronde; à larges sinuosités & plis dans son contour, à stries longitudinales très-fines, à valves se colant presque l'une sur l'autre; & à charnière composée de deux élévations étroites, qui forment un angle aigu dans le haut de la valve supérieure, & se logent dans deux cavités semblables de l'inférieure, espèce nommée *Selle Polonoise*, & portant plus de cinq pouces de dia-

* Séba, la metre *.

grande Coq.
du milieu de
la pl. 90.

Gualt. tab.
104. litt. B.

583. Deux Huitres de moyenne grandeur: sçavoir, une *Selle Polonoise*, presque entièrement plate & papyracée, & une variété de cette espèce, blanche, à angle de la charnière plus aigu, & de forme encore plus ronde que les précédentes, nommée en Hollande *Transparente*, & en France *Vitre Chinoise*, parce qu'effectivement les Chinois & les Indiens s'en servent pour cet usage.

* Séba, la
Coquille du
milieu du bas
de la pl. 90.

List. tab. 225
& 226. f. 60.
& 61.

584. Trois Huitres: sçavoir, une petite *Selle*

Polonoise, & deux *Vitres Chinoises*, dont une grande. Plus, deux carreaux de ces Vitres, taillés par les Indiens.

I. FAM.
HUITRES.

585. Deux Huitres de la Méditerranée, à valves nacrées, transparentes, un peu raboteuses, dont la supérieure est blanche, percée près du sommet d'un grand trou ovale, & l'inférieure blanche sur les bords, mais partie jaune clair, partie rougeâtre vers le sommet, à charnière formée d'une petite patte ovale située au-dessus du trou de la valve supérieure, & correspondant à une cavité de même forme de la valve inférieure, nommées *Pelures d'oignon* *, & très-grandes dans cette espèce. Plus, un très-joli groupe de quatorze *Pelures d'oignon*, jaunes nuées de lilas, & de moyenne grandeur, adhérentes à un *Burgau* dans lequel est logé *Bernard l'hermite*.

* Arg. pl. 12.
lett. C.
Bonan. cl. 2.
fig. 56.
List. tab. 204
f. 32.

586. Vingt & une *Pelures d'oignon* de différentes grandeurs, & très-intéressantes : sçavoir, deux verd d'eau, plus rares que les précédentes, en ce qu'on y remarque des côtes & cannelures partant, non de la tête, mais du côté gauche de la circonférence : ces côtes & ces cannelures sont accidentelles, & dues à celles des *Peignes*, sur lesquels ces Coquilles se trouvent souvent adhérentes ; quatre grandes de la variété des premières de l'article précédent ; huit de même espèce, mais de formes très-va-

282 COQUILLES BIVALVES

I. FAM.
HUITRES.

riées , dont quatre blanches , trois lilas , & une jonquille ; un groupe de cinq autres , lilas clair , adhérentes à un *Burgau* dépouillé ; une très-grande , couverte de vermiculaires , & une qui diffère de toutes les précédentes , en ce que la fenêtre en a été bouchée par l'animal.

587. Une très-grande Huitre des Indes , blanche en dessus , d'une très-belle nacre en dedans , de forme aplatie , à bords supérieurs des deux valves dépourvus de charnière , mais seulement un peu caves sur-tout vers le milieu pour recevoir le ligament , dont la partie qui reste , a été coupée transversalement , & chatoie comme la plume de paon. Cette Coquille est de l'espèce qui fournit les plus belles perles , ce qui l'a fait nommer *Mere-Perle* *.

* List. tab.
221. f. 56, &
tab. 222.
Gualt. tab. 84.
litt. F.

588. Une très-belle Huitre des Indes , un peu moins grande que la précédente , à robe écailleuse verd foncé , à bandes longitudinales blanches partant du sommet en forme de rayons , d'une très-belle nacre en dedans , blanche , excepté vers la circonférence où elle est jaunâtre , & sur les bords qui sont d'un verd tirant sur le noir. Cette Coquille , qui du reste est semblable à la précédente , est nommée par Klein *Mere-Perle stérile* , & connue en France sous celui de *Pintade* : celle-ci est très-grande dans son espèce *.

* Arg. pl. 20.
lett. A.
List. tab. 223
F. 57. & 224.
f. 58.
Gualt. tab. 84.
litt. G.

589. Deux *Pintades* , dont une dépouillée.
590. *Idem*.

591. Trois *Pintades* : sçavoir , deux d'Amé-
rique , différentes des précédentes en ce que les
écailles de leur robe sont un peu saillantes , en
forme de petites feuilles pointues très-ferrées ;
& une des Indes , de couleurs très-vives , dont
le sommet est verd d'émeraude.

I. FAM.
HUITRES.

592. Six Huitres : sçavoir , une *Pintade* des
Indes , différente des précédentes en ce qu'elle
est de forme plus étroite & en demi - croissant ;
une d'Amérique , rougeâtre , teinte de blanc
vers la tête ; un groupe de trois petites *Pinta-*
des d'Amérique , sur une espèce d'*Alcyonium* ;
& deux valves de petites *Meres - Perles* , au
dedans de chacune desquelles adhère une Perle
ronde d'un bel orient , & d'une belle grosseur.

593. Deux belles Huitres des Indes , à valves
très-inégales entr'elles , à charniere montrant
dans la valve inférieure une petite dent , avec un
long sillon , & dans la supérieure une cavité qui
reçoit la dent , & un petit filet qui engraine
dans la rainure de l'autre valve , nommées l'*Hi-*
rondelle ou l'*Oiseau* , à cause de leur forme ,
qui , lorsque la Coquille est ouverte , imite assez
la tête , les aîles & la queue d'un oiseau : l'une
est violet-noir en dessus , à aîles assez grandes ,
& à queue médiocrement longue * ; l'autre est
caneille très-finement rayée de marron foncé ,
à queue très-longue , à petites aîles & très-pe-

* Arg. pl. 19.
lett. B.
Gualt. tab 94.
lett. A.
Litt. tab. 210.
fig. 55.

I. FAM.

HUITRES.

* Rumph. tab.

44. litt. G.

tite tête * ; toutes deux d'une très-belle nacre en dedans.

594. Quatre *Hirondelles* : sçavoir , deux d'Amérique , semblables à la premiere de l'article précédent , à cela près que la nacre de l'une est d'un éclat un peu moindre , & que celle de l'autre est dorée : cette derniere est chargée de vermiculaires ; une de Malthe , grise en dessus , blanche & nacrée en dedans , à queue courte , à tête presque de même grandeur , & à très-grandes aîles un peu arquées ; & une petite des Indes , qui diffère de la derniere de l'article précédent , en ce que la queue en est moins longue , la tête plus large , & le corps plus petit.

595. Une Huitre des Indes , rare , blanche nuée d'incarnat , à stries longitudinales fines & granuleuses , à coque mince , à valve inférieure arquée des deux côtés , & échancrée près de la tête , à charniere formée d'un très - petit filet de la valve inférieure , qui s'enchasse dans une légère rainure de la supérieure , & d'une enaille longitudinale dans la tête aplatie des deux valves , laquelle est destinée à recevoir le ligament. ●

596. Une Huitre des Indes , rare , blanche nuée de fauve , à deux faces , l'une triangulaire , l'autre en demi-cœur allongé , presque planes , & à équerre dans la valve supérieure , con-

vexes dans l'inférieure , contournées l'une sur l'autre , de maniere à se joindre , quoique peu exactement , à stries longitudinales partant du sommet , & à charniere formée d'un grand nombre de petites hachures ou entailles , régnant dans presque toute l'étendue du sommet de chaque valve * : c'est l'*Ostreum tortuosum* , nommé en Hollande le *Devidoir* , & en France la *Bistournée*.

I. FAM.

HUITRES.

* Arg. pl.

19. lett. I.

Rumph. tab.

47. litt. R.

Gualt. tab. 95.

lit. B.

597. Quatre petites Huitres oblongues blanches teintes de rouge pâle , à stries longitudinales onduleuses peu prononcées , à coque mince un peu arquée , à une échancrure plus ou moins marquée au côté gauche de la tête , & à charniere composée d'une rangée de quatre à cinq dents ou entailles qui régnerent dans toute la largeur du sommet applati de chaque valve ; trois de forme plus ronde & plus plate , à charniere où l'on compte jusqu'à huit dents ; un groupe de vingt autres de cette dernière espèce , liées ensemble par une espèce de *Byssus* ; & deux des Indes , dont une revêtue de son épiderme , l'autre polie , toutes deux violettes , & à charniere comme les précédentes , mais composée de dix dents dans l'une * , & de quatorze dans l'autre : en tout vingt-neuf huitres nacrées , dont vingt-sept d'Amérique.

* Liff. tab.

227. f. 62.

598. Une Huitre des Indes , rare , violet-noir en dessus , nacrée en dedans , & où l'on

I. FAM.
HUITRE.

voit même des Perles , à deux branches à-peu-
près d'équerre l'une sur l'autre , dont une
étroite , courte & finissant en pointe , l'autre
large , longue & arrondie à son extrémité , ar-
quée dans son milieu , à charniere comme les
précédentes , mais comprenant jusqu'à vingt-
quatre dents , espèce nommée en Hollande
l'*Equerre* , & en France la *Cuisse* : celle-ci porte
plus de sept pouces de long *.

* Rumph.
tab. 47. lit. I.
Gual. tab. 97.
lit. A.

Séba , pl. 91.
n°. 6 & 7.

Valent. biv.
fig. 3.

599. Deux *Cuisses* , dont une de l'espèce de
la précédente , mais moins grande , & une plus
rare en ce qu'elle n'a qu'une seule branche ,
blanche vers le haut , violet foncé dans le reste ,
& à charniere composée de douze dents.

600. Une grande Huitre des Indes , rare , &
d'une belle conservation , violet-noir en dehors ,
plombée , brillante & nacrée en dedans , de la
forme d'un T un peu plié & contourné , à char-
niere formée dans le milieu de la valve infé-
rieure , d'une large dent triangulaire aplatie ,
chargée elle-même d'autres très-fines , corres-
pondantes à de petites cavités de même forme
dans la valve opposée , & à profonde échan-
crure dans les deux valves , destinée à recevoir

* Arg. pl. 19.
lett. A.

Gual. tab.
96. lit. D.

Séba , pl. 93.
n°. 1.

le ligament , espèce nommée le *Marteau* *.
601. Un *Marteau* moins grand que le précé-
dent , & d'ailleurs un peu fruste.

602. Un beau groupe de trois Huitres des
Indes , rares , à robe marron clair granuleuse

& comme chagrinée, de forme presque ronde, à larges plis disposés de manière que les angles saillans d'une valve s'enclavent exactement dans les angles rentrans de l'autre, à charniere formée d'un simple pli à peine visible, parallele au sommet de l'une des valves, & s'adaptant avec le ligament dans un léger enfoncement de l'autre valve, espèce nommée *Crête de coq* ou *Oreille de cochon* *.

I. FAM.
HUITRES.

603. Un autre groupe de trois *Crêtes de coq* semblables aux précédentes, à la couleur près qui en est violette de diverses nuances.

* Arg. pl. 20.
lett. D.
Rumph. tab.
47. litt. D.

604. Deux Huitres des Indes : sçavoir, une marron, de forme oblongue, à valve supérieure chargée dans son milieu d'une forte côte longitudinale, plus saillante que large, à valve inférieure divisée par un fillon de même largeur que la côte opposée, & par où la Coquille adhéroit à quelque branche, à larges plis & cannelures obliques naissant de la côte & du fillon, & s'adaptant exactement d'une valve à l'autre, à charniere comme dans la *Crête de coq*, espèce nommée la *Feuille* *; & une *Crête de coq* lilas clair, à plis d'une de ses valves chargés de longues pointes applaties *.

* Arg. pl.
19. lett. D.

* Gualt. tab.
104. litt. G.

605. Deux *Feuilles*, dont une rose seche, de forme moins oblongue, à côtes & fillon plus larges que dans la précédente *, & une violette de forme très-allongée, adhérente, ainsi

* Arg. pl.
19. lett. F.
Rumph. tab.
47. litt. A.

I. FAM.
HUITRES.

que plusieurs valves d'Huitres de la même espèce, à une petite branche d'arbre.

606. Un groupe de deux Huitres des Indes, très-rares, & adhérentes l'une à l'autre, grises, de forme oblongue, à tête en pointe & ressemblante à un petit bec, à valves supérieure & inférieure, chargées comme celles de la *Feuille*, d'une côte & d'un fillon, à plis réciproques d'une valve à l'autre, semblables à ceux de la *Crête de coq*, mais beaucoup plus nombreux, & naissans, non de la tête, mais de la côte & du fillon; variété que M. d'Argenville dans sa *Conchiliologie* * a jugé être non-seulement l'analogue marin du *Rastellum* (ou *Rateau*) fossile, mais l'unique qui eût été trouvée jusqu'alors.

* Arg. Conch.
pag. 126.

607. Une grande & belle Huitre des Indes; rare, marron sale, de forme ronde, à grands plis réciproques d'une valve à l'autre comme ceux de la *Crête de coq*, dont elle ne diffère qu'en ce qu'elle est de forme plus bombée, & que les valves en sont composées de divers feuillets placés l'un sur l'autre, qui dans le tranchant des plis, s'allongent en forme d'épines

* Arg. App. tuiées *.

pl. 4. lett F.
Rumph. tab.
47. litt. C.
Gualt. tab.
103.

608. Un groupe de trois Huitres des Indes, & rares, grises nuées de verd de diverses nuances, à valve supérieure aplatie, raboteuse par ondes vers la tête, feuilletée vers le bas, & inférieure

inférieure fort profonde, se terminant en pointe recourbée en dessous vers le sommet, & garnie de grosses côtes longitudinales tuilées, de couleur blanche en dedans, excepté vers les bords qui sont violet - noir, & plissés comme dans la *Crête de coq*, mais moins fortement, à charniere formée de stries nombreuses très-fines, & d'un ligament s'étendant dans toute la largeur du sommet de l'une & l'autre valve, espèce nommée *Corne d'abondance*.


I. FAM.
HUITRES.

609. Une grande *Corne d'abondance*, à prolongement de la tête hors de la valve inférieure, se portant plus loin que dans les précédentes.

610. Un groupe de trois Huitres des Indes, fauve-blanc & rose sèche, oblongues, à coque formée de divers rangs de feuilletures papyracées, à valve inférieure en forme de cuiller très-profonde, & supérieure convexe en dedans, à charniere comme dans la *Crête de coq*, & une *Corne d'abondance*.

611. Neuf Huitres des Indes : sçavoir, deux couleur de rose teint de lilas vif, de forme demi-circulaire, à valve supérieure plate, & inférieure un peu coufbée à équerre vers ses bords, toutes deux à côtes qui finissent en plis réciproques comme dans la *Crête de coq*, dont elles ont aussi la charniere, & de l'espèce nommée *Corbeille** ; une grise en dessus, rose sale en dessous, de forme oblongue arquée vers les deux extré-

* Gualr, tab.
104. litt. D.

 mités, une blanc sale veiné de marron, de forme un peu triangulaire, & à grosses côtes longitudinales finissant en plis réciproques d'une valve à l'autre * ; trois petites de forme presque ronde, à côtes & plis réciproques comme les précédentes, mais à charniere formée de trois dents, qui engrainent dans autant de cavités correspondantes : l'une est blanche & adhère à un brin de madrepore, les deux autres sont blanches, marbrées sur les côtes de violet foncé, l'une desquelles adhère à un tuyau vermiculaire * ; une *Feuille* gris-verdâtre, à côte large, & une *Corne d'abondance*.

I. FAM. un peu triangulaire, & à grosses côtes longitudinales finissant en plis réciproques d'une valve à l'autre * ; trois petites de forme presque ronde, à côtes & plis réciproques comme les précédentes, mais à charniere formée de trois dents, qui engrainent dans autant de cavités correspondantes : l'une est blanche & adhère à un brin de madrepore, les deux autres sont blanches, marbrées sur les côtes de violet foncé, l'une desquelles adhère à un tuyau vermiculaire * ; une *Feuille* gris-verdâtre, à côte large, & une *Corne d'abondance*.

HUITRES.

* List. tab. 197. fig. 32.

* Gualt. tab. 99. litt. E.

612. Deux Huitres des Indes en pendant, blanches & fauve-rougeâtre, de forme oblongue, à valve supérieure arquée vers le dedans, & inférieure composée de trois plans, dont les deux latéraux portent, presque à plomb sur celui du milieu, à intérieur de la Coquille violet foncé, blanc, & verd-jaunâtre jouant l'opale, & à charniere comme celle de la *Corne d'abondance*, à cela près que l'un & l'autre bord de la valve supérieure est de plus garni de sept à huit dents, qui engrainent dans autant de cavités de la valve inférieure.

613. Une grande Huitre de la Virginie, rare, quoique d'espèce commune, verdâtre en dehors, blanche en dedans, à l'exception de l'endroit où étoit attaché l'animal, qui est violet

obscur , à charniere semblable à celle des pré-
cédentes , & de forme allongée très-étroite , ce
qui lui peut faire donner le nom de *Pirogue* * :
une de ses valves est chargée d'une petite Huitre
de même espèce.

I. FAM.

HUITRES.

* List. tab.

200. fig. 34.

614. Deux autres Huitres de la Virginie,
d'espèce commune , remarquables par leur
grandeur , blanc sale en dehors , blanches en
dedans à l'exception d'une grande tache violet-
noir sur chaque valve , comme dans la précé-
dente : elles ne diffèrent de celle qui est repré-
sentée dans Lister * , que par leur forme plus
large & moins allongée.

* Ibid. tab.

201. f. 35.

615. Vingt & une Huitres de différentes
grandeurs : sçavoir , deux blanches papyra-
cées adhérentes à des moitiés de Moules vio-
lettes ; trois d'Amérique , grisâtres , à coque
mince formée de plusieurs couches feuilletées ;
une grande de même espèce , qui a adhéré par
sa valve inférieure à quelque grosse branche , &
dont les deux valves sont en conséquence ar-
quées , conformément au corps que celle du
dessous a embrassé ; deux petites des mêmes
Mers , violet obscur , de forme aplatie , à stries
longitudinales , & à valves très-minces ; une de
forme semblable , mais dont la valve supérieure
est ornée de deux larges rayons blancs ; quatre
petites des côtes de Bretagne , blanches , papy-
racées , transparentes comme le talc , de la for-

I. FAM.
HUITRES.

me d'un demi-cœur, & à valve supérieure plate; un groupe de trois des mêmes Mers, violet-noir & lilas, semblables pour la forme à celles de l'article 610; deux groupes, l'un d'une Huitre raboteuse marbrée de blanc, de grisâtre & de lilas, chargée de trois glands de mer, l'autre de deux raboteuses gris de lin, & lilas nué de blanc; une *Corbeille*, & une Huitre de l'espèce de deux de l'article 612: toutes, excepté celle-ci, ont la charniere comme la *Crête de coq*.

616. Une branche de Manglier à trois jets, chargée de petites Huitres oblongues d'Amérique; une grosse masse de terre glaise verdâtre, desséchée & durcie, sur laquelle sont groupées plusieurs grandes Huitres d'espèce commune, avec des vermiculaires; & treize Huitres, ou groupes d'Huitres de nos Mers, de forme très-variée*.

* Gualt. tab.
102. lit. A. B.
D.

617. Une grande *Trompe marine* montée sur un pied, chargée de plusieurs Huitres de l'espèce des premières de l'article 610; un très-gros groupe d'Huitres communes, de Pétoncles, de Vermiculaires, d'Éponges, & d'autres Polypiers.

618. Deux groupes, dont un très-joli, formé d'un grand nombre de petites Huitres d'Amérique, papyracées, blanches mêlées de fauve, de violet & de jaune, adhérentes à une bran-

che de Manglier , & montées sur un pied ; & l'autre d'Huitres communes , adhérentes avec quelques vermiculaires à un petit vase de terre cuite.

I. FAM.

HUITRES.

619. Une Bouteille de verre , sur laquelle sont groupées des Huitres d'espèce commune , un Pétoncle , des Vermiculaires , &c.

GENRE SECON D.

HUITRES FEUILLETÉES.

620. **U**N E Huitre des Indes , nommée *Gâteau feuilleté* , & très-grande dans son espèce : elle est blanche , de forme ronde bombée , à feuilles circulaires profondément découpées , & recouvrant les deux valves , dont la supérieure est ornée de trois bandes longitudinales un peu courbes , couleur de rose , à charniere formée dans chaque valve , d'une double moulure , dont la plus grande est garnie de petites dents , qui s'engrangent réciproquement , ainsi que les moulures , dans les cavités correspondantes des deux valves * : cette charniere est la même dans toutes les Huitres de ce genre.

*Arg. pl. 20.
lett. F.Séba , pl. 88.
n°. 12.Rumph. tab.
43. n°. 3.Valentyn. bi-
val. f. 4.

621. Un *Gâteau feuilleté* un peu moins grand , mais dont les rangs de feuilles sont

 dans l'une & l'autre valve , d'une belle couleur de chair.

I. FAM.
HUITRES.

622. Deux Huitres d'Amérique , l'une jonquille , l'autre lilas , routes deux vives en couleur , à plusieurs rangs circulaires de petites feuilles tuilées , plus longues dans les rangs inférieurs , à dedans des valves mêlé de pourpre , & nommées simplement *Huitres feuilletées* : la violette adhère à une petite branche de Madrépore oculé blanc.

623. Un beau groupe de cinq *Huitres feuilletées* , dont trois grandes , l'une jonquille , l'autre lilas , & la troisième comme panachée de ces deux couleurs , & deux petites , dont une jonquille , & l'autre couleur de chair.

624. Deux groupes d'Huitres feuilletées : sçavoir , un formé de deux Huitres , lilas , adhérentes à une portion de grosse branche de Manglier , & le second , de deux petites lilas sur une grande jonquille nuée de lilas.

625. Quatre Huitres feuilletées : sçavoir , deux grandes & deux petites lilas , & deux valves d'autres de même espèce , la première jonquille , la seconde blanche , groupées sur une très-belle *Arche de Noé* fasciée de canelle & d'incarnat. Plus , un groupe de deux autres , dont une lilas , & l'autre jonquille nuée de lilas.

626. Deux jolis groupes d'Huitres feuilletées : sçavoir , un de deux grandes lilas , & l'autre de

six , quatre desquelles sont jonquille , une lilas ,
& une très-petite blanche.

I. FAM.

HUITRES.

627. Deux autres groupes d'*Huitres feuilletées* : le premier composé d'une jonquille & d'une lilas clair ; & le second de trois , dont une jonquille nuée d'incarnat & de lilas , une simplement jonquille , & l'autre lilas.

628. Cinq *Huitres feuilletées* : sçavoir , une jonquille nuée de violet , adhérente à une branche de Madrépore oculé ; une blanche engagée dans une valve de *Vieille ridée* ; une citron nuée de blanc & de pourpre , à feuilles étroites & pointues en forme d'ergots * ; & deux lilas , dont une petite semblable à une fleur de luzerne.

* Séba , pl.

88. n°. 8.

629. Trois groupes d'*Huitres feuilletées* : sçavoir , le premier d'une lilas & d'une petite blanche sur une *Arche de Noé* reticulée ; le second d'une *Huitre* jonquille nuée de lilas , d'une lilas , & d'une *Feuille* de la variété de la seconde de l'article 605 , sur une branche de Madrepore ; & le troisième d'une *Huitre* lilas , & de quelques vermiculaires sur une branche de Manglier.

630. Deux jolis groupes d'*Huitres* , & deux *Huitres isolées* : sçavoir , le premier groupe formé d'une *Huitre feuilletée* lilas , & de deux lisses , l'une blanche , l'autre marron , de l'espèce des dernières de l'article 597 ; le second de deux *Huitres feuilletées* , dont une jonquille , & l'autre

I. FAM.
HUITRES.

tre lilas, & d'une Huitre lisse, de l'espèce de la dernière du groupe précédent: les deux Huitres isolées sont petites, blanches, mais rares, à valve inférieure très-convexe, sur laquelle on remarque six rangs de feuilles circulaires plissées en forme de manchettes de femme, & à valve supérieure en forme de cœur, plate, chargée de plusieurs rangs de feuilletures couchées.

631. Quatre petits groupes d'*Huitres feuilletées*: sçavoir, une jonquille sur un *Astroïte*; une jonquille vers la tête, lilas dans le reste, adhérente à une *Moule* verte striée; deux l'une sur l'autre blanches nuées de couleur de rose & de cerise, toutes deux à stries longitudinales; & trois, dont une lilas, une citron, & une blanche nuée de lilas sur une *Arche de Noë* réticulée.

632. Trois jolis groupes, dont un de deux Huitres feuilletées lilas; un de trois autres, dont une blanche & deux jonquille nuées de lilas, & le troisième d'une blanche nuée de lilas, non nettoyée, & telle qu'elle est sortie de la mer, formant une espèce de bouquet sur une branche de Madrepore oculé gris.


633. Cinq Huitres feuilletées: sçavoir, une très-grande jonquille, à feuilles circulaires, plissées & couchées l'une sur l'autre, & logeant dans l'épaisseur de sa valve supérieure une *Pholade* blanche; & les quatre autres groupées, dont

une jonquille nuée d'incarnat, dans le dessous ~~de laquelle~~ de laquelle est nichée une petite *Pholade* mar-
ron, nommée *Sapotille*; trois Huitres lilas, & une petite jonquille.

I. FAM.
HUITRES,


634. Six Huitres feuilletées : sçavoir, une canelle foncé, marbrée en quelques endroits de blanc, & à trois rangs longitudinaux un peu courbes de feuilles tuilées se couvrant l'une l'autre; une blanche papyracée, à valve supérieure aplatie; deux jonquilles nuées de lilas, adhérentes l'une à une valve d'Huitre lisse, l'autre à une branche de Madrepore gris; & deux lilas. Plus, quatre valves inférieures d'Huitres, cerise vif nué de blanc, à tête contournée comme la Gryphite, & nommées communément *Huitres de la Mer Rouge*, valves qu'on trouve presque toujours isolées, & qui paroissent avoir perdu leurs feuilles par le frottement..

* Gualc. tab.
101. lit. D. E.



GENRE TROISIEME.

HUITRES ÉPINEUSES.

-  635. **U**NE Huitre épineuse des Indes, rare, & de la plus belle conservation, à valve supérieure blanche ponctuée de lilas vers la tête, lilas dans le reste, à stries longitudinales, serrées & hérissées d'épines plus ou moins longues, fines & recourbées., à valve inférieure mi-partie de grosses épines citron, & de larges feuilles couleur de rose, à tête prolongée, formant un plan triangulaire marqué dans son milieu d'un trait longitudinal noirâtre, & dont le sommet se recourbe en dessous, à deux petites oreilles situées aux deux côtés de chaque valve, à charniere composée de quatre dents, dont deux grosses & deux petites, s'engrainant dans les cavités réciproques des deux valves, & à bord intérieur orangé-brun*, espèce nommée *Spondile*, ainsi que les suivantes, qui, quoique très-variées, lui sont d'ailleurs semblables par la forme de la tête & de la charniere.

* Séba, pl.
89. n°. 1-4.

636. Une *Huitre épineuse* différente de la précédente par ses stries moins serrées, & par ses épines citron, grosses & applaties sur un

* Ibid. pl. fond lilas *.
88. n°. 3.

637. Une Huitre épineuse de l'espèce des précédentes , à robe , épines & feuilles lilas clair , & à tête blanche ponctuée de lilas. I. FAM.
HUITRES.

638. Une qui diffère des précédentes en ce que la valve inférieure est blanche vers la tête , orangée dans le reste , & la supérieure mêlée de blanc & de couleur de rose : les épines de cette valve sont aussi plus courtes & plus étroites *. Les Hollandois ont donné à ces Coquilles le nom de *Castagnettes*. * Séba , pl.
88. n°. 2.

639. Une Huitre épineuse des Indes , dont la valve supérieure est mi-partie blanche & violette , & dont presque toutes les épines sont orangé foncé : la valve inférieure est plate dans plus de la moitié de son étendue , pour avoir adhéré à quelque corps étranger.

640. Une autre à valve supérieure blanche , bordée dans les deux tiers de sa circonférence , & ponctuée vers la tête de brun , à épines très-courtes , à valve inférieure chargée dans sa moitié gauche de petites épines blanches , de grandes épines , & de feuilles jaune foncé , & adhérente par l'autre moitié à deux *astroïtes* , l'un à grandes , l'autre à petites étoiles , au premier desquels adhère aussi une petite Huitre blanche non épineuse.

641. Une Huitre épineuse des Indes , rare , dont la robe est totalement orangée , ainsi que

300 COQUILLES BIVALVES:

I. FAM. HUITRES. *** Séba, pl. 88. n°. 1.** les bords intérieurs des valves , & les épines , qui sont plates , larges & un peu couchées *.

*** Séba, pl. 88. n°. 6.** 642. Une autre de même espèce , mais de couleur un peu moins foncée , & dont les pi-
quans sont moins aplatis & plus droits *.

643. Une autre d'un bel orangé , dont les pi-
quans tiennent de la forme des deux variétés
précédentes : elle adhère à un caillou.

Ibid. n°. 5. 644. Deux Huitres épineuses des Indes : sça-
voir , une à valve supérieure violette tachée de
blanc , & à stries des deux valves aurore , ainsi
que les épines qui sont plates & larges vers les
bords * ; & une aurore vif , à un petit nombre
d'épines ne se montrant que sur la valve supé-
rieure , quelques-unes desquelles s'élargissent en
forme de feuilles.

*** Arg. pl. 20. Lett. G.** 645. Une grande Huitre épineuse des Indes ,
cramoisi pâle , de forme ronde , à stries inégales
chargées çà & là de grosses épines , dont quel-
ques-unes se recourbent en dedans *.

646. Une autre plus grande encore & très-
belle , à robe nuée de blanc & de cramoisi , à
grosses stries longitudinales , dont sept blanches
donnent naissance dans les deux valves , à de
grandes epines de même couleur , larges & dé-
chiquetées , & à bords intérieurs cerise.

647. Une autre de forme plus allongée , à
valve supérieure marbrée par traits fins de blanc

& de lilas , garnie d'épines peu nombreuses & ~~petites~~
 petites , à valve inférieure blanche & couleur **I. FAM.**
 de chair , recouverte d'un grand nombre de **HUITRES.**
 grosses épines plus ou moins larges , & à tête
 très-grosse recourbée en dessus en forme de bec
 de perroquet *.

648. Une grande & belle Huitre épineuse
 des Indes , de forme très-renflée , à valves lie
 de vin , à six rangs longitudinaux , & également
 distans les uns des autres de grosses stries char-
 gées d'épines longues & larges , à stries fines
 intermédiaires d'où naissent aussi quelques pe-
 tites épines , à tête orangée , & recourbée com-
 me la précédente.

649. Un groupe en forme d'arcade de deux
 Huitres épineuses des Indes , blanches , à stries
 chargées de grandes épines applaties , à canne-
 lures peu profondes marbrées par hachures
 transversales fines & en zig - zag d'amaranthe
 foncé *.

650. Une Huitre de l'espèce , & à-peu-près
 des mêmes couleurs que celles de l'article pré-
 cédent , adhérente à une pierre verdâtre.

651. Un groupe de deux Huitres épineuses
 des Indes , blanches & amaranthe , à valves
 chargées de peu d'épines , d'une moitié de mê-
 me espèce , & d'une *Huitre-feuille* blanche &
 gris de lin , adhérentes à une pierre noirâtre.

652. Deux Huitres épineuses des Indes ,

* Arg. pl. 192
 lect. H.

* Séba , pl.
 88. n°. 2.

~~adhérentes~~ adhérentes chacune à un caillou ; sçavoir , une
 1. FAM. blanche , à neuf rangs de grosses stries longitu-
 HUITRES. dinales chargées d'épines courtes & larges , à
 stries fines intermédiaires , amaranthe clair ,
 chargées de très-petites épines de même cou-
 leur * , & une de la variété de celles de l'article
 649 , à valve inférieure garnie de feuilles , &
 supérieure épineuse , à laquelle tient une valve
 de l'*Huitre-feuille*.

* Séba , pl.
 88. n°. 4.

653. Trois Huitres épineuses de moyenne
 grandeur ; sçavoir , deux blanches , marbrées
 d'amaranthe pâle , adhérentes à une pierre , &
 une aurore foncé , à pointes peu nombreuses ,
 mais longues & applaties.

654. Un groupe de deux belles Huitres des
 Indes , blanches , marbrées par traits en zig-zag
 d'amaranthe clair , d'orangé & de rose vif en
 quelques endroits , à grandes épines blanches
 dans l'une , couleur de rose dans l'autre , &
 inclinées vers le bas , à prolongation du som-
 met de la valve inférieure blanche , & s'éten-
 dant fort au loin , espèce nommée par M. d'Ar-
 genville le *Pied d'âne* *.

* Arg. pl. 20,
 Lett. E.

655. Deux Huitres épineuses des Indes ,
 dont une blanche tachetée dans ses cannelures
 de fauve roux , à un grand nombre de longues
 épines , larges sur-tout vers le bas * , & une à
 larges bandes alternatives blanches & violet-
 noir , des premières desquelles naissent quelques

* Séba , pl.
 88. n°. 7.

épines peu longues, mais larges & de même ~~couleur~~ .
couleur.

I. FAM.


HUITRES.

656. *Idem*, avec cette différence que les épines de la seconde Huitre sont nombreuses, la plupart applaties, couchées sur leur valve, & comme repliées.

657. Deux Huitres épineuses des Indes, dont une blanche à stries longitudinales grosses & fines, celles-ci amaranthe, & celles-là garnies d'épines, dont une grande partie, sur-tout vers le bas de la Coquille, s'élargit en forme de feuilles accouplées, & quelquefois triplées l'une sur l'autre, frisées & tortillées; & une blanche nuée & veinée par traits en zig-zag gris de lin, armée de longues épines applaties dans les bords des deux valves, & recouverte dans le haut de la valve inférieure, par une valve d'autre Coquille de la famille des *Cœurs*.

658. Trois autres, dont une semblable à la première de l'article précédent, à cela près que les épines en sont moins longues, plus serrées les unes sur les autres, & plus tortillées; une blanche à traits en zig-zag nombreux imitant le point d'Hongrie, & d'un bel amaranthe, à épines longues & blanches, excepté quelques-unes vers la tête, qui sont violettes, courtes & ramassées; & une blanche tachetée des mêmes couleurs que les précédentes, à valve inférieure

304 COQUILLES BIVALVES

 feuilletée, & supérieure garnie de petites épines
nombreuses.

I. FAM.
HUITRES.

659. Trois autres ; sçavoir , une rouge-sanguin , à stries fines & serrées entre les grosses qui donnent naissance à des épines peu nombreuses & peu élevées ; une blanc-sale , veinée dans les cannelures d'amaranthe , à épines peu longues & applaties , dont quelques-unes sont fouci ; & une blanche veinée & tachetée de rouge foncé , sur-tout vers le bas , où elle n'a que fort peu d'épines.

660. Trois Huitres épineuses des Indes, dont deux en pendant de la variété de la dernière de l'article précédent, mais plus chargées d'épines ; & une couleur de cerise , à stries inégales, les plus grosses veinées de blanc , donnant naissance à de grosses épines , dont quelques-unes sont assez longues , & à tête recourbée en-dessus en forme de bec.

661. Une Huitre épineuse d'Amérique, très-rare & très-belle, couleur de rose marbré de blanc , à grandes épines incarnat s'élargissant à leurs extrémités, où elles forment autant de feuilles déchiquetées , à tête garnie , comme celles des Indes, de deux oreilles, & nommée *Huitre à feuilles de persil* *.

* Seba, pl.
88. n°. 10.

662. Une *Huitre à feuilles de persil* , à riges de feuilles plus longues , & feuilles moins larges

ges que celles de la précédente , & à la valve inférieure de laquelle adhère un petit Buccin de l'espèce nommée *Mûre* ; elle est représentée dans Séba avec le même accident *.

I. FAM.
HUITRES.

* Séba , pl.
82. n°. 5.

663. Une autre plus grande & plus bombée , à longues feuilles blanches & incarnates , sur un fond couleur de rose *.

* Arg. pl. 121
lett. G.

664. Une grande & belle Huitre d'Améri- que , à robe nuée de couleur de rose , d'incarnat & de blanc , à valve supérieure presque plate , armée dans ses stries de six rangs d'épines longues & plates , entre lesquels s'en trouvent plusieurs autres d'épines courtes & aiguës , à valve inférieure très-bombée , striée aussi suivant sa longueur , & chargée partie d'épines , partie de feuilles minces & très-larges incarnates , entre lesquelles est engagée une petite branche de Madrépore oculé.

665. Une autre semblable à la précédente , de couleurs plus vives encore , & armée d'un plus grand nombre de petites pointes.

666. Une de même espèce , mais où le blanc domine davantage , à feuilles de la valve inférieure très-nombreuses , entre lesquelles , outre le Madrépore oculé , est engagée une valve d'*Arche de Noë blanche*.

667. Une autre différente des précédentes , en ce que la plupart des épines sont plus grandes & plus larges , & amaranthe vif , que la tête

I. FAM. HUITRES. **en** est vermillon , que la valve inférieure , au lieu d'être bombée , est au contraire un peu aplatie , & que les bords de cette valve se replient en dehors.

668. Un groupe de deux Huitres épineuses d'Amérique , blanches nuées de rouge & à tête aurore.

669. Une très-grande & très-belle Huitre d'Amérique , blanche nuée de couleur de rose , à tête citron , & à très-longues épines couleur de rose.

670. Une autre où le couleur de rose domine davantage , même sur la tête , & à grandes épines , moins longues que dans la précédente.

671. Une très-grande Huitre d'Amérique ; blanche , teinte en quelques endroits d'incarnat , à tête aurore , & hérissée , tant en dessus qu'en dessous , d'épines larges & très-longues.

672. Une semblable un peu moins grande.

673. Trois Huitres de l'espèce des précédentes ; sçavoir , une à valve supérieure cramoisi nué de blanc , & inférieure blanche teinte de jaune , bordée de rouge , tenant entre ses feuilles une branche de Madrépore oculé gris ; & deux petites à peu près semblables , dont la moindre est engagée entre deux Tuyaux vermiculaires.

674. Trois autres , dont une à valve supérieure bombée , blanche & couleur de rose , &

inférieure recourbée en dessous, rose sèche & ~~_____~~
 aurore vif sur-tout vers la tête, à très-longues épines, dont quelques-unes se couchent & s'engagent en partie dans les feuilles du bord; une petite à valves blanches vers les bords; & vermillon près de la tête; & une autre petite nuée de rouge & de blanc, adhérente à une branche de Madrépore oculé.

I. FAM.
 HUITRES.

675. Une grande Huitre épineuse d'Amérique, nuée de blanc & de cramoisi, à tête aurore, & longues épines couleur de rose.

676. Une autre très-belle, blanche, à tête aurore, & à épines larges, fort longues, un peu recourbées en dedans.

677. Une autre moins grande, blanche, à tête cerise, à piquans nus de couleur de rose, & adhérente à une valve d'une autre Huitre chargée de Vermiculaires, & qui lui sert de pied.

678. Une grande & belle Huitre épineuse d'Amérique, blanche vers les bords, nuée d'aurore & de rouge vers la tête, à stries très-serrées, à épines grandes & petites plus nombreuses, mais moins longues que celles des précédentes, & à intervalles des feuilles de la valve inférieure remplis de petites branches de Madrépore oculé blanc.

679. Une autre blanche; à tête orangé vif, à épines de la valve supérieure peu longues,

308 COQUILLES BIVALVES

**L. FAM.
HUITRES.**

excepté vers les bords , & celles de la valve inférieure couchées & entrelassées avec les feuilles , auxquelles adhèrent plusieurs petites branches de Madrépore oculé.

680. Une semblable , à grosses épines plus nombreuses.

681. *Idem.*

682. Une très-grande Huitre épineuse de la Méditerranée , à valve supérieure pourpre , & inférieure blanche , à stries longitudinales très-serrées & hérissées d'épines , les unes plus grandes , s'élargissant vers le haut , les autres plus petites & rondes , & à valve inférieure chargée de quelques feuilles qui naissent entre les épines , où adhèrent des Vermiculaires , & quelques Escars.

683. Une autre un peu moins grande , à feuilles de la valve inférieure plus nombreuses , & épines teintes de pourpre.

684. Un groupe de deux Huitres épineuses de la Méditerranée , à valve supérieure veinée de pourpre clair & de blanc , & inférieure blanche , hérissée d'épines plus grandes & plus nombreuses que la supérieure.

685. Une autre à valve supérieure blanche & lilas , chargée de nombreuses épines fines & grosses de même couleur , dont la plupart de celles-ci sont applaties , & à valve inférieure

blanche, presque entièrement feuilletée & un peu arquée. I. FAM.
HUITRES,

686. Deux autres en pendant, à valves supérieures veinées d'un pourpre très-vif.

687. Deux autres à valve supérieure totalement pourpre dans l'une, blanche veinée de pourpre dans l'autre.

688. Deux grandes Huitres épineuses de la Méditerranée, dont une à valve supérieure pourpre foncé, & inférieure blanche, feuilletée de fonce, remarquable en ce que la plupart des épines de la valve supérieure y sont couchées & comme colées sur cette valve; & une dont la valve supérieure est blanche, ponctuée le long des stries de pourpre, & à épines peu nombreuses de cette dernière couleur.


689. Trois autres de moyenne grandeur; sçavoir, une dont la valve inférieure se relève, à équerre sur la supérieure, en forme de corbeille, & dont les bords de celle-ci, recourbés en dehors, s'emboîtent exactement en forme de couvercle dans la cavité de l'inférieure; une adhérente à un groupe de Vermiculaires & de Tubipores; & une à feuilles de la valve inférieure souci.

690. Une grosse Pierre d'environ un pied de haut, sans le support, revêtue de concrétions marines, & à laquelle adhèrent trois Huitres épineuses de Malthe, dont une fort grande, des

Corallines, des Fucus, de petits Coquillages ;
I FAM. &c.

HUITRES.

691. Deux Huitres très-rares, dont une amar-
 ranthe clair, marbrée dans les deux valves par
 traits longitudinaux de blanc, à stries longitu-
 dinales larges & applaties, & à tête recourbée
 en dessous de gauche à droite, & l'autre à valve
 supérieure orangé forcé, marbrée par traits
 longitudinaux de blanc, & inférieure marbrée
 d'aurore, de blanc, de jonquille & de citron,
 à stries inégales serrées & arrondies, toutes
 deux dépourvues d'épines, mais de la forme
 totale des épineuses, ce qui détermine à les pla-
 cer dans ce genre.



GENRE QUATRIEME.

ANOMIES OU TÉRÉBRATULES.

692. **U**NE Anomie des Indes, très-rare, I. FAM.
HUITRES.
verd-noirâtre, à stries longitudinales très-fines, à avance de la valve inférieure sur la supérieure, en *bec de perroques*, ce qui lui en a fait donner le nom, à trou triangulaire formant le dessous de ce bec, à charniere composée dans la valve inférieure de deux petits crochets, qu'embrassent des sinus correspondans de la valve supérieure, & à deux petits appendices intérieurs fixés vers le haut de celle-ci *. Cette * Arg. pt. 23.
lett. O.
Coquille est des plus grandes que l'on connoisse dans cette espèce.

693. Un autre *Bec de perroquet* un peu moins grand que le précédent.

694. Une Anomie de Mahon, lisse, blanche tirant sur le verd d'eau, papyracée, à avance de la valve inférieure sur la supérieure moins saillante que dans la précédente, à trou rond formant le dessus de cette avance, à large aplatissement longitudinal dans le milieu de la même valve, mais peu prononcé sur-tout vers le bas, à charniere & appendice intérieur comme

I. FAM.

HUITRES.

* Ar. App.

pl. 3. lett. E.

_____ dans la précédente, & nommée *Coq & Poule* ou *Poulette** : elle est grande dans cette espèce, & tient par un petit nerf à une valve d'autre Anomie de même espèce.

695. Deux *Poulettes* blanches moins grandes que la précédente, dont une tient par un petit nerf à un brin de Corail rouge.

696. Une grande Anomie des parages voisins du détroit de Magellan, blanche, à stries longitudinales, à trou du sommet rond & fort grand, à large élévation longitudinale en forme de carène dans le milieu de la valve inférieure, à charnière peu différente des précédentes, mais montrant deux appendices latéraux longs & étroits partant du sommet de la valve supérieure, s'étendant vers le milieu de la même valve, où ils sont assujettis de nouveau par deux petits ligamens, pour se recourber ensuite vers la tête d'une façon très-singulière. Cette Coquille porte un pouce sept lignes de diamètre.

697. Une *Anomie* Magellanique qui peut servir de pendant à la précédente.

698. Deux autres en pendant, dont une Magellanique, & l'autre de la variété de l'article 694, mais moins grande.

699. Treize Anomies : sçavoir, deux petites de Mahon, rares & en pendant, jaune-blond, transparentes, à stries circulaires presque im-

perceptibles , à valve inférieure fort concave ,
 & supérieure plus plate , débordant l'inférieure dans un grand triangle curviligne en forme de lampe du côté de la tête , à petite queue forcée , & à deux espèces de petites aîles. Ces Coquilles sont du diamètre d'un gros pois , & imitent assez la forme d'un *Scarabée* , ce qui leur en peut faire donner le nom ; quatre autres beaucoup plus petites , qui diffèrent des précédentes en ce qu'elles sont sans stries , que la valve inférieure en est moins concave , & qu'au lieu de deux aîles , on y voit deux tuyaux latéraux à-peu-près égaux , & semblables à celui du milieu qui forme la queue ; deux petites de la Méditerranée , blanches , de forme ovale , peu convexes , à trou rond , & à stries longitudinales partant du sommet * ; deux autres blanchâtre , à deux espèces de petites oreilles près du trou du sommet , à stries longitudinales & circulaires très-fines , & à appendice intérieur en forme de gouttière , tenant au sommet & au milieu de la valve supérieure * ; une très-petite de même espèce , mais à stries moins serrées ; une *Magellanique* & un *Bec de perroquet*.

I. FAM.
 HUITRES.

* Gualt. tab.
 96. litt. B.

* Ibid. litt. A.

700. *Idem*.



SECONDE FAMILLE.

PEIGNES.

II. FAM.
PEIGNES.

CE sont des Coquilles de forme plus ou moins aplatie, qui ne diffèrent des Huitres du troisieme genre qu'en ce que leurs côtes ou stries longitudinales sont dépourvues d'épines, & que le sommet de leur valve inférieure ne se prolonge, ni ne se recourbe en dehors. Leurs caractères généraux sont d'avoir le sommet comme coupé en ligne droite, d'aller ensuite en s'élargissant insensiblement pour prendre une figure arrondie, & d'être ordinairement pourvues d'oreilles. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. *Les Peignes à oreilles égales & à charniere composée* 1°. d'un ligament à ressort placé dans une cavité qui occupe le milieu du sommet de chaque valve; 2°. d'un petit filet transversal

de la valve supérieure, se logeant dans une rainure correspondante de la valve inférieure. On nomme vulgairement les Coquilles de ce genre, *Pélerines* ou *Coquilles de Saint-Jacques*.

II. FAM.
PEIGNES.

2°. *Les Peignes à oreilles inégales*, à charnière comme les précédens, à valves supérieure & inférieure convexes, & nommés plus particulièrement *Pétoncles*.

3°. *Les Peignes sans oreilles & à charnière* formée d'un petit aplatissement en forme de triangle obtusangle isoscele, sur lequel est placé le ligament, & de plusieurs petites dents rangées de part & d'autre en forme d'arc dans l'une & l'autre valve.



GENRE PREMIER.
PEIGNES A OREILLES ÉGALES.

II. FAM. PEIGNES. 701. **U**N grand Peigne rare, quoique de nos mers, à valve supérieure blanche & plate, chargée de seize côtes longitudinales tachées de rouge de diverses nuances, & d'autant de larges & profondes cannelures blanches, à valve inférieure convexe presque entièrement blanche, chargée de côtes plus larges que celles de la supérieure, & dont la plupart contiennent quatre stries de même direction *.

* Gualt. tab. 99. lit. A B.

702. Dix Peignes par pendans : sçavoir, deux très-grands, à valve supérieure marbrée de blanc & de rouge, & inférieure blanche, à deux zones nuées d'orangé, d'aurore & de citron dans l'un, blanche nuée de jaune dans l'autre, tous deux à larges côtes & profondes cannelures, chargées de stries longitudinales & transversales, mais dont celles-ci sont plus sensibles dans le second, & celles-là dans le premier * ; deux blancs, & quatre marbrés de blanc & de diverses belles nuances de rouge & de jaune, de la variété des deux premiers de cet article, & deux de celle de l'article précé-

* Gualt. tab. 98. lit. A. B.

dent, mais plus petits, & qui en diffèrent d'ail-
leurs en ce que le fond en est rose sèche.

II. FAM.
PEIGNES.

703. Deux Peignes d'Amérique, à valve inférieure très-convexe, & supérieure un peu concave, chargées l'une & l'autre en dehors de stries applaties peu marquées vers la tête, & en dedans de paires de stries peu sensibles aussi vers le haut, espèce nommée *Bénitier*, l'un desquels est peu commun en ce qu'il est entièrement blanc, l'autre n'a que la valve inférieure qui soit blanche, la supérieure est lilas marbrée de fauve & de brun.


704. Deux *Bénitiers*, à valve supérieure marbrée de rouge-brun, de violet & de gris, & inférieure fauve nuée de blanc.

705. Deux Peignes des Indes en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures peu serrées, à valve supérieure rose sèche en dehors, rayonnée de lignes longitudinales rouge-brun, & en dedans blanche, bordée de lie de vin, à valve inférieure totalement blanche, à coque mince, & de forme très-peu bombée, quoiqu'également dans chaque valve, espèce nommée *Sole* ou *Eventail* *.

706. Une *Sole* des Indes de quatre pouces & demi de diamètre, à valve supérieure veinée en dehors par cercles alternatifs de rouge-brun de diverses nuances & de blanc, à rayons blancs peu prononcés, & en dedans blanche

* Arg. pl.
24. lett. G.
Rumph. tab.
45. Hec. A. B.
Bonan. cl. 3.
fig. 354.

II. FAM.
PEIGNES.

 bordée de citron , à valve inférieure blanch
nuée de citron en dehors , & semblable en de
dans à la supérieure , variété que l'on nomme
Sole de la rare espèce.

707. Une *Sole* de l'espèce de celles de l'ar
ticle 705 , mais rare en ce que la valve supé
rieure est parsemée vers les bords de taches
grandes & petites ventre de biche , & que l'in
férieure est pareillement tachée d'un blanc plus
mat que le fond , variété que l'on nomme *Sole*
marquetée.

708. Deux autres variétés de *Soles* rares ,
l'une à valve supérieure rouge-brun , rayonnée
sur-tout vers le haut de faisceaux jaunes , & de
lignes brunes en dehors , bordée de pourpre en
dedans , à valve inférieure comme les précé
dentes ; & l'autre à stries longitudinales inté
rieures très-ferrées , à valve supérieure rouge
sanguin , & inférieure nuée par zones de blanc
& de couleur de rose de diverses nuances.

709. Deux *Peignes* d'Amérique en pendant ,
lisses en dehors , à stries longitudinales inté
rieures bien prononcées , à valve supérieure
platte , rouge-brun en dehors , blanche ta
chée d'orangé-brun en dedans , & inférieure
concave , blanche tant au dedans qu'au dehors
dans l'un , fauve nuée de blanc dans l'autre.
Cette espèce de *Peigne* que nous connoissons

depuis peu, est de forme moyenne entre celles de la *Sole* & du *Bénitier*.

II. FAM.
PARGES.

710. Un Peigne Magellanique rare & très-grand, mais un peu dégradé, à robe nuée de blanc & de couleur de tuile en dessus, blanc nué d'incarnat en dessous, à stries longitudinales fines & serrées, à valve supérieure aplatie, & inférieure un peu bombée, toutes les deux nacrées en dedans.

GENRE SECOND.

PEIGNES A OREILLES INÉGALES.

711. UN grand Peigne d'Amérique, ponceau vers la tête, rouge-brun dans le corps, à stries longitudinales partie blanches, partie du fond, à grosses côtes comprenant chacune plusieurs de ces stries, & chargées en outre de tubercules disposés par zones, qui dans la valve supérieure sont quelquefois en forme de tuiles arrondies, dentelées & relevées, à stries transversales très-fines & très-serrées, espèce que la ressemblance de la couleur avec celle du corail, a fait nommer *Coraline* *.

* Arg. pl. 24.
lett. F.
Séba, pl. 87.
n°. 1 & 2.

712. Une *Coraline* un peu moins grande & d'un rouge plus brun que la précédente.

320 COQUILLES BIVALVES.

II. FAM. PEIGNES.
 * Séba, pl. 87. n°. 3 & 4.

713. Une autre de moyenne grandeur, 3 valve supérieure, d'un beau rouge-sanguin, & inférieure couleur de rose vif *.

714. Une autre à valve supérieure rouge-sanguin, teinte en quelques endroits de blanc & de rose sèche, & à valve inférieure couleur de rose, blanche & aurore.

715. Une *Coraline* de moyenne grandeur, & tres-rare en ce qu'elle est entièrement aurore.

716. Deux Peignes, dont un rare d'Amérique blanc en dehors, jonquille & violet en dedans, à neuf côtes dans la valve supérieure, & dix dans l'inférieure, chargées de tuiles plus ou moins recourbées en dessous, à oreilles très-inégales chargées elles-mêmes de petites tuiles, espèce nommée *Pélerine tuilée* * ; & un des Indes, marbré en dehors par zones ondées interrompues vers le haut, d'amarante & de blanc, bordé en dedans d'aurore & de cramoi, à côtes longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, de stries tuilées, nommé en Hollande *Manteau Royal*, & en France *Manteau Ducal* *.

* Arg. pl. 24. lett. I.
 Séba, pl. 87. n°. 8-12.

717. Un *Manteau Ducal* marbré en dehors de diverses belles nuances de rouge, de jaune & de blanc, presque entièrement jonquille pâle vers les bords, blanc bordé d'orangé en dedans, & grand dans cette espèce.

718.

718. Un *Manteau Ducal* plus grand que le précédent, dans la marbrure duquel n'entrent que le blanc & les plus belles nuances de rouge, à bord intérieur couleur d'or, plus large que celui du précédent.

II. FAM.
PEIGNES.

719. Un autre marbré en dehors par zones onduées alternatives de rouge-brun & de blanc, teint dans les côtes de cerise pâle, & en dedans blanc teint de cramoisi, bordé d'orangé.

720. Un autre, dont le dessus est blanc tacheté de noir à la tête, marbré dans le reste de rouge de diverses nuances, de blanc & de noir, & dont le dedans est bordé d'aurore vif teint de cramoisi.

721. Un Peigne des Indes, à valve supérieure blanche, tachée par zones d'orangé foncé, & inférieure blanche en entier, à grosses côtes longitudinales, chargées, ainsi que les cannelures, de stries fines en même sens, à oreilles peu inégales, & grand dans son espèce, nommé par quelques-uns *Manteau Ducal blanc*, & par d'autres la *Gibeciere* ou la *Bourse* *.

* Arg. pl.
24. lett. D.

722. Une *Bourse*, dont les taches sont orangé, brunes & noires.

723. Un grand Peigne des Indes, rare, marbré en dehors de blanc, d'amarante & de lilas, teint en dedans des mêmes couleurs, à grosses stries & cannelures longitudinales, à

322 COQUILLES BIVALVES

II. FAM.
PÉTONCLES.

oreilles fort inégales , & à la valve supérieure duquel adhère une belle *Crête de coq*.

724. Un Peigne des Indes , rare , ponceau nué d'aurore tant en dehors qu'en dedans , à stries longitudinales égales & un peu raboteuses.

725. *Idem*.


726. Trois Peignes des Indes : sçavoir , deux Pétoncles rares , dont un marbré en dessus par larges zones en zig-zag de brun & de blanc veiné vers la tête de bleu clair , à neuf côtes longitudinales , & à stries fines & ferrées en même sens ; l'autre à tête blanche veinée de rouge & de bleu clair , rouge-brun dans le reste , à cinq côtes peu saillantes chargées , ainsi que les cannelures , de stries fines en même sens * ; & un *Manteau Ducal* riche en couleurs.

* Gualt. tab.
74. list. 2.

727. Trois autres : sçavoir , deux Pétoncles en pendant , marbrés par grandes taches de brun , de blanc & de rouge , mais du reste semblables au second de l'article précédent , & un très-beau *Manteau Ducal*.

728. Trois autres : sçavoir , deux Pétoncles de l'espèce des premiers de l'article 726 , marbrés en dessus par zones d'olive , de brun & de jaune de diverses nuances , jaunes en dessous ; & un beau *Manteau Ducal* à tête blanche.

729. Trois Pétoncles peu communs : sça-

voir, un de la mer du Sud, rouge-sanguin nué 
 d'aurore ; & taché de blanc, semblable du II. FAM.
 reste à celui de l'article 724 ; & deux des côtes PEIGNES.
 d'Espagne, à larges côtes peu nombreuses,
 marbrés en dessus, l'un de fouci, de blanc &
 de brun, l'autre d'olive, de bleu clair & de
 gris, tons deux blancs en dessous *.

* Gualc. tab.

730. Six Pétoncles des côtes d'Espagne, à 74. litt. A. B.
 côtes peu saillantes, de couleurs & marbrures
 très-variées.

731. Huit jolis Pétoncles par pendans, dont
 quatre des côtes d'Espagne ; deux des Indes, à
 grandes taches blanches & rouge obscur ; un
Manteau Ducal marbré par zones ondées de
 rouge-brun & de blanc, & un semblable d'un
 rouge plus vif.

732. Neuf Pétoncles : sçavoir, huit d'Espagne
 par pendans, dont deux nommés *Brocatelle*,
 à cause de leur belle marbrure blanche & rouge
 de diverses nuances dans l'un, rouge-sanguin,
 couleur de rose & aurore dans l'autre ; & un
Manteau Ducal.

733. Dix - huit Pétoncles d'Espagne, d'un
 beau choix, & de couleurs très-variées, dont
 quelques-uns papyracés & transparens, d'autres
 à grosses côtes peu nombreuses, & le reste des
 espèces déjà décrites.

634. Deux Pétoncles d'Amérique, peu com-
 muns, à grosses & petites stries longitudinales

324 COQUILLES BIVALVES

 un peu tuilées, à coque mince, lie de vin nuée
II. FAM. de fauve & de fouci *.

PEIGNES. 735. Dix Pétoncles de moyenne grandeur ;
* Séba, pl. 87. n°. 14. & petits : sçavoir, quatre d'Amérique, de l'espèce des précédens, dont trois rouges un peu

* Ibid. n°. 13. marbrés de blanc sale *, & un citron vif ; quatre autres à stries longitudinales rudes au toucher, à tête blanche tachetée d'amaranthe, & le reste ponceau * ; & deux des Indes, à petites côtes longitudinales, tuilées dans l'un, chagrinées dans l'autre ; tous deux blancs tachetés d'orangé & de brun.

* Arg. pl. 24.
lett. H.


736. Deux Peignes des mers du Nord, papyracés, à stries longitudinales grosses & petites, à robe formée dans l'un de zones aurore de diverses nuances, & dans l'autre de faisceaux alternatifs blancs & amaranthe clair ; tous deux blancs nués de lilas en dessous & vers le sommet.

737. Deux grands Peignes de l'espèce des précédens, dont les valves, quoiqu'assez semblables, ne sont point pareilles, & qu'il est très-rare de trouver complets ; tous deux nués par zones de couleurs très-vives, entr'autres d'incarnat, de couleur de rose, d'aurore, de cerise, de violet & de ponceau *.

* Séba, pl. 87. n°. 7.

738. Deux autres semblables, à quelques différences près dans les nuances.

739. *Idem.*

740. Vingt-quatre Pétoncles : sçavoir , vingt-
deux de nos mers , du plus beau choix , qui par la richesse & la variété de leurs couleurs , ne
cédent en rien à ceux des Indes , entr'autres un violet , un couleur de feu , deux blancs , un
marbré de blanc & de couleur de rose , quatre
de forme bizarre , qui leur vient d'avoir adhéré
à d'autres Coquilles ; deux tuilés , dont un mar-
bré de jonquille & d'aurore , &c. * & deux pe-
tits *Manteaux Ducaux*.

II. PAM.
PEIGNES.

* Gualt. tab.
74. lett. M-X.

741. Vingt-huit Pétoncles de nos mers , de
couleurs très-belles & très-variées , dont deux
grands chargés de tuyaux vermiculaires , &
deux petits adhérens à deux valves d'Huitres
d'espèce commune.


742. Quarante-cinq Pétoncles de nos mers ,
non moins variés , & non moins bien choisis
que ceux de l'article précédent.

743. Deux Pétoncles rares : sçavoir , un de
la Chine , à tête blanche tachée de brun , cerise
vif dans le reste , de forme arrondie & bombée ,
à oreilles peu inégales , à stries & cannelures
égales & bien prononcées ; l'autre du Pérou , à
valve supérieure marbrée de blanc , de couleur
de chair , de jonquille & de brun , & inférieure
blanche tachée en quelques endroits de brun ,
à oreilles très-petites , & du reste semblable au
précédent.

744. Trois autres de même forme : sçavoir ,
X iij.

326 COQUILLES BIVALVES

II. FAM.
PEIGNES.

 deux de S. Domingue , marbrés en dessus de blanc & de gris verdâtre , un peu tachés de fauve en dessous , & un de la Chine , semblable au premier de l'article précédent.

* Arg. pl.
24. lett. E.
Rumph. tab.
44. litt. D.

745. Cinq Peignes blancs de forme oblongue & évasée d'un côté , à très-petites oreilles inégales , & à valves un peu béantes au - dessous : sçavoir , deux des Indes , hérissés sur les stries de petites tuiles presque droites , qui leur ont fait donner les noms de *Rape* ou de *Ratissoire* * , & grands dans leur espèce ; un de S. Domingue , à stries longitudinales fines & serrées , composées d'espèces de bâtons rompus qui se suivent obliquement & régulièrement d'une strie à l'autre , & à une des oreilles retrouffée d'un côté dans les deux valves , espèce nommée la *Lime* ; un des mêmes parages , & semblable à cela près que les stries en sont plus fines , & les petits bâtons rompus plus contigus , variété que l'on nomme *Lime douce* ; & un de la Barbade , à stries longitudinales peu serrées , de forme un peu renflée , & béant des deux côtés à la fois *.

* List. tab.
277. f. 14.



GENRE TROISIEME.

PEIGNES SANS OREILLES.

746. **U**N Peigne des Indes, blanc marbré par taches de brun, de jaune & de bleu, à côtes nombreuses serrées l'une contre l'autre, arrondies & ficelées, à bords intérieurs aplatis, de forme ronde & bombée, nommé *Pétoncle sans oreilles*, & grand dans son espèce *.

II. FAM.
PEIGNES.


* Arg. pl. 246

lett. B.

List. tab. 239.

f. 73.

747. Cinq Pétoncles sans oreilles : sçavoir, deux d'Amérique en pendant, jonquille pointillés de brun ; un petit des Indes, nué de blanc & de couleur de rose, taché & pointillé de brun ; & deux de la variété de celui de l'article précédent.



TROISIEME FAMILLE.

CAMES.

 III. FAM.
CAMES.

Ces Coquilles différent des *Huitres* par l'uniformité constante de leurs deux valves, & des *Peignes*, en ce qu'elles n'ont point d'oreilles. Leurs caractères généraux sont d'avoir les deux valves égales, convexes & parfaitement semblables. Nous les diviserons ici, d'après le contour commun des bases de leurs valves, en quatre genres ; sçavoir,

1°. Les *Cames à bases rondes régulières*, qui sont les vrais *Cames*.

2°. Les *Cames à bases rondes irrégulières* par quelque pli ou sinuosité.

3°. Les *Cames à bases ovales régulières*, nommées vulgairement *Palourdes*.

4°. Les *Cames à bases ovales irrégulières*, dont un des bords est ondé & comme replié, nommées aussi *Lavignons*.

GENRE PREMIER.

CAMES A BASES RONDES RÉGULIÈRES.

748. **D**EUX grandes Cames de S. Dominique, dont une blanche nuée de couleur de chair, & réticulée en dehors, citron clair, bordée de couleur de rose en dedans, & à charnière formée dans l'une des valves, de deux grosses dents fort proches l'une de l'autre, & de trois cavités qui reçoivent les trois dents correspondantes de l'autre valve, nommée le *Rézeau blanc*; & une de même espèce, mais polie, & devenue par-là blanche, rayée dans le bas, & par zones de couleur de rose *.

III. FAM.
CAMES.


749. Deux *Rézeaux blancs*, l'un nué de citron en dehors, citron en dedans; l'autre poli, & devenu citron bordé de trois zones couleur de rose en dehors, & d'une seulement en dedans.

* Gualt. tab.
77. litt. A.
Adanson, pl.
16. fig. 3.

750. Deux *Rézeaux blancs*, l'un teint de rouge en dehors, bordé de rouge en dedans, l'autre poli & devenu citron, bordé de couleur de rose tant en dedans qu'en dehors.

751. Trois *Rézeaux blancs* un peu moins grands, dont un teint vers la tête de citron, &

330 COQUILLES BIVALVES

 deux polis, l'un à deux zones couleur de rose près des bords, l'autre à une seulement.

III. FAM.
CAMES.

752. Deux grandes Cames de même espèce, polies, & en pendant.

753. Une autre très-belle; polie, blanche teinte de citron, ornée dans toute sa robe de plusieurs zones rouges de diverses nuances en dehors, citron bordé de cerise vif en dedans.

754. Une Came de même espèce, très-grande, & du plus bel éclat, citron vif, ornée sur les bords près de la tête, de deux flammes cerise en dehors, & citron clair en dedans.

755. Trois Cames polies, dont une des Indes très-grande & peu commune, mais un peu fruste, blanche, de forme très-bombée, à charnière formée dans l'une des valves de trois grosses dents sous les sommets, & de deux latérales, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes de l'autre valve; & deux de l'espèce des précédentes, dont une citron en entier.

756. *Idem.*

757. Trois Cames d'Amérique: sçavoir, une de la Jamaïque, peu commune, blanche, de forme aplatie, à stries circulaires très-fines, & à charnière composée de quatre dents dans l'une & l'autre valve*; & deux de S. Dominique, polies, de l'espèce des précédentes.

* Lift. tab.

288. fig. 124.

Gualt. tab. 76.

Litt. F

Adanf. Hist.

du Sénég. pl.

26. fig. 5.

758. Six Cames par pendans: sçavoir, deux de la Méditerranée, blanches, flambées par

zônes de canelle foncé, à charniere comme celle des *Peignes sans oreilles*, & nommées *Furries* * ; deux blanches, teintes de jaune vers la tête, à rayons peu prononcés couleur de rose, à stries circulaires fines & égales en dehors, blanc teint de citron en dedans, & à charniere composée de trois dents dont une latérale dans une des valves, & de deux dans l'autre * ; & deux de S. Domingue, polies, de l'espèce des précédentes.

III. FAM.

CAMES.

* Bonan. cl.

2. n°. 60 & 61.

Gualc. tab. 72.

litt. G.

Adanf. Hist.

du Sén. pl. 18.

f. 10.

* List. tab.

299. f. 136.

759. Deux Cames des Indes, très-rares, l'une marron foncé, de forme bombée, à stries fines longitudinales canelle, à bords denteles en dedans, & à charniere comme les premieres de l'article précédent, espèce nommée en Hollande l'*Eventail des Meannonites*; & une plus petite, qui n'en diffère que par la couleur moins foncée, & deux grandes taches latérales blanches rayées par traits fins en zig-zag jonquille. Cette dernière a beaucoup de ressemblance avec l'*Orpheline* dont parle M. d'Argenville dans son appendice *, & qu'il range parmi les *Peignes sans oreilles*.

* Arg. App.
pl. 3. litt. C.

760. Sept Cames : savoir, une de la Méditerranée, gris de lin nué de fauve foncé, à stries circulaires & longitudinales très-fines, à bords denteles en dedans, & à charniere comme celle des premieres de l'article 758. Cette Coquille est aussi rare à trouver dans la mer,

III. FAM. CAMES. qu'elle est commune fossile; deux des Indes, de forme aplatie, blanches marbrées en zig-zag d'orangé-brun, à stries fines circulaires, à charniere formée de trois petites dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nommées le *Point d'Hongrie* *; deux de forme moins aplatie, ventre de biche, à un large rayon blanc sur le milieu du corps *; une encore plus bombée, blanche, à grandes taches circulaires rougeâtres, interrompues dans chaque valve par deux rayons du fond *, & une petite blanche & plate, à stries fines longitudinales tuilées *.

* Arg. pl.
21. lett. M.
Rumph. tab.
42. litt. C.
* List. tab.
292. fig. 128.

* Ibid. tab.
295. fig. 131.


* Ibid. tab.
311. f. 147.

761. Huit Cames, dont six par pendans: sçavoir, une rare des Indes, violette, nuée par zones & par rayons longitudinaux de blanc tant en dedans qu'en dehors, à stries fines circulaires, à charniere formée dans une des valves de deux grosses dents, avec deux cavités sur les côtés, & une troisieme entr'elles, qui reçoivent les trois dents de l'autre valve; deux petites d'Amérique, peu communes, blanches, à stries fines onduleuses bien prononcées *; quatre petites de la Jamaïque, à zones rouges de diverses nuances tant au dedans qu'au dehors, & à stries onduleuses fines & serrées *; & une des Indes, de l'espèce de la premiere de l'article 757.

* Ibid. tab.
301. f. 142.

* Ibid. tab.
339. f. 176.

762. Six Cames de forme très-bombée, & à

coque épaisse : sçavoir, deux d'Amérique,  III. FAM. CAMES.
 blanc sale, à quatre flammes longitudinales fau-
 ves, à stries transversales nombreuses, minces
 & ridées, laissant entr'elles de profondes can-
 nelures, & à charniere comme celle de la pre-
 miere de l'article précédent, espèce nommée
Clonisse * ; deux *Clonisses* de la Méditerranée,
 qui diffèrent de celle-ci en ce que les stries en
 sont plus arrondies, traversées vers les côtés
 d'autres cannelures, qui les rendent en cet en-
 droit comme ficelées, & en ce que la robe en est
 couverte de petites marbrures très-fines en zig-
 zag fauve-roux * ; & deux de même espèce,
 dépouillées de leurs stries.

* List. tab.
 285. fig. 123.
 Adans. pl. 162
 f. 1.

* List. tab.
 284. f. 122.
 Gualt. tab. 75.
 litt. H.

763. Six grosses Cames par pendants : sça-
 voir, deux du Sénégal, fauves, revêtues d'un
 épiderme noir, à stries ou rides circulaires très-
 fines, & à charniere formée dans chaque valve
 de quatre dents : c'est le *Pitar* de M. Adanson,
 mais du double plus grand que celui dont parle
 l'Auteur * ; quatre de la Méditerranée, dont
 deux couleur de tuile, à coque épaisse, à char-
 niere comme celle des Peignes sans oreilles, &
 à rézeau très-fin, revêtu dans l'une & dans
 l'autre d'un *drap marin*, qui imite le velours * ;
 & deux lisses fauve foncé, rayonnées de fauve
 clair, à charniere composée de trois dents
 dans chaque valve *.

* Hist. du
 Sénég. pl. 16.
 f. 7.
 List. tab. 272.
 f. 108.

* Gualt. tab.
 73. litt. A.
 Bonan. cl. 2.
 f. 80.

* Gualt. tab.
 86. litt. A.

764. Quatre belles Cames des Indes, de

- III. FAM. CAMIS.** forme bombée , dont deux blanches marbrées en quelques endroits de violet pâle , & par larges traits en zig-zag de brun obscur , à stries circulaires très-fines , & à charniere composée dans l'une des valves , de trois dents , & de quatre dans l'autre * ; une de même espèce , peu commune en ce que les traits en zig-zag y sont orangé ; & une fauve foncé rayonnée de mar-
* Gualt. tab. 82. litt. H.
 List. tab. 262. f. 98.
 ron de diverses nuances en dessus , citron , bordée de blanc en dedans , & à charniere
* Ibid. tab. 257. f. 85.
 Gualt. tab. 71. litt. C.
 comme dans la premiere de l'article 757 *.
765. Huit autres de mêmes forme & char-
 niere : sçavoir , deux blanches , à rayons formés de traits & de taches triangulaires rouge-brun , imitant des caractères , & à stries circulaires très-fines * ; deux blanches ornées par zones
* List. tab. 257. f. 92.
 Gualt. tab. 82. litt. G.
 fines & serrées de traits en zig-zag canelle foncé , à stries fines transversales , & jaune d'or en de-
* Ibid. tab. 75. litt. O.
 dans * ; deux blanches rayonnées de canelle clair ; & deux de la variété des premieres de l'article précédent.
766. Six autres : sçavoir , deux blanches , à rayons formés de taches & de traits fauve-noirâtre , & à stries circulaires bien prononcées ; une blanche marbrée de taches & de chevrons fauve-roux , à stries circulaires plus fines , à charniere comme les précédentes * ; une des
* List. tab. 258. f. 94.
 Valent. biv. fig. 16.
 Indes , peu commune , polie , blanche teinte vers les bords , en partie de rouge pâle , & en

partie de bleu tant en dehors qu'en dedans, & à charniere comme celle de l'article 148¹; III. FAM. une blanche bariolée de traits pourpres formant un rézeau à taches triangulaires du fond²; & une de l'espèce des premières de l'article précédent.

CAMES.

¹ Séba, pl.

36. n°. 18.

List. tab. 271.

f. 107.

² Ibid. tab.

257. f. 95.

GENRE SECOND.

CAMES A BASES RONDES IRRÉGULIERES.

767. **D**eux grandes Cames des Indes, blanches, marbrées par grandes taches, & rayonnées de fauve brun, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, celles-ci plus saillantes, les autres plus fines formant un réseau celluleux, à charniere composée dans chaque valve de trois grosses dents, & à valves garnies de deux lèvres latérales se recouvrant l'une l'autre, espèce nommée en Hollande le *Rayon de miel* *.

^{*} Ibid. tab.

336. f. 173.

768. Deux grands *Rayons de miel* de Saint-Domingue, blanc fauve, à stries transversales très-saillantes, & en vive arrête, & du reste semblables aux précédens *.

^{*} Rumph.

tab. 42. lit. F.

List. tab. 341.

f. 178.

769. Deux Cames de Bengale, blanches, ornées de traits fauves en zig-zag, réticulées,

336 COQUILLES BIVALVES

~~granuleuses~~ granuleuses, à charniere fouci, composée dans
 III. FAM. l'une des valves de trois dents, & de deux dans
 CAMES. l'autre, & à lèvres latérales se recouvrant plus
 * List. tab. exactement que dans l'espèce précédente *.

335. f. 172.

* Arg. pl. 21.
 lett. N.
 List. tab. 305.
 f. 138.

770. Six Cames d'Amérique & par pendans;
 sçavoir, deux blanches, à coque épaisse, de
 forme presque sphérique, à stries & fascies cir-
 culaires peu prononcées, à double sinuosité vers
 les bords de chaque valve, & à charniere for-
 mée de trois dents dans l'une des valves, & de
 quatre dans l'autre : c'est *la Jamaïque* de M.
 d'Argenville *; deux semblables, polies, d'un
 bel éclat, & nommées *Billes d'ivoire*; deux
 peu différentes des précédentes, quant aux plis
 latéraux des deux valves, mais de forme appla-
 tie, jaune clair en dehors, & fouci en dedans,
 à charniere composée de trois dents dans l'une
 des valves, s'engrainant dans trois cavités cor-
 respondantes, l'une à stries circulaires fines &
 lamelleuses, l'autre dépouillée & polie : on les
 nomme *Abricots* *.

* Ibid. tab.
 300. f. 137.

* Ibid. tab.
 260. f. 96.

771. Six autres; sçavoir, deux blanches en
 dehors, jonquille en dedans, de forme bom-
 bée, à stries circulaires très-fines, & fascies peu
 marquées, à deux sinuosités de chaque côté des
 sommets, & à charniere formée d'un très-petit
 filet transversal se logeant dans une rainure cor-
 respondante *; deux de l'espèce des premières
 de l'article précédent, mais dans l'état où elles
 ont

ont été tirées de la mer : leurs stries sont fines ~~—————~~
 & lame lueuse ; & deux *Abricots* , dont un peu commun , en ce qu'il est blanc , & l'autre poli de la variété des précédens. III. FAM.
CAMES.

772. Huit autres ; sçavoir, deux peu communes, dont une blanche nuée d'amarante clair, & une blanche nuée de saune, toutes deux papyracées, à stries fines transversales, serrées & peu marquées, & longitudinales fines aussi, mais plus distantes & mieux prononcées, à valves s'avancant & se relevant d'un côté, ce qui rend la Coquille béante en cet endroit où les bords sont dentelés, & à charnière composée dans l'une des valves de trois dents, dont une petite sous le sommet, & deux minces latérales s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve ; une de la Jamaïque, blanche & lisse, à valves prolongées d'un côté, mais jointes exactement, & à charnière formée de trois dents dans les deux valves * ; une des Indes, blanche, de forme peu renflée, ornée d'un compartiment très-serré de petites tuiles de champ, à sinuosité dans un des bords latéraux de chaque valve, à charnière composée de deux dents latérales, & d'une sous les sommets dans chaque valve, nommée *Guillochée* *, & grande dans cette espèce ; deux petites vertes, à bords sinueux & à stries circulaires la-

* List. tab.

274. f. 110.

* Gualt. tab.

76. litt. E

List. tab. 302.

fig. 141.

338 COQUILLES BIVALVES

III. FAM. melleuses * ; & deux de l'espèce des premières des articles 770 & 771.

CAMES.

* Gualt. tab.

77. litt. Q.

773. Cinq Cames à bords sinueux d'un côté ; savoir, deux des côtes de Normandie , blanches , teintes légèrement de citron , tant au dehors qu'en dedans , à stries & fascies transversales très-fines , & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves , & de quatre dans l'autre * ; deux *Guillochées* tachées de fauve , & un *Rayon de miel* de la variété de ceux de l'article 767.

* List. tab.

191. f. 234.

GENRE TROISIÈME.

CAMES A BASES OVALES RÉGULIÈRES.

774. **U**NE grande & belle Came des Indes, peu commune, blanche marbrée dans les deux tiers de chaque valve d'un beau violet, polie, & à charniere formée de trois grosses dents sous les sommets, & d'une quatrième latérale *.

III. FAM.
CAMES.

775. Une Came des Indes, rare, marbrée par grandes zones de fauve, de couleur de chair & d'aurore, à rayons longitudinaux de nuances plus foncées que le fond de brun & de marron, interrompus en quelques endroits de blanc, à stries larges & applaties, à charniere comme celle qui a été décrite dans l'article 748, & très-grande dans son espèce, nommée *Cedonulli* *.

* Séba, pl. 86. n°. 15.

776. Une belle Came des Indes, à stries longitudinales & transversales; celles-ci un peu ondées & formant avec les autres un réseau granuleux vers la tête & les côtés, à bords épais, taillés en biseau, & très-finement dentelés, à charniere formée de deux dents dans chaque valve, & grande dans son espèce, nommée la *Tricoïte* ou la *Corbeille* *.

* Liff. tab. 268. f. 104.

* Arg. pl. 21. lett. G.
Gual. tab. 75. litt. C.

340 . COQUILLES BIVALVES

III. FAM. CAMES. 777. Deux belles Cames un peu moins grandes que les précédentes ; sçavoir , un *Cedo nulli* de couleurs très-vives , & une *Corbeille* teinte sur les côtés de couleur de rose.

* Gualt. tab.
86. litt. I.
List. tab. 270.
f. 106.

* Arg. App.
pl. 3. lett. B.
List. tab. 378.
f. 221.

* Arg. pl. 21.
lett. P.
List. tab. 312.
fig. 148.
Gualt. tab. 75.
lit. A.

778. Six Cames par pendans ; sçavoir , deux du Brésil , lisses , couleur de chair , ornées de taches fauve brun , quarrées dans l'une , & en zig-zag imitant le point d'Hongrie dans l'autre , à charnière composée de trois dents dans chaque valve , & nommées *Cames truitées* * ; deux des mêmes mers , de forme aplatie , à zig-zags plus nombreux , diversement entrelacés , de couleur violette sur un fond blanc-jaunâtre , à stries plates circulaires , à bords très-finement dentelés , & à une grande tache violette au dedans de chaque valve , espèce nommée le *Zig-zag* * ; & deux blanches marbrées vers la tête & l'un des côtés de fauve brun , à grosses stries longitudinales granuleuses , & comme ficelées , devenant obliques vers le côté finueux , à charnière de quatre dents dans chaque valve , espèce nommée *Came-feuille* ou l'*Amande* *.

779. Trois autres , sçavoir , une *Corbeille* teinte en dedans de citron , & deux *Cedo nulli* en pendant.

780. Quatre Cames des Indes ; sçavoir , une blanche à deux larges faisceaux de taches gris de lin , à cinq fascies circulaires peu prononcées , & peinte en dedans par les Chinois , pour servir

à un de leurs jeux , dans lequel il s'agit d'apparier , avec le plus de promptitude , les deux valves d'une même Coquille , mêlées à dessein avec celles d'un grand nombre d'autres ; deux *Cames-feuilles* marbrées presque entièrement de fauve roux , & teintes de bleu aux sommets ; & une *Came truitée* : toutes , à l'exception d'une des *Cames-feuilles* , sont grandes dans leur espèce.

III. FAM.


M

781. Cinq Cames des Indes ; sçavoir , une peu commune , fauve nué de gris , à un petit nombre de rayons étroits d'une nuance plus foncée , à stries circulaires égales & applaties comme dans le *Cedo nulli* , mais moins larges & à charniere formée de quatre dents dans les deux valves ; deux à peu près semblables & de même fond , mais ornées de petits chevrons gris-verdâtre plus prononcés dans quatre rayons & vers le bas que dans le reste , & à charniere composée dans l'une des valves de trois petites dents , & de deux dans l'autre ; & deux petites *Cames-feuilles* blanches.

782. Vingt-quatre petites Cames des Indes ; sçavoir , dix-sept lisses & du brillant de l'agate , de marbrure & couleurs fort variées , à rayons plus ou moins prononcés & de forme bombée , connues sous le nom général de *Cames luisantes* * ; deux *Zig-zags* de la variété de l'article 778 ; trois autres qui n'en diffèrent qu'en

* List. tab.

379. fig. 222.

 ce qu'ils sont liffes & à traits canelle plus fins & plus nombreux ¹; & deux Rayonnées ².

III. FAM.

CAMES.

¹ List. tab. 387. f. 223. Rumph. tab. 42. litt. M. ² Ibid. litt. L. ³ Gualt. tab. 96. litt. B. ⁴ List. tab. 429. f. 2-3.

783. Neuf Cames d'Amérique, sçavoir; deux blanches nuées de citron & de violet ³; deux rayonnées de blanc & de violet ⁴; une à faisceaux alternatifs des mêmes couleurs; deux blanches à tête cerise, nuées plus bas de couleur de rose, toutes les sept à stries longitudinales bien prononcées, & à stries fines circulaires formant, sur-tout vers les bords, un rézeau granuleux, à valves un peu béantes dans l'un des côtés, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux dents; une blanche à trois zones couleur de rose, à stries longitudinales ondées, plus grosses que celles des précédentes, & à charniere formée d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre; une de l'espèce des deux premières de cet article, mais polie & blanche, bordée de violet; & une des Indes, qui ne diffère des troisieme & quatrieme de cet article, qu'en ce qu'elle est plus grande & nuée de jaunâtre.

⁵ Gualt. tab. 89. litt. H.

784. Douze Cames par pendans; sçavoir; dix de la Méditerranée, dont deux à stries longitudinales & transversales très-fines, marbrées & rayonnées de brun & de gris de lin, sur un fond blanc ⁵; deux peu différentes pour les couleurs, mais à simples stries circulaires applaties comme dans le *Cedo nulli*; deux gris de lin,

rayonnées de blanc ; à stries circulaires très-
 fines ; deux à stries semblables , ornées d'un des-
 sein canelle en rézeau ; deux autres à robe par-
 tie blanche , chargée de traits fauves en zig-zag
 très-déliés , & partie marbrée par grandes taches
 de gris de lin , toutes à charniere formée de trois
 dents dans l'une & l'autre valve ; & deux *Ca-*
mes violettes polies de l'espèce de celles de l'ar-
 ticle précédent.

III. FAM.
 CAMES

785. Deux grandes Cames des côtes de Bré-
 tagne , rayonnées de blanc & de fauve de di-
 verses nuances , à coque mince , & à charniere
 composée dans l'une des valves d'un chevron
 sous le sommet , & de deux lames latérales qui
 se logent sous un chevron semblable , & entre
 quatre lames correspondantes de l'autre valve.

786. Douze Cames des mêmes parages ,
 grandes & de moyenne grandeur ; sçavoir , une
 blanche à une large zone verte près des bords ,
 & une petite de même couleur sur les bords
 mêmes ; une blanche à trois zones fauci , & à
 stries circulaires inégales ; deux blanc sale à fas-
 cies circulaires inégales & peu prononcées ; deux
 nuées de fauve & de gris ; une blanche rayonnée
 de fauve , à tête & intérieur nué de violet * ; une
 blanche à zones fauves peu prononcées ; deux
 entièrement blanches , & deux de la variété de
 celles de l'article précédent , dont une blanche

* List. tab.
 387. f. 230.

~~en entier~~ en entier, toutes à charniere à peu près semblable à celle qui est décrite dans le même article.

III. FAM.
CAMES.

GENRE QUATRIEME.

CAMES A BASES OVALES IRRÉGULIERES.

787. **U**NE grande Came des Indès, à stries transversales fines & applaties, ornées d'un dessein de traits en zig-zag violet-noir, qui se croisent diversement l'un l'autre, & forment plusieurs lozanges sur un fond blanc, à charniere composée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, espèce que l'on nomme en France *Ecriture Arabique* ou *Chinoise**, & en Hollande la *Natte de jonc*.

* Arg. pl. 21.
lett. A.
List. tab. 402.
fig. 246.
Gualt. tab. 86.
lett. F.
Valenyn. biv.
fig. 13.

788. Une *Ecriture Chinoise* de même grandeur & de même fond, mais peu commune en ce que la marbrure brune y est jettée partie par grandes taches, partie par chevrons, dont quelques-uns se réunissent en zig-zags*.

* Ibid. f. 10.

789. Une autre différente des précédentes, en ce qu'on n'y remarque aucun zig-zag, mais seulement de grandes taches noisette sur un fond paille*.

* Ibid. f. 7.

790. Deux *Ecritures Chinoises* de moyenne

grandeur , l'une tenant à la fois des deux variétés décrites aux articles 787 & 788 ; & l'autre à zig-zags jettés par zones, & à taches par faisceaux de rayons. III. FAM. CAMES.

791. Trois Cames rares : sçavoir, une marron clair de la forme d'une amande revêtue encore de sa coque, à robe en réseau granuleux, sur laquelle on remarque d'espace en espace des stries ou suites longitudinales de grains, plus élevées que les autres, & d'où naissent vers le bas des franges ou plumaceaux de petites feuilles flexibles ; Coquille que l'on peut nommer l'*Amande à cils*, & dont Séba regardoit la pareille qu'il possédoit, comme unique* ; une des Indes, marbrée de jaune, de marron & de brun-noirâtre, à l'exception d'une avance vers la tête, qui est blanche, à stries longitudinales, à bords dentelés, & à charniere formée dans l'une des valves, de deux dents, dont une latérale & très-longue, lesquelles s'engrangent dans une cavité & une rainure correspondante de l'autre valve* ; & une fauve clair à rayons d'une nuance plus obscure, mais peu prononcés, & semblable pour les stries, la forme & la charniere à l'*Ecriture Chinoise**.

* Séba, pl. 98. n°. 13. *Museum Tesei*. tab. 6. f. 19.

* Valent. bival. f. 27.

* Ibid. f. 18.

792. Deux autres, dont une comme la seconde de l'article précédent, mais polie, & d'un grand volume pour son espèce ; & l'autre comme la dernière du même article.

346 COQUILLES BIVALVES

III. FAM.
CAMES.

793. Huit Cames : sçavoir , six petites des parages Magellaniques , rares , & par pendans , dont deux jonquille , deux soufre , & deux olive , toutes de forme oblongue bombée , ressemblante à celle d'une petite fève , & nommées de là *Féverolles* , & deux *Ecritures Chinoises* de moyenne grandeur , l'une de la variété de celles de l'article 787 , & l'autre de la variété de la seconde de l'article 790.

794. Quatre Cames des Indes : sçavoir , une rare , blanche papyracée , à stries transversales très-fines & inégales , à grosse côte en forme de pli à l'un des côtés de chaque valve , mieux marquée dans l'une que dans l'autre , & à un second pli moins sensible dans l'autre côté , ce qui donne à la Coquille une forme un peu tortueuse * ; deux blanches à tête couleur de rose vif , & rayons de même couleur peu prononcés , à robe en rezeau fin , granuleux imitant le chagrin , à un large pli dans l'un des côtés de chaque valve , & à charnière formée de trois petites dents , dont une latérale , espèce nommée la *Chagrinée* ou le *Chagrin* , & par Rumphius la *Langue de chat* * ; & une blanche de même forme aussi rayonnée , mais à stries circulaires inégales & très-fines , & nullement granuleuses * , nommée simplement la *Langue*.

* List. tab.
406. f. 252.

* Rumph. tab.
45. litt. G.
Qual. tab 76.
litt. B.

* Rumph.
tab. 45. litt. I.

795. Quatre Cames par pendans : sçavoir , deux des parages Magellaniques , peu commu-

nes, blanc mat, à stries circulaires serrées, ~~minces & tranchantes, à coque épaisse, & à~~ III. FAM.
charniere formée de trois dents dans une des CAMER.
valves, & de deux dans l'autre; & deux *Languas*
différentes des dernières de l'article précédent,
en ce qu'elles sont papyracées & entièrement
blanches.

QUATRIEME FAMILLE.

C Œ U R S.

 IV. FAM.
CŒURS.

CES Coquilles ne diffèrent des Cammes qu'en ce que leurs deux faces latérales, ou tout au moins l'une de ces faces, représentent assez exactement la figure d'un Cœur. Nous les diviserons en trois genres ; sçavoir,

1°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, des cœurs bien formés, & dont les sommets sont fort près l'un de l'autre : on les peut nommer *Cœurs proprement dits*.

2°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, la forme de cœurs, & dont les sommets, fort écartés l'un de l'autre, laissent entr'eux un espace rhombe ou lozange nommé *Carenne* ; genre qui comprend les *Arches*.

3°. Celles dont une seule des faces latérales représente bien un cœur, lorsque la Coquille est fermée, & que l'on distingue par les noms de *Cames tronquées* ou de *Conques de Vénus*.

VI. FAM.
CŒURS.

GENRE PREMIER.

CŒURS PROPREMENT DITS.

796. **U**N Cœur des Indes, blanc & papyracé, à valves pliées chacune en demi-cœur aplati, renflées vers le milieu, & montrant par leur réunion un cœur de forme très-élégante, garni de petites pointes dans tout son contour, à stries longitudinales granuleuses, courbées sur chaque face, à sommet se croisant un peu, & à charnière composée dans l'une & l'autre valve, de trois petites dents, espèce nommée *Cœur de Vénus* *.

797. Un très-grand *Cœur de Vénus*, blanc nué d'incarnat, ayant un côté de ses faces concave, à une petite élévation près sous les sommets, qui se croisent encore plus que dans le précédent, & à contour dépourvu de piquans, variété qu'on désigne par le nom de *Cœur de Vénus en bateau* *.

* Arg. pl. 131
lett. I.
Rumph. tab.
43. litt. E.
Litt. tab. 3184
f. 155.
Gualt. tab. 84
lett. B. C. D.

* Arg. pl. 131
lett. D.



IV. FAM.
Cœurs.

798. Un *Cœur de Vénus* rare en ce que l'une de ses faces est ornée de petites fascies blanches & couleur de rose, suivant la direction des stries; le contour de ses valves est sans pointes comme dans le précédent.

799. Un *Cœur de Vénus en bateau*, d'un beau couleur de rose, à la sommité près de la partie convexe qui est blanche.

800. Un *Cœur de Vénus* peu commun, ponctué dans la face convexe de couleur de rose, & bordé dans l'autre de petits traits de même couleur, à deux échancrures vers le bas, & à côtes destituées de piquans.

801. Un *Cœur de Vénus en bateau*, dont le centre de la face concave est beaucoup plus élevé que dans les précédens, moucheté d'un côté & rayé de l'autre de gros traits onduleux fauve-jaune, & légèrement dentelé dans son contour.

802. Trois *Cœurs de Vénus*: sçavoir, deux de moyenne grandeur, dont un blanc, à côtes chargées de pointes, un couleur de rose, à côtes dépourvues de pointes, mais garnies l'une & l'autre de deux petites échancrures parallèles; & un *Cœur en bateau* blanc.

803. Un *Cœur du Sénégal*, grand, mince, & de forme presque sphérique, blanc tant au dedans qu'au dehors, excepté sept à huit larges cannelures qui sont canelle foncé, à côtes for-

mées chacune de trois stries , dont celle du milieu est mince , élevée en vive arrête , & creusée intérieurement en forme de tuyau , à bords dentelés , laissant entr'eux un jour assez grand quand la Coquille est fermée , & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux dents sous les sommets , & d'une très-grande latérale. Cette Coquille , nommée *Conque exotique* , est très-rare à trouver complète comme celle-ci , dont les deux valves ont certainement appartenu au même Coquillage : c'est le *Kaman* de M. Adanson *.

IV. Fam.
Cœurs.

804. Une autre *Conque exotique* plus grande , & à valves bien assorties quoique dépareillées.

* Adanson
pl. 18. f. 2.
Arg. pl. 234
lett. A.
Rumph. tab.
48. n°. 6.
Gualt. tab. 798
lett. D.

805. Un très-grand Cœur de la baie de Cam-pêche , peu commun , blanc sale , taché de rouge pâle en dehors , & de pourpre en dedans , à stries longitudinales bien prononcées , chargées en quelques endroits d'anneaux minces , à charniere formée dans l'une des valves de trois dents s'engrainant dans trois cavités de l'autre valve , & à faces latérales représentant des cœurs inégaux ; le plus grand des deux est teint de rougeâtre , & le mieux formé *.

806. Un Cœur de l'espèce du précédent , mais un peu moins grand , & dont le fond est jaune pâle.

* Lill. tab.
328. fig. 1651

807. Un Cœur rare de Carthagene d'Amérique , fauve , excepté vers les bords qui sont

IV. FAM. CŒURS. blancs, à grosses stries longitudinales comme ficelées, de forme allongée d'un côté, & à charniere comme celle de la seconde Coquille

* Séba, pl. de l'article 791 *.
86. n°. 7.

808. Un grand Cœur des mêmes parages, peu commun, blanc teint en quelques endroits de pourpre, de forme un peu oblongue de la tête aux bords, à stries arrondies chargées d'anneaux minces & peu saillans, bordé de pourpre en dedans, & à charniere composée dans l'une

* Ibid. n°. 2. & l'autre valve, de quatre dents *.

809. Trois Cœurs, dont un qui ne diffère du précédent, qu'en ce qu'il est marbré en dehors de blanc & d'orangé, bordé en dedans de ci-

* List. tab. 322. f. 159. tron, & de forme encore plus oblongue *; & deux de S. Domingue, jaune pâle, nués de couleur de rose & de blanc, à stries longi-

* Ibid. tab. 326. f. 163. nales hérissées de petites pointes *.

810. Trois autres, dont un de Carthagene, à trois zones amaranthe clair, la dernière formant une bordure qui s'étend en dedans, & y devient plus foncée, & à valves un peu béantes des deux côtés *; un de l'espèce du premier de l'article précédent, mais plus petit; & un comme les derniers du même article.

* Séba, pl. 86. n°. 6.

811. Deux Cœurs de la Jamaïque, blancs teints de fauve, & tachés en quelques endroits de pourpre clair en dehors, & de rouge pâle en dedans, à stries longitudinales, chargées dans

dans toute leur étendue & à distances égales, ~~de petites~~
de petites tuiles, à charniere comme les pré-
cédens, & nommés *Cœurs de bœuf tuilés*,
tous deux de la plus parfaite conservation *.

IV. FAM.
CŒURS.

* Arg. pl. 236
lett. M.
List. tab. 3231
f. 166.

812. Deux Cœurs de la Jamaïque, blancs, à
grosses stries chargées d'anneaux cerise, finissant
par de profondes dentelures, à côtés inégaux,
dont le plus allongé représente le mieux un
cœur, & grands dans leur espèce nommée la
Fraize *.

* List. tab.

813. Six cœurs par pendans : sçavoir, deux
Fraizes à stries plus fines, chargées d'anneaux
jonquille très-ferrés, excepté vers les sommets
qui sont blancs & dépourvus d'anneaux, nom-
mées *Fraizes blanches* *; deux petits blancs des
Indes, à stries ficelées & cannelures piquetées,
à valves composées de trois faces; dont une ap-
platie, & nommés *Cœurs triangulaires* ou
Cœurs en soufflet *; & deux d'Amérique, blancs
marbrés l'un de fauve, l'autre de jaune & de
rouge-brun, à stries longitudinales bien pro-
noncées, de forme plus courte & plus bom-
bée, mais d'ailleurs assez ressemblante à celle
des précédens, nommés en France *Cœur de*
pigeon, & en Amérique *Cœur de l'homme* *.

316. fig. 153.
Gual. tab. 83.
lett. A.
Bonan. cl. 3.
f. 375.

* List. tab.
315. f. 152.

* Gualt. tab.
38. lit. C.
Rumph. tab.
44. lit. H.

* Bonan. cl.
2. f. 94.

814. Quatre autres par pendans; dont deux
Cœurs triangulaires, grands dans leur espèce,
& deux Cœurs de S. Domingue, blancs nus

354 COQUILLES BIVALVES

 d'aurore & de jonquille, de l'espèce des der-

IV. FAM. niers de l'article 809.

CŒURS.

815. Six Cœurs des Indes, peu communs :
 savoir, un oblong de la tête aux bords,
 blanc, à grosses stries longitudinales ornées de
 petits chevrons bruns, à une avance latérale
 près des sommets, & à charnière comme celle
 de la seconde Coquille de l'article 791, espèce
 nommée le *Cœur allongé* * ; un fauve-roux de
 forme encore plus allongée, à grosses stries
 longitudinales un peu tuilées *, un de même
 espèce partie blanc & partie gris * ; un petit
 blanc à stries fines longitudinales & rides ondu-
 leuses feuilletées transversales * ; un blanc mar-
 bré de fauve-roux, de forme moins sinueuse &
 moins allongée que les précédens, à grosses
 stries longitudinales, chargées d'autres trans-
 versales en forme d'anneaux, & à charnière
 comme les quatre premiers de cet article * ; &
 un petit Cœur souti, à stries fines longitudina-
 les, & à charnière formée de trois dents dans
 l'une des valves, qui s'engrangent dans trois ca-
 vités correspondantes.

816. Deux grands Cœurs de la Méditerranée, fauves à la tête, marron foncé dans le reste, à larges fascies circulaires peu prononcées, à sommets, contre l'ordinaire des Coquilles de ce genre, écartés, recourbés en sens

* List. tab.

347. f. 184.

* Ibid. f. 185.

* Gualt. tab.

90. litt. F.

* Ibid. litt.

eadem.

* List. tab.

348. f. 186.

* Valentyn. bi-

val. f. 30.

contraire l'un à l'autre, & bleus en cet endroit, à charniere formée dans les deux valves, de trois larges dents, dont une latérale, espèce nommée en France *Boucarde* ou *Cœur de bœuf*, & en Hollande *Bonnet de fou* *.

IV. FAM.
CŒURS.

* Seba, pl.

86. n°. 1.

Gual. tab. 71.

litt. E.

Litt. tab. 275.

f. 111.

817. Deux grands Cœurs de la même mer : sçavoir, un fauve nué de blanc & de bleu pâle, de forme très-bombée, à grosses stries longitudinales hérissées de pointes plus ou moins longues, à charniere composée de cinq dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre, & nommé *Cœur de bœuf épineux* *; & l'autre fauve-roux, à stries moins grosses, plus serrées & plus chargées de pointes que le précédent, espèce nommée simplement *Cœur épineux* *.

* Arg. pl. 23.

lett B.

Séba, pl. 86.

n°. 4.

Gual. tab. 72.

litt. A.

* Séba, pl.

86. n°. 3.

818. Les mêmes Coquilles un peu moins grandes.

819. Six grands Cœurs de la Méditerranée : sçavoir, deux blancs, à grosses stries & larges cannelures longitudinales, à stries transversales onduleuses très-fines en forme de rides, dans l'un desquels les grosses stries sont chargées surtout vers le bas, de quelques tuiles ou mamme-lons *; deux qui n'en diffèrent qu'en ce qu'ils sont rayés par zones inégales de blanc, de fauve & de rouge-brun, & sans tuiles *, tous à char-niere comme les précédens; un *Cœur de bœuf épineux*, & un *Bonnet de fou*.

* Bonan. cl.

2. f. 97.

* Séba, pl.

86. n°. 7.

Bonan. cl. 2.

f. 100.

Gual. tab. 71.

litt. M.

820. Huit Cœurs de moyenne grandeur,

356 COQUILLES BIVALVES

des espèces décrites dans les articles 809, 816,
 IV. FAM. 817 & 819.

CŒURS.

821. Deux Cœurs d'Amérique, blancs, à stries longitudinales herissées de très-longues épines creusées en tuyaux, à cannelures chargées de petits grains, ainsi que la face, qui représente le mieux un cœur, au milieu de laquelle est un léger sillon; à charniere comme celle des Huitres feuilletées, & nommés *Marrons épineux*, à l'un desquels adhère un autre Cœur de l'espèce des *Vieilles ridées*, de la quatrième variété décrite article 843.

822. *Idem.*

 GENRE SECOND.

A R C H E S.

823. **D**EUX petits Cœurs des Indes , à carenne étroite , rares & en pendant , de la forme d'une amande dépouillée de sa coque , à robe en rezeau granuleux très-fin , l'un brun-noirâtre , l'autre fauve-roux , à l'exception de deux petites bandes longitudinales blanches , qui dans l'un & l'autre s'étendent des sommets aux bords des deux valves , & nommés en Hollande *Amande rotie* : leur charniere , ainsi que dans toutes les Coquilles de ce genre , est presque égale à la largeur des battans , & composée d'une suite nombreuse de petites dents dans l'une & l'autre valve.

 IV. FAM.
CŒURS.

824. Un Cœur des Indes , très-rare , canelle dans le corps , blanc vers les bords , & teint de violet en dedans , à carenne fort oblongue , à valves applaties vers l'une des faces latérales , qui représente un cœur des mieux formés , à stries fines longitudinales accouplées , traversées d'autres encore plus fines & plus serrées , & à larges avances ou appendices intérieurs en forme d'oreilles : cette Coquille provient de la

358 COQUILLES BIVALVES.

~~vente de la~~ vente de M. l'Abbé de Fleury qui la
 IV. FAM. nommoit *Coqueluchon de Moine*: elle porte près
 CŒURS. de quatre pouces sur trois.

825. Un autre *Coqueluchon de Moine* moins grand, & de couleurs plus foncées que le précédent.

826. Un Cœur de la Jamaïque, peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales, larges & applaties, à carène large, à coque épaisse & pesante, à bords intérieurs profondément découpés, & à dents de la charnière lamelleuses, plus grandes que dans toutes les Co-

* List. tab. quilles de ce genre *.

238. f. 72.

Gualt. tab. 87.

lit. D.

827. Trois Cœurs: sçavoir, un peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales chargées par zones de petits tubercules, à carène oblongue, & grand dans son espèce, nommée par

* Arg. pl. 23.

lett. C.

Gualt. tab. 87.

lett. E.

M. d'Argenville la *Corbeille* *; & deux d'Amérique, blanc sale, à stries longitudinales chargées de petits anneaux, à carène lozange,

* Arg. App.

pl. 3. lett. H.

List. tab. 240.

fig. 75.

large dans l'un *, étroite dans l'autre: celui-ci a les valves un peu inégales dans le bas.

828. Cinq Cœurs: sçavoir, deux d'Amérique, blancs, à stries longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, d'autres très-fines transversales, & à carène peu large & fort al-

* Ibid. tab.

230.

Gualt. tab. 87.

lett. B.

longée *; un comme le premier de l'article précédent, & deux comme les autres du même

Rumph. tab. article.

44. litt. I.

829. Trois Cœurs : sçavoir, deux grands en pendant, à chevrons alternatifs blancs & fauve-roux ; à stries longitudinales un peu rabotteuses, à valves béantes vers le bas, à carenne large & fort allongée d'un côté, ainsi que la forme de la Coquille, nommée *Arche de Noé*, à cause de sa ressemblance avec un navire * ; & un semblable au premier de l'article 827.

IV. FAM.
CŒURS.

* Arg. pl. 23.
lett. G.

Rumph. tab.

44. litt. P.

830. Cinq Cœurs : sçavoir, deux de l'espèce des premiers de l'article 828, mais beaucoup plus grands ; & deux grandes *Arches de Noé*, sur la carenne de l'une desquelles adhère une autre petite Arche de même espèce.

831. Neuf *Arches de Noé*, dont quatre à-peu-près semblables à celles de l'article 829, mais moins grandes, & de couleurs plus vives * ; une qui n'en diffère que par sa forme moins allongée, & par sa carenne qui est très-large * ; une blanc-fauve, & une brune, qui ont ceci de particulier, que leurs carnes latérales sont chargées de petites feuilles, que la carenne en est marron foncé, & leur robe réticulée * ; & deux blanches papyracées, à robe réticulée, à carenne étroite & creuse ; l'une de forme large & aplatie, bordée de *Drap marin*, & l'autre de la forme ordinaire.

* Gualt. tab.

87. litt. H.

* Ibid. lit. F.

* Ibid. lit. G.

832. Treize *Arches de Noé* de différentes grandeurs, & des variétés de l'article précédent.

 GENRE TROISIEME.

 CAMES TRONQUÉES ET CONQUES
DE VÉNUS.

 IV. FAM.
CŒURS.

833. **U**N Cœur des Indes, peu commun, blanc & lisse, à coque mince, à valves de forme ovale, aplaties vers l'un des côtés, où elles représentent une espèce de cœur fort allongé, dont le contour est relevé d'un pli en vive arrête, à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, dont deux latérales, s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve, & connu sous le nom de *Came coupée* *.

 * Gualt. tab.
85. litt. F.

834. Une rare & très-grande *Came coupée*, différente de la précédente en ce qu'elle est à coque épaisse, de forme plus bombée, que le contour du cœur qu'elle représente n'est point en vive arrête, & que les dents de la charniere en sont plus grosses & moins allongées.

835. Une *Came coupée* très-rare, blanche & polie, nuée par zones & par traits longitudinaux de violet, à retour des valves en forme de cœur, chargé de stries fines longitudinales

ondées partant d'un sillon ovale, & représentant une chevelure flottante, à charniere formée dans l'une des valves, d'une seule dent, & de deux cavités recevant les deux dents de l'autre valve, à bords dentelés, & nommée par cette raison en Hollande la *Scie* *.

IV. FAM.
CŒURS.

* Séba, pl.
86. n°. 11.

836. Deux *Cames coupées* des Indes orientales, peu communes, blanches teintes de violet tant en dedans qu'en dehors, à robe finement reticulées, à aplatissement des valves en forme de cœur bordé vers le bas de petites feuilles tuilées, à stries transversales lamelleuses, en vive arrête près des bords, & à charniere composée dans l'une des valves, de quatre dents, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes. On nomme cette espèce la *Came coupée en bec de flûte* *.

* Arg. pl. 21.

837. Quatorze petites *Cames coupées* des Indes, & par pendans : sçavoir, six blanches, trois en entier, & les trois autres nuées de violet, toutes à stries fines longitudinales, à bords dentelés, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de quatre dents * ; quatre de forme semblable, dont deux canelle & deux citron ; deux rayonnées de blanc & de canelle foncé, lisses dans le corps, à stries fines, granuleuses sur la face tronquée, de forme plus aplatie que les précédentes, à charniere composée dans chaque valve, de trois petites dents, & nom-

lett. L.
List. tab. 377.
f. 220.
Rumph. tab.
43. litt. F.

* List. tab.
375. f. 216. &
tab. 376. fig.
219.
Gualt. tab. 89.
litt. D.

362 COQUILLES BIVALVES

 mées *Radiées* * ; & deux *Cames en bec de flûte*.

IV. FAM. 838. Quatorze *Cames coupées* ; sçavoir ,
 CŒURS. deux d'Amérique, blanches, revêtues de leur
 * Gualt. tab. épiderme verd de terrasse, nuées de violet en
 88. litt. O. dedans, à stries circulaires fines & peu pro-
 Arg. pl. 22. noncées, & à charniere comme celle de l'arti-
 Lett. L. cle 835 ; deux de même espèce, mais polies,
 Bonan. cl. 2. & dont la robe est devenue par-là d'un beau
 n°. 47. violet vers la tête, & blanche vers les bords ;
 * Séba, pl. deux petites *Scies* polies * ; quatre *Radiées*,
 86. n°. 10. rayonnées l'une de souci, l'autre de violet, &
 les deux autres de canelle ; & quatre sembla-
 bles aux premières de l'article précédent, dont
 deux nuées de rose pâle.

839. Huit *Conques de Vénus* : sçavoir, une
 d'Amérique, lilas nué de blanc, à stries cir-
 culaires faillantes en vive arrête, terminées dans
 tout le contour de la face qui représente le
 Cœur, par un rang de longues pointes, & un
 demi-rang intérieur de pointes plus petites, au
 centre desquelles, qui est un peu renflé, se trouve
 une tache ovale violet plus foncé, & à charniere
 formée dans l'une & l'autre valve, de trois
 dents, espèce nommée *Concha Veneris à poin-*
tes * ; un *Concha Veneris* semblable, mais dé-
 pouillé de ses stries & de ses pointes, poli, &
 devenu par-là blanc, à l'exception de la tache
 ovale & des endroits où se trouvoient les stries,
 qui sont restés violet ; un *Concha Veneris sans*

* Arg. pl.
 27. litt. I.
 Gualt. tab. 76.
 Lett. D.
 Rumph. tab.
 48. n°. 4.

pointes , blanc , à stries circulaires moins sail-
lantes , à renflement latéral rouge-brun dans
le milieu , nommé en Amérique la *Créole* ; une
Créole d'une autre variété , lilas nué de blanc ,
& de forme moins bombée que la précédente ;
deux *Conques de Vénus* des Indes , & d'une au-
tre variété peu commune , petites , à robe en
réseau granuleux , blanche tachée de gris , &
desquelles le renflement latéral est bordé de pe-
tites tuiles au lieu de pointes ; & deux autres
aussi des Indes , lisses , blanches , à renflement
latéral marron , & nommées *Gourgandines* *.

IV. FAM.
CŒURS.

* Arg. pl.
21. lett. P.

840. Sept *Conques de Vénus* : sçavoir , deux
Concha Veneris à pointes ; un dépouillé ; une
Créole de la première variété de l'article précé-
dent ; deux *Gourgandines* canelle nué vers les
bords de blanc , & à renflement latéral marron
nué de bleu ; & un petit *Concha Veneris* à ré-
seau qui ne diffère des quatrième & cinquième
de l'article précédent , qu'en ce que la marbrure
n'y est jetée que sur les bords , & par trois
grandes taches seulement.

841. Dix *Conques de Vénus* : sçavoir , deux
Gourgandines l'une souci , l'autre blanche teinte
de fauve ; une qui ne diffère des précédentes que
par sa forme plus bombée , par un enfoncement
dans le milieu de sa face oblongue latérale ; &
par ses taches fauves disposées par zones & par
rayons sur un fond blanc , espèce que l'on pour-

364 COQUILLES BIVALVES

IV. FAM. CŒURS. roit nommer *fausse Gourgandine* ; deux autres applaties des deux côtés du sommet , l'une blanche tachée de fauve , l'autre fauve tachée de blanc ; & cinq petites des Indes , dont une blanche , à quelques traits pourpre , une canelle foncé , & trois blanches marbrées de violet , de verd & de bleu , toutes à stries circulaires , & à enfoncement latéral sur lequel s'étendent aussi les stries.

842. Quatre *Conques de Vénus* : sçavoir , deux *Gourgandines* couleur de chair , à renflement latéral fauve , à coque plus épaisse , & de forme beaucoup plus bombée que les précédentes , variété qui n'est pas commune , & deux de l'espèce des quatrieme & cinquieme de l'article précédent.

843. Onze *Conques de Vénus* d'Amérique : sçavoir , une marbrée de blanc , de fauve & de marron , à stries circulaires grosses & arrondies en bourrelet , excepté vers l'enfoncement latéral , où elles sont minces & saillantes en forme de petites feuilles , espèce nommée *Vieille ridée** ; une *Vieille ridée* peu commune , blanche , à deux rayons rose sèche , à stries circulaires minces , recourbées en forme de feuilles , & découpées le long des bords de l'enfoncement latéral qui est fauve-roux* ; deux blanches , à stries fines circulaires en vive arrête , mais peu élevées & fort écartées les unes des autres , à

* Arg. pl. 21.
lett. B.
Gualt. tab. 85.
lett. A.
Rumph. tab.
48 n°. 5.
Litt. tab. 279.
f. 116.

* Gualt. tab.
88. litt. D.

enfoncement latéral plus profond que dans les précédentes, & nommées *Levantine de la petite espèce* ; deux autres blanches rayonnées de traits & bandes interrompues marron clair & canelle, à stries fines longitudinales, & à stries circulaires en vive arrête, encore plus distantes les unes des autres que dans les précédentes * ; deux grises, à trois rayons blancs sur chaque valve, à stries transversales serrées, arrondies & bifourchues ; deux autres, qui n'en diffèrent qu'en ce que les rayons y sont moins sensibles *, & un *Concha Veneris* à pointes.

IV. FAM.
CŒURS.

* List. tab.
378. f. 115.

* Ibid. tab.
400. f. 243.

844. Une *Conque de Venus orientale* très-rare, gris-verdâtre dans le corps, de forme un peu aplatie, à coque très-épaisse, à stries circulaires en forme de feuilles tranchantes, nombreuses vers le bas, fort distantes vers le haut, & à enfoncement latéral très-profond fauve-roux : cette Coquille nommée *magna Voluta* ou *Levantine de la grande espèce* *, porte trois pouces deux lignes sur deux pouces huit lignes, grandeur très-considérable dans cette espèce.

* Arg. pl.
21. lett. K.
Rumph. tab.
47. n°. 1.
Valenc. bry.
fig. 11.

845. Un Cœur des Indes, blanc, à côtes & grosses stries longitudinales, les premières tachées par intervalles, de pourpre, & chargées de tuiles peu saillantes, à bords très-profondément dentelés, à face représentant le Cœur, concave vers le sommet, & à charnière com-

IV. FAM. CŒURS. posée dans l'une des valves, d'une très-grosse dent, & de deux filets longitudinaux, se logeant dans la cavité & les rainures de l'autre valve, de l'espèce nommée *Chou* ou *Feuille de*

* Arg. pl. 23. *chou*, & grand dans cette espèce *.

lett. H.

Litt. tab. 350.

f. 188.

Gualt. tab. 93.

lett. A.

Rumph. tab.

43. litt. C.

846. Deux *Feuilles de chou* de moyenne grandeur, en pendant, & très-vives en couleur.

847. Un grand Cœur des Indes, peu commun, à stries longitudinales & transversales fines, mais rabotteuses, formant un réseau assez grossier, à six grosses côtes chargées à distances égales de tuiles minces presque droites, & de plus en plus grandes, à mesure qu'elles s'approchent des bords, à face représentant le Cœur, aplatie & ouverte dans le milieu, & charnière formée dans l'une des valves, de trois dents, & de deux dans l'autre; espèce nommée *Faitière*

* Arg. pl. ou *Tuilée* *, & de la plus parfaite conservation.

23. lett. E.

Rumph. tab.

43. litt. A.

Gualt. tab. 93.

lett. B.

848. Une *Tuilée* semblable à la précédente, à cela près que la couleur en tire un peu sur le citron.

849. Une autre *Tuilée*, nuée de couleur de rose, & un peu moins grande que les précédentes.

850. Une autre, blanche vers la tête, couleur de rose vif dans le reste, à feuilles naissantes seulement, de forme plus aplatie, & d'une

variété moins commune encore que les précédentes *.

851. Une de forme plus étroite, plus oblongue & plus bombée que les précédentes, à tuiles nombreuses partie peu élevées, & partie couchées les unes sur les autres, & à face représentant le Cœur, laissant une grande ouverture ovale dans le milieu, dont les bords sont dentelés en dedans vers le haut, & retroussés en forme de lèvres vers le bas.

852. Une autre blanche teinte de couleur de rose & d'aurore, bordée en dedans de cette dernière couleur, à neuf côtes qui ne sont chargées que de tuiles naissantes, couchées les unes sur les autres, de forme large & bombée, & à grande ouverture latérale, semblable à celle de la précédente *.

853. Une très-grande Tuilée d'un pied sept pouces de long sur un pied de large, à six grosses côtes réticulées, où les tuiles paroissent à peine vers le bas, à intervalles des côtes fort profonds, blanc sale & raboteuse en dehors, d'un beau blanc en dedans, & conservant encore une partie de son nerf, dont on taille les prétendues pierres jouant l'opale, nommées vulgairement *Pierres à queue de paon*. Cette Coquille est connue sous le nom de *Bénitier*,

IV. FAM.

CŒURS.

* Gualt. tab.

92. litt. G.

* Ibid. lit. A.

Rumph. tab.

43. litt. B.

Litt. tab. 353.

f. 190.

368 COQUILLES BIVALVES

**IV. FAM.
CŒURS.**

depuis qu'on a employé en effet pour Bénitiers ; dans l'Eglise de Saint Sulpice de Paris ; les deux valves d'une semblable , dont la République de Venise avoit autrefois fait présent à François Premier.



CINQUIEME

CINQUIEME FAMILLE.

TELLINES.

CES Coquilles différent de celles des deux familles précédentes, qui, à proprement parler, n'en font qu'une, par une forme oblongue, & en ce que le sommet des valves ou la charniere sont toujours plus ou moins éloignés du milieu de leur longueur. On peut les diviser en trois genres ; sçavoir,

V. FAM.
 TELLINES.

1°. Les *Tellines exactement fermées* ou *béantes seulement à l'une des extrémités* ; leur forme est oblongue, assez plate, plus large d'un côté que de l'autre, & la charniere, ainsi que la tête, en sont placées près du milieu.

2°. Les *Tellines béantes aux deux extrémités* ; leur forme est très oblongue, également large, mais peu bombée dans toute leur longueur ; la charniere en est plus éloignée du milieu :

V. FAM.
TELLINES.

3°. Les *Manches de couteau*, ou *Tellines improprement dites*, dont la forme est extrêmement longue, également large & bombée dans toute leur longueur; elles sont béantes aux deux bouts, dans l'un desquels est située la charnière.

GENRE PREMIER.

TELLINES EXACTEMENT FERMÉES, OU
BÉANTES SEULEMENT A L'UNE DES
EXTRÉMITÉS.

854. **U**NE Telline des Indes, peu commune, blanche nuée de fauve, recouverte de suites de chevrons gris de lin peu prononcés, à quatre rayons de taches rouge brun, à stries transversales fines & applaties, & à charnière formée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nommée *Aîle de papillon*, & grande dans son espèce*.

* Arg. App.
pl. 3. lett. D.

855. Quatre Tellines des Indes, peu communes; sçavoir, une lisse ventre de biche, ornée dans toute sa robe de traits fins en chevrons se croisant diversement, canelle dans le haut, violet clair dans le bas* ; deux de même espèce, mais

* Liff. tab.
396. f. 339.

plus petites & à stries transversales très-fines * ;

& une Aile de papillon.

V. FAM.

856. Une Telline de la Chine, rare, à zones alternatives inégales blanches & couleur de rose en dehors, couleur de rose très-vif en dedans, où l'on remarque un surcroît d'épaisseur dans le milieu, & à charnière formée dans l'une & l'autre valve de deux dents *. Cette Coquille, ainsi que toutes celles de ce genre qui suivront, ont, vers le côté le plus étroit, un pli ou sinuosité dans les deux valves, qui les rend béantes en cet endroit.

TELLINAE.
* Gualt. tab.
86. litt. H.

* Ibid. litt.
D.
Litt. tab. 390.
f. 233.


857. Quatre Tellines de même forme que la précédente ; savoir, deux des côtes de Bretagne, blanches nuées vers la tête de ventre de biche, aurore clair en dedans ; & deux des Indes entièrement blanches.

858. Quatre Tellines des Indes par pendans ; savoir, deux blanches teintes de jonquille, à rayons couleur de rose, interrompus par quelques zones de nuances plus foibles, à stries fines transversales, & nommées *Tellines radiées* * ; & deux blanches à extrémité des sommets cerise, & dont la sinuosité latérale est moins prononcée que dans les précédentes.

* Rumph.
tab. 49. litt. H.

859. Quatre Tellines par pendans ; savoir, deux d'Amérique, blanches teintes en partie de couleur de chair, à tête cerise, à zone un peu creuse, située vers le milieu, & à sinuosité latérale

372 COQUILLES BIVALVES

 presqu'insensible * ; & deux *Radiées*, l'une à rayons jonquille & orangé, l'autre à rayons couleur de chair foncé & lilas clair, toutes deux grandes dans leur espèce.

V. FAM.

TELLINES.

* List. tab.

393. fig. 236.

860. Une Telline des Indes peu commune, couleur d'or en dehors, nuée de cette couleur & de violet en dedans, à valves composées de deux faces très-inégales entr'elles, formant un angle très-obtus : la plus petite de ces faces est granuleuse & bordée du côté de la tête de quelques dents triangulaires : on nomme cette espèce en Hollande *Telline-feuille*, & en France

* Arg. pl. *Langue d'or* *.

22. lett. E.

Rumph. tab.

45. litt. K.

861. *Idem*, à cela près que le violet y domine davantage.

862. Une *Langue d'or* plus grande que les précédentes, jaune-verdâtre en dehors, violet clair en dedans.

863. Deux grandes & belles Tellines d'Amérique, lisses & d'un grand éclat, l'une rayonnée & nuée par zones de blanc, de citron clair, de couleur de rose & de lilas, l'autre blanche à deux zones citron clair, toutes deux à bords un peu sinueux & à charnière comme

* Arg. pl. les précédentes *.

22. lett. A.

List. tab. 397.

f. 240.

Gualt. tab. 89.

lett. L.

864. *Idem*, à quelque légère différence près dans les nuances.

865. *Idem*.

866. *Idem*.

867. Quatre Tellines ; sçavoir, une des Indes, peu commune, d'un beau violet tant en dedans qu'en dehors, & à charniere formée d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre ; deux en pendant, dont une cramoisi teinte dans une large zône de verd, & une couleur de rose, nuée dans une large zône de blanc, toutes deux de l'espèce nommée *Griblette* ; & une semblable aux dernieres des quatre articles précédens, à cela près que l'on remarque quelques petites zônes couleur de rose vers le haut, & que l'intérieur de chaque valve est couleur d'or.

V. FAM.
TELLINES.

868 Sept Tellines des Indes de diverses grandeurs ; sçavoir, une blanche nuée en quelques endroits de citron, à tête ponceau, & à extrémité latérale doublement sinueuse, formant en cet endroit une espèce de bec allongé, nommée de-là *Pince de Chirurgien* * ; deux de même espèce, citron clair ; deux autres couleur de rose, à un rayon jonquille pâle sur l'une des valves, & à stries transversales très-fines ; une totalement blanche, & une Telline blanche peu commune, bombée vers la tête & d'un côté seulement, & à bords tronqués vers le côté sinueux & applati *.

* Gualt. tab.
82. litt. T.
Arg. pl. 22.
lett. O.
Rumph. tab.
45. litt. L.
List tab. 394.
f. 237.

869. Dix-huit Tellines de moyenne grandeur & petites ; sçavoir, deux d'Amérique, lisses, nuées par zônes, & rayonnées de violet


* Gualt. tab.
89. litt. B.

374 COQUILLES BIVALVES.

V. FAM.
TELLINES.
* Arg. pl.
22. lett. I.

4 List. tab.
125. f. 238.

& de blanc * ; deux à stries fines transversales rayonnées des mêmes couleurs ; deux couleur de rose , à stries fines semblables , nommées *Tellines de la Chine* ; deux blanches , marbrées de traits fins en zig-zag bruns , interrompus par des rayons du fond , teintes en dedans de citron , & à stries transversales fines , mais bien prononcées * ; deux de nos mers , nuées par zones de rouge , de jaune & de blanc ; deux autres de forme plus étroite , rayonnées des mêmes couleurs ; une blanc sale , à stries transversales obliques & fines dans les deux tiers de sa robe , & longitudinales dans l'autre tiers , terminées par des dentelures ; une blanche nuée vers la tête de lilas , à grosses stries longitudinales accouplées , traversées d'autres très-fines , qui ne sont guères sensibles que vers les bords ; deux de l'espèce des premières de l'article 859 ; & deux *Pinces de Chirurgien* .



GENRE SECOND.

TELLINES BÉANTES AUX DEUX EXTRÉMITÉS.

870. **S**EPT Tellines de nos mers ; sçavoir ,
 une grande fauve clair , à fascies inégales raboteuses & peu prononcées , jetées par ondes , à coque épaisse , de forme très-oblongue , & à charniere formée dans l'une des valves d'une grosse dent qui s'emboîte sous une cavité correspondante de l'autre valve * ; une plus petite de même espèce * ; deux blanches teintes de fauve , de forme un peu moins oblongue , & à extrémités moins béantes que la précédente ; une qui n'en diffère que par la forme de la charniere qui , dans l'une des valves , est formée d'un appendice fort saillant , garni de deux dents qui répondent aux cavités de l'autre valve ; & deux de forme plus courte & plus bombée , nommées par Lister *Cames Pholades* ; elles conservent toutes deux leur animal *.


V. FAM.
TELLINES.

* Guah. tab.
90. litt. A.
* Rumph.
tab. 45. lit. N.

* List. tab.
425. f. 269.
* Arg. Zoolomorph. pl. 5. lett. C.

871. Une grande & belle Telline des Indes , rare , d'un beau violet , à deux rayons & quelques nuances de violet moins foncé , & à charniere formée dans les deux valves d'une lame

376 COQUILLES BIVALVES

V. FAM. TELLINES.  plate transversale, terminée par une petite dent dans l'une, & par une cavité correspondante dans l'autre.

872. Deux Tellines des Indes, peu communes, sur-tout de cette grandeur, papyracées, à robe violette, ornée de quatre rayons blancs tant en dehors qu'en dedans, & à charniere formée dans les deux valves d'une côte longitudinale intérieure, terminée par deux petites dents dans l'une, & par deux cavités correspondantes dans l'autre, espèce nommée le So-

* Arg. pl. *leil levant* *.

22. lett. P.

Rumph. tab.

45. litt. E.

List. tab. 422.

f. 226.

Gualt. tab. 91.

litt. B.

* List. tab.

416. f. 260.

Gualt. tab. 91.

litt. C.

Bonan. cl. 2.

fig. 77.

Adanf. pl. 19.

f. 1.

* List. tab.

411. f. 265.

873. Cinq Tellines; sçavoir, deux de la Méditerranée, rose sèche, à deux rayons blancs dans le milieu de la robe, à stries fines obliques un peu onduleuses, & à charniere de l'espèce décrite dans l'article 871 *; deux d'Amérique, blanches, à stries transversales peu prononcées, à valves sinueuses d'un côté, moins béantes que dans l'espèce précédente, & à charniere semblable *; & un grand *Soleil levant*.

874. *Idem*, à peu de différence près dans les couleurs.


875. Trois Tellines blanches des Indes, peu communes; sçavoir, une papyracée transparente comme le talc, bombée sur-tout vers la tête, à stries fines transversales en forme de rides, à une extrémité beaucoup plus béante que l'autre, & à charniere formée dans l'une &

l'autre valve de deux petits appendices sous les ~~_____~~
sommets , espèce nommée la *Lanterne* ou la *Papyracée* * ; & deux qui ne diffèrent des deux
premières de l'article 873 , qu'en ce qu'elles sont
entièrement blanches & de forme plus courte.

V. FAM.
TELLINES.
* Gualt. tab.
91. litt. D.

876. Quatre Tellines ; sçavoir , une de la
Méditerranée , revêtue de son épiderme noirâtre ,
à valves contournées ne pouvant joindre
que près de la tête , très-béantes dans le reste
de leur contour , chargées dans l'intérieur d'une
excroissance plate , dentelée dans ses bords , à
charnière de l'espèce décrite dans l'article 871 ,
& nommée le *Bec de canard* * ; une de même
espèce , mais polie & devenue par-là blanc sale
teint de gris ; une semblable aux deux dernières
de l'article précédent , & une *Lanterne*.

* Rumph.
tab. 45. litt. P.



GENRE TROISIEME.

MANCHES DE COUTEAU.

- 877. NEUF Manches de couteau :** sçavoir, un des Indes, rare pour sa grandeur, gris nué par ondes de fauve, de forme droite, & à charniere, ainsi que toutes celles de ce genre, formée dans l'une des valves, d'une dent applatie se logeant entre les deux correspondantes de l'autre valve¹; deux d'Amérique, fauves nués de blanc, presque aussi gros que le précédent, mais de moitié moins longs²; deux des mêmes parages, jaune pâle, à une des extrémités terminés en bourrelet, l'un desquels est revêtu vers un bout, d'Ovaires de Buccins³; & quatre de nos mers, dont deux courbes⁴; & deux droits⁵ nués de blanc, de gris & de verdâtre.
- ¹ List. tab. 413.
² Ibid. tab. 412. fig. superior.
³ Ibid. fig. inferior.
⁴ Arg. pl. 24. lett. L.
⁵ Gualt. tab. 95. litt. D.

- 878. Quatre Manches de couteau :** sçavoir, deux rares, fauve & lilas, tachetés de pourpre foncé, minces, transparens, & de forme un peu courbe, nommés Gouffes de fèves⁶; & deux de l'espèce des second & troisieme de l'article précédent.
- ⁶ Ibid. tab. 99. litt. E.
Rumph. tab. 45. litt. F.



SIXIEME FAMILLE.

M O U L E S.

C E sont des Coquilles oblongues, non d'un côté à l'autre comme les Tellines, mais de la tête au bord opposé ; elles sont de plus caractérisées par l'égalité constante de leurs deux valves, & par leur forme convexe, large vers le bas, finissant en pointe aux sommets. Quelques-unes sont encore remarquables par leur belle nacre & les perles qu'on y trouve quelquefois. Nous les diviserons en trois genres ; sçavoir,

VI. FAM.
MOULES.

1°. Les *Moules proprement dites*, dont les valves ferment exactement, & dont un des côtés est presque droit, tandis que l'autre & l'extrémité inférieure sont arrondis.

2°. Les *Moules cylindriques*, dont les valves sont fort longues, à peu près également larges des deux bouts, &

VI. FAM.
MOULES.

aussi exactement fermées que dans les précédentes, genre qui comprend les *Pholades bivalves*, nommées *Dattes*.

3°. Les *Moules triangulaires*, nommées particulièrement *Pinnes marines*, dont la forme est aplatie, à peu près triangulaire isoscele, & dont les valves ne ferment point exactement.

GENRE PREMIER.

MOULES PROPREMENT DITES.

879. **U**NE Moule des parages voisins du détroit de Magellan, dépouillée de sa pellicule, & non polie, blanche vers le haut, violette & pourpre dans le reste, à stries longitudinales un peu ondées, croisées de distance en distance par d'autres transversales jettées par ondes; nacrée d'un bel orient, & offrant aux yeux, tant en dedans qu'en dehors, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à charnière formée d'une dent oblongue sous le sommet de l'une des valves, & d'une cavité de même forme dans l'autre; nommée *Magellanique* *, & grande dans son espèce.

* Arg. pl. 22.
let. N.

880. Une Moule Magellanique dépouillée ~~blanche~~ & non polie , plus grande que la précédente , VI. FAM. blanche dans les trois quarts de sa longueur à MOULES. prendre de la tête , & violet nué de blanc dans le reste.

881. Une qui ne diffère de la précédente qu'en ce qu'elle est toute blanche , excepté quelques nuances de violet jettées par zones surtout vers le bas.

882. Une très-grande Moule Magellanique polie , & dont la robe privée de ses stries , est d'un beau pourpre veiné de blanc & du plus grand éclat.

883. Une autre polie & plus foncée en couleur que la précédente.

884. Une autre Moule Magellanique polie , dont les deux valves sont jointes & assujetties ensemble par une bordure d'écaille , & forment ainsi une tabatiere à goulot à l'usage des Indiens , qui ressemble parfaitement à nos *poires à poudre*.

885. Deux Moules Magellaniques polies , dont une remarquable par une excroissance représentant parfaitement une autre Moule qui auroit crû sur la première , mais du reste semblable aux précédentes , & que l'on pourroit nommer *Moule double* ; & une autre variété , blanche dans plus de la moitié de sa longueur , bleu-turquin légèrement nué de blanc dans le reste , laquelle n'a jamais eu de stries , & dont le dedans

382 COQUILLES BIVALVES

VI. FAM.
MOULES.

est presque entièrement recouvert d'une couche légère, blanche, parsemée d'un grand nombre de petites perles : on n'y apperçoit pour toute charniere que la rainure latérale destinée à recevoir le ligament.

886. Une *Moule de la terre des Papous*, polie, fauve nuée par ondes de blanc & de couleur de rose, de l'éclat de l'agate, de forme très-bombée, un peu sinueuse dans son bord inférieur, bossue vers les sommets, d'où naissent deux avances arrondies en portion de cercle : on n'y distingue point de charniere, mais seulement un sillon léger & fort long, qui se termine dans chaque valve par une dent presque insensible* : cette Coquille a plus d'un demi-pied de long sur deux pouces neuf lignes de large.

* Arg. pl. 12.
lett C.
Adans. pl. 15.
f. 1.

887. Une autre des mêmes parages, & semblable, mais moins grande ; & une valve de Moule Magellanique, très-rare, mais un peu fruste, brun-noirâtre tant en dessus qu'en dessous, & portant un pied trois pouces & demi de long sur huit pouces & demi de large.

888. Cinq Moules peu communes : sçavoir, trois petites Magellaniques, dont une de forme assez large, blanche & nacrée depuis la tête jusqu'au milieu, bleu foncé nué de blanc dans le reste ; une toute violette, à la tête près, qui est blanche, & une entièrement blanche : les deux

autres sont des parages voisins de *Rio de la Plata*, lisses & polies., à robe violet-noir jouant l'opale, & bordée de violet clair.

VI. FAM.
MOULLES.

889. Quatre Moules de moyenne grandeur, & polies : sçavoir, une Magellanique peu commune, nuée d'orangé & de rouge-brun; & trois d'Afrique, dont une marbrée par ondes de lilas, de couleur de rose & de rouge-brun; une marbrée de blanc, de gris de lin & de lilas; une fauve tachée de verd, & marbrée par traits en zig-zag de fauve plus foncé : toutes les trois à charniere formée d'une très-petite dent sous le sommet de l'une des valves, qui se niche dans une cavité correspondante de l'autre valve.

890. Quatre Moules : sçavoir, une de *Rio de la Plata*, revêtue de son épiderme marron foncé, & à charniere comme les dernières de l'article précédent; deux d'Afrique, dont une jonquille clair, & à tête lilas; & une d'un beau verd, ornée dans toute sa robe de traits en zig-zag plus foncés, imitant le point d'Hongrie; & une de la terre des Papous, polie, marbrée principalement par ondes de violet, de blanc, de fauve & de verdâtre.

891. Quatre autres Moules polies, dont une violette nuée de gris de lin, & jouant l'opale; une de *Rio de la Plata*, & deux d'Afrique, semblables aux seconde & troisieme de l'article précédent.

384 COQUILLES BIVALVES

**V. FAM.
MOULES.**

892. Quatre Moules d'Afrique, dont une couleur de paille, à grand nombre de zones formées de traits en zig-zag fauves, imitant le point d'Hongrie; une à cinq larges zones alternatives verd foncé & fauve clair; celles-ci bariolées de traits fins en zig-zag rouge pâle; une blanche, & une jonquille pâle.

893. Deux *Moules d'Alger*, ressemblantes aux Magellaniques pour la nacre & les couleurs, mais de forme plus étroite & plus allongée, grandes dans leur espèce; l'une desquelles est polie, l'autre revêtue de son épiderme, & adhérente encore à son byssus: leur charnière est de l'espèce décrite article 879.

* List. tab.
359. f. 198.

894. Huit Moules d'Amérique: sçavoir, deux blanches rayonnées de rouge-brun, ayant à-peu-près la forme de la *Moule des Papous*, & nommées *Tulipes* *; deux de même espèce, mais revêtues encore de leur épiderme, partie marron & partie fauve; deux petites de même forme, couleur de rose; & deux petites grises tachées de violet foncé, nuées vers l'un des bords de couleur de rose, à stries longitudinales très-fines, terminées par des dentelures presque insensibles, & à charnière formée de deux très-petites dents qu'on ne decouvre qu'à la loupe, espèce nommée *Gueule de souris*, & par M. Adanson le *Dotel* *.

* Arg. pl. 22.
lett. K.
List. tab. 366.
f. 206.
Adans. Hist.
du Sénégal. pl.
15. fig. 3.

895. Trois belles Moules de la Méditerranée, dont

dont une très-grande revêtue de son épiderme noir, de forme large, & à charniere formée de deux petites dents sous les sommets; & deux de même espèce, polies, moins grandes, d'un beau violet en dehors, blanches bordées de violet en dedans*.

VI. FAM.
MOULES.

* Gualc. tab.

21. litt. E.

Litt. tab. 364.

f. 203.

896. Cinq Moules de la Méditerranée, de l'espèce des précédentes : sçavoir, deux revêtues de leur épiderme brun-noirâtre, à l'une desquelles adhère un groupe de tuyaux vermiculaires; & trois polies, dont deux d'un beau violet veiné en quelques endroits de blanc, & une violette vers le haut, bleu foncé au dessous, & bordée vers le bas d'une zone fauve assez large.

897. Quinze Moules de différentes grandeurs, la plupart dépouillées de leur épiderme : sçavoir, deux d'Amérique, blanches au sommet, bleu foncé dans le reste, à charniere formée de trois petites dents, & chargées l'une & l'autre de deux Huitres blanches papyracées, d'une espèce très-rare; deux petites rouffes, de la forme des Moules des Papous; deux *Tulipes*; deux *Gueules de souris*; une Moule de la Méditerranée, de la variété de la dernière de l'article précédent; quatre de nos mers, rayonnées de violet & de bleu; deux autres bleu foncé, chargées de glands de mer; & une petite boîte de semence de Moules de nos mers.

GENRE SECOND.

MOULES CYLINDRIQUES ET PHOLADES
BIVALVES, NOMMÉES DATTES.VI. FAM.
MOULES.

898. **D**EUX Moules peu communes en pendant^s, à coque très-mince, nacrée en dedans, de forme presque cylindrique un peu aplatie vers l'un des bouts, à robe partie fauve, & partie chargée d'un dessein en rézeau très-fin, de couleur plus foncée, qui se ramifie vers le bas, & qui a fait donner à cette espèce le nom de *Moule arborifée*: on n'y apperçoit nulle trace de charniere.

899. Deux *Moules arborifées*, à ramifications du dessein plus nombreuses & mieux prononcées que dans les précédentes, qu'elles surpassent aussi en grandeur.

900. Dix *Pholades* bivalves: sçavoir, deux rares d'Afrique, revêtues d'un périoste brun, à stries fines longitudinales partant du sommet en forme de rayons, & à bords repliés en partie l'un sur l'autre en dedans des valves; deux grandes d'Amérique, dont une revêue de son épiderme verdâtre, à stries onduleuses très-fines, & nacrée en dedans^{*}; l'autre laisse voir

* Rumph.
tab. 46. lit. F.

la robe blanche de la Coquille dans les parties où l'épiderme a été enlevé; deux petites noires des mêmes parages¹; & quatre de la Méditerranée, dont deux marron²; une fauve, & une blanche dépouillée de son épiderme.

901. Un groupe de quatre *Dalles* de la Méditerranée, dont trois grandes & une petite, logées dans la pierre même qu'elles ont creusée; & deux grandes de l'Amérique, dont une polie, l'autre simplement dépouillée de son épiderme, toutes deux parfaitement blanches & nacrées.

VI. FAM.

MOULES.

¹ Gualt. cab.² 50. litt. D.

Arg. pl. 26.

lett. K.

Bonan. cl. 2.

f. 28 & 29.

² Hist. tab.

327. f. 268.

GENRE TROISIEME.

*PINNES MARINES, NOMMÉES AUSSI
JAMBONS ET JAMBONNEAUX*

**VI. FAM.
MOULES.**

902. **U**NE *Pinne-marine* des Indes, rare, de neuf pouces & demi de long, & à coque mince, rouge & transparente; de forme assez large, à huit côtes longitudinales partant du sommet, laissant entr'elles de larges, mais peu profondes cannelures, chargées, ainsi que les côtes, de feuillets minces & couchés, dont quelques-uns s'élèvent en forme de tuiles, nacrée en dedans vers le haut, & à charnière formée, ainsi que toutes celles de ce genre, d'un simple ligament, sans aucun vestige de dents.

903. Une *Pinne-marine* des Indes, peu commune, de près d'un pied de long, de forme plus étroite, & à coque plus épaisse que la précédente, brune en dehors, presque entièrement nacrée en dedans, à stries fines longitudinales peu prononcées vers le bas, où elle est chargée d'une grande Huitre de l'espèce des *Crêtes de coq*.

904. Quatre *Pinnes-marines* de moyenne grandeur: sçavoir, deux des Indes, dont une

à coque peu épaisse, transparente, & de couleur de corne, à stries fines longitudinales, & de forme assez large vers le bas; l'autre est fauve, chargée dans une partie de sa robe de stries qui partent du sommet en forme de rayons hérissés de tuiles plus ou moins longues, pliées en cornets ou tuyaux cylindriques vers le bas des deux valves qui sont coupées à équerre*; deux de la Méditerranée, couleur de rose pâle, presque entièrement recouvertes de feuilletés ondulés & plissés, formant des tuiles nombreuses plus ou moins cylindriques, & à l'une desquelles adhère encore son *Byssus**. Plus un *Byssus* détaché.

VI. FAM.
MOULES.

* Séba., pl.
91. n. 3.

* Bonan. el.
2. f. 14.
Gualt. tab. 78.
litt. B.

905. Sept petites *Pinnes-marines*: savoir, deux d'Amérique, couleur de rose, papyracées, à stries longitudinales un peu sinueuses, chargées vers le bas de quelques tuiles*; une violette des Indes, à tuiles plus longues & plus nombreuses*; deux papyracées de la côte Coromandel, verdâtres nuées de pourpre, à stries fines non tuilées*; une rare par sa forme bizarrement contournée, à grosses stries longitudinales peu nombreuses; une de l'espèce des dernières de l'article précédent, & un *Byssus*.

* Gualt. tab.
79. litt. C.

* Arg. pl. 227.
litt. F.

* Liff. tab.
371. fig. 212.

906. Dix autres, la plupart papyracées; savoir, trois blanches nuées de couleur de rose*, dont une a quelques tuiles vers le bas; une légèrement sinueuse vers la tête*; une gris de

* Gualt. tab.
78. litt. C.

* Rumph.
tab. 46. litt. N.

390 COQUILLES BIVALVES

VI. FAM.
MOULLES.

* List. tab
370. f. 211.

lin nuée de pourpre, à stries fines longitudinales, traversées d'autres encore plus fines *; une violette presque en entier; trois des variétés déjà décrites, & une comme la sixième de l'article précédent, dont les deux valves sont considérablement arquées. Plus, deux *Byffus*, & deux plaques de *Pinne-marine*, taillées & polies, imitant la Cornaline.

* Bonan. cl.
2. f. 23.
Arg. pl. 22.
lett. B.
Gualt. tab. 78.
lett. A.

907. Six *Pinnes-marines*; sçavoir, deux de la Méditerranée, couleur de corne, à stries longitudinales peu prononcées, & à feuilletures transversales onnées & déchiquetées, couchées les unes sur les autres *; trois de la même mer, dont une de forme moins allongée que les précédentes, de couleur plus obscure, & à feuilletures non déchiquetées; les deux autres sont de l'espèce des deux dernières de l'article 904; & une du Sénégal, de huit pouces de long, de forme large & aplatie, à stries longitudinales nombreuses, hérissées de tuiles plus ou moins longues, dont les plus grandes sont pliées en tuyaux cylindriques. C'est l'*Apan* de M. Adan-

* Adanf. pl. son *.
35. f. 5.

* Séba, pl.
91. n°. 1.

908. Une *Pinne-marine* de la Méditerranée, de l'espèce des dernières de l'article 904; elle porte un pied huit pouces de long *. On a joint à cette Coquille une paire de bas & une paire de gands de *Byffus*, qui ne cèdent en rien à ceux de soie pour la finesse & la beauté. Ils viennent de la Manufacture de Naples.




COQUILLES DE MER.



CLASSE TROISIÈME.

M U L T I V A L V E S.

ON range sous cette classe, qui est  moins nombreuse & beaucoup moins variée que les précédentes, les Coquilles composées de plusieurs pièces, ordinairement inégales entr'elles. Nous la diviserons en six familles, qui sont,

MULTIVALVES.
VERS.

- 1°. Les Oscabrians.
- 2°. Les Pholades.
- 3°. Les Tuyaux de mer multivalves.
- 4°. Les Glands de mer.
- 5°. Les Pouce-pieds & Conques anatifères.
- 6°. Les Ourfins.



PREMIERE FAMILLE.

O S C A B R I O N S.

I. FAM.
OSCARIONS.

M. Adanson a rangé ces Coquilles dans la classe des Univalves, à cause de l'animal qui les habite, qu'il a reconnu appartenir au genre des Lépas; mais, comme nos divisions ne sont fondées que sur les Coquilles mêmes privées de leurs animaux, nous ne pouvons nous dispenser de rapporter celles-ci aux Multivalves. Elles ont la forme d'un demi-ovoïde, & sont composées de huit écailles courbes, posées en recouvrement les unes sur les autres de devant en arrière, relevées toutes dans le milieu d'une petite côte plus ou moins aiguë, & enclavées vers le bas dans une membrane flexible, écailleuse & chagrinée dans son contour. Cette famille ne contient qu'un seul genre,

909. Douze *Oscabrions* formant six variétés, savoir, deux du Chili, à écailles violet-noir

nué de jaune vers le haut , traversées chacune dans le milieu d'une bande assez large , & de deux rayons obliques de même couleur que le fond , à côte longitudinale obtuse , & à bords de la membrane dépourvus d'écaillés ou non chagrinés. Leur forme un peu arquée leur donne beaucoup de ressemblance avec une grosse *Chenille* , ou avec une *Chaloupe* , dont les membres & les varangues sont représentés par les écaillés courbes de la Coquille ; deux à-peu-près de même forme , mais moins arqués , bleu céleste en dedans , à contour extérieur de la membrane revêtu de très-petites écaillés qui imitent le chagrin , & de plus orné de taches alternatives grises & noires ; deux de S. Domingue , plus grands que les précédens , gris cendré en dehors , & chagrinés sur leurs bords * ; deux de la Caroline , gris de lin , nués de verdâtre , à taches brunes triangulaires sur le milieu des écaillés , qui sont chargées chacune vers les côtés de deux suites triangulaires de stries partie longitudinales , & partie transversales , à extrémités chagrinées ainsi que le contour , & blancs en dedans ; deux petits de nos mers , bruns nués de verdâtre , & pointillés de gris en dehors , violets en dedans , à côte du milieu plus aiguë que celle des précédens , mais du reste semblables pour les stries & la partie chagrinée * ; deux autres petits de couleur cendrée , de for-

I. FAM.
OSCARIONS.

* Arg. pl. 25.
lett. L.
Séba, tom. 2.
pl. 61, n°. 3
& 4.


* Arg. pl. 25.
lett. M.

394 COQUILLES MULTIVALVES

~~me étroite & allongée, à bords de chaque écaille~~
I. FAM. chargés de deux crans triangulaires & très-fine-
OScabrions. ment striés. Pius, un Oskabrion dont les huit
pièces ont été détachées pour en faire voir la
structure, & dont la membrane ressemble alors
à la carcasse d'une chaloupe privée de son bor-
dage.

910. Quatre très-grands Oskabrions des pa-
rages Magellaniques, de forme plus large &
plus aplatie que ceux de l'article précédent;
deux desquels ont les écailles brunes tachées
dans le milieu de blanc, & striées à-peu-près
comme celles de la petite tortue de terre; les
deux autres sont tels qu'ils sont sortis de la
mer *.

* Arg. Zoo-
morph. pl. 7.
lett. V.
Séba, tom. 2.
pl. 61. n°. 6.



SECONDE FAMILLE.

PHOLADES.

CES Coquilles, dont le caractère général est de se loger dans les pierres tendres, l'argille & le bois, sont ordinairement composées de cinq ou six pièces fort inégales entr'elles, & plus ou moins fines, dont les deux plus grandes, qui sont latérales, répondent aux battans des Bivalves; les autres, qui sont beaucoup plus petites, se trouvent fixées par des ligamens partie sur le sommet & sur le repli extérieur de chaque battant, partie le long des battans mêmes, soit en dessus, soit en dessous. Ces dernières pièces sont si fragiles & si minces, qu'il est rare de les trouver jointes aux deux principales qui d'ailleurs ne ferment jamais exactement. Nous connoissons deux genres dans cette famille; sçavoir,


II. FAM.
PHOLADES.

1°. Les Pholades sextivalves.

2°. Les Pholades quintivalves.

GENRE PREMIER.

PHOLADES SEXTIVALVES.

- 911.**  QUATRE Pholades à six pièces ; savoir, une de nos mers , blanc sale , de forme allongée , à robe en rézeau granuleux dans les deux tiers de sa longueur , à valves sinueuses & évalées vers l'une des extrémités ; elle conserve son animal ¹ ; une autre de même couleur , mais de forme plus large , plus courte & plus bombée ; elle n'est reticulée que dans sa partie antérieure , le reste de sa robe n'a que des stries transversales en façon de rides : l'animal y est aussi renfermé ² ; une grande d'Amérique , blanche , de forme allongée , à grosses stries longitudinales tuilées partant des sommets , traversées d'autres très-fines & onduleuses , à longs appendices intérieurs un peu concaves , à larges replis des valves sur les sommets , & à bords dentelés ³ ; & une petite d'Angleterre , entièrement réticulée ⁴.
- ¹ Arg. pl. 26. litt. H. I.
² List. tab. 433. f. 276.
 Gual. tab. 105. litt. A. B. C.
³ List. tab. 436. f. 279.
 Gual. tab. 105. litt. D.
 Séba, pl. 16. n°. 6.
⁴ List. tab. 434 fig. 277.
 Gual. tab. 105. litt. G.
- 912.** *Idem.*
- 913.** Deux grandes Pholades d'Amérique en pendant , de la variété de la troisième de l'article 911.
- ¹ List. tab. 435. f. 278.
 Gual. tab. 105. litt. E.

913. (*bis*) Six Pholades de la Méditerranée,
 avec leur animal parfaitement conservé dans l'esprit-de-vin : elles forment trois variétés. II. FAM. PHOLADES.

GENRE SECOND.

PHOLADES QUINTIVALVES.

914. **D**EUX Pholades des Indes, à cinq pièces, dont les trois petites sont placées, l'une sur les sommets, les deux autres le long des valves tant sur le dos que dans la partie inférieure : la forme totale de la Coquille est presque conique, & la robe en est partie lisse, partie très-finement réticulée, & partie simplement ridée * ; plus, un morceau de bois qui se sépare en trois, contenant deux petites Pholades de cette espèce, & plusieurs cavités coniques que d'autres y ont creusées. Cette variété de Pholades n'est pas commune.

* Rumph.
tab. 46. litt. H.

915. Six Pholades de l'espèce précédente, dont cinq nichées en partie dans un morceau de bois.



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX DE MER MULTIVALVES.

III. FAM.
TUYAUX DE
MER MULTI-
VALVES.

CES Coquilles, que M. Adanson a distinguées le premier des *Tuyaux de mer univalves*, ne diffèrent de ces derniers que par deux valves ou par deux paires de petites valves qu'on trouve en dedans, qui, lorsqu'elles ne sont qu'au nombre de deux, peuvent faire regarder la Coquille comme *trivalve*, & comme *quintivalve* lorsqu'elles sont au nombre de quatre; ce qui constitue deux genres dans cette famille, que nous comprendrons dans les deux articles suivans.

916. Quatre petits *Tuyaux trivalves* d'Amérique, adhérens à un cœur de l'espèce nommée *Marron épineux*, composés chacun extérieurement d'un tuyau grisâtre fermé & bombé par un bout, chargé en cet endroit de tubercules, mais mince, foré, relevé & un peu applati par l'autre, & intérieurement de deux petites valves assez semblables pour la forme aux battans des

Pholades de la famille précédente : la ressemblance de ces Tuyaux avec une *Cornue* ou *Restorte*, leur en peut faire donner le nom ; un petit Tuyau de cette espèce , dont la partie supérieure a été enlevée pour faire voir les valves intérieures dans leur position naturelle ; deux autres petites valves détachées de l'un des quatre Tuyaux précédens ; une espèce de fruit spongieux que l'on trouve sur le rivage de la côte Coromandel , dans lequel sont logés plusieurs *Tuyaux quintivalves* diversement contournés , fermés & bombés par un bout , minces & forés de l'autre ; deux Tuyaux de même espèce , l'un desquels a été troué à sa partie bombée pour en tirer les quatre petites valves intérieures , dont les deux qui occupent la partie inférieure du Tuyau , sont arquées , & les deux qui se trouvent à l'extrémité supérieure , sont en forme de palettes ou de petites cuillers à manche court ; ce qui doit faire regarder cette espèce de Tuyaux , comme une variété de celle que M. Adanson a décrite sous le nom de *Taret* ; un autre Tuyau quintivalve blanc , long , un peu finueux , fermé par le bout le plus large , d'une espèce d'opercule hémisphérique , qui est comme engagé dans le Tuyau ; ouvert par le bout le plus étroit , dont l'orifice est partagé par une cloison longitudinale de peu d'étendue , en deux petits demi-cylindres inégaux , & dans

III. FAM.
TUYAUX DE
MER MULTI-
VALVES.

III. FAM.
TUYAUX DE
MER MULTI-
VALVES.

* Adanf. pl.
19. f. 1.

* Rumph. tab.
41. litt. F. G.

l'intérieur duquel on reconnoît en l'agitant, que sont contenues les petites valves qui lui sont propres ; c'est le vrai *Taret rongeur de bois* de M. Adanson * ; deux *Tarets* d'une autre variété, dont le dedans est sur-tout remarquable par un grand nombre de feuillets circulaires minces, en vive arrête, & placés en forme d'anneaux, à distances à-peu-près égales les uns des autres vers le bout le plus étroit du Tuyau, l'un desquels a été coupé dans la longueur de plus d'un pouce, pour en mettre la construction intérieure à découvert *. Plus, deux valves arquées provenant de cette variété de Tarets, lesquelles sont beaucoup plus larges que celles des autres variétés.

917. Quatre morceaux de bois criblés & vermoulus par des Tarets de la dernière variété de l'article précédent : l'un desquels est un morceau de sapin de treize pouces de long sur quatre de large & autant d'épaisseur, dont une des faces présente encore un de ces Tuyaux niché dans son trou, & des fragmens de plusieurs autres. Les trois autres morceaux sont beaucoup moins grands, & contiennent plus ou moins de ces Tuyaux.



QUATRIEME

QUATRIEME FAMILLE.
GLANDS DE MER.

CES Coquilles, dont le caractère distinctif est de s'attacher par groupes nombreux aux cailloux, aux autres coquillages, & généralement à tous les corps qui se présentent, sont composées de deux portions, l'une extérieure de forme cylindroïde ou conoïde, & l'autre intérieure de forme pyramidale quadrangulaire.

 IV. FAM.
GLANDS DE
MER.

La première de ces portions ressemble à un calice formé de douze pétales triangulaires oblongues, liées intimement les unes aux autres, dont six plus épaisses ont leurs pointes vers le haut, & six plus minces ont les leurs renversées.

La seconde est composée de quatre valves triangulaires à coulisse, que l'animal a la faculté d'écarter les unes des autres par leurs pointes, pour en faire

402. COQUILLÉES MULTIVALVES

IV. FAM. GLANDS DE MER. sortir un panache, au moyen duquel il se procure sa nourriture. Cette famille ne contient qu'un seul genre.

918. Quatre groupes de *Glands de mer*, & la portion intérieure détachée d'un autre Gland de mer : sçavoir, le premier groupe de deux Glands violets de diverses nuances, d'environ deux pouces de diametre dans le bas, & de presque autant de hauteur, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales, & pétales minces striées transversalement, espèce nommée *Gland de mer Turban* * : le second de deux glands de forme moins renflée, de plus de deux pouces de haut sur un pouce de diametre dans le bas, à pétales épaisses amaranthe clair, & pétales minces violet nué de blanc, striées comme celles des précédens, & de l'espèce nommée *Gland de mer Tulipe* * : le troisieme d'un grand nombre de petits Glands violet clair & blancs, adhérens à un grand Lépas, & nommés simplement *Glands de mer rayés* *, & le quatrieme d'un grand nombre d'autres Glands blanc sale, très-petits, & conservant presque tous leur portion intérieure * : ce dernier est de nos mers; les trois premiers viennent des Indes.

* Arg. pl. 26. lett. A.
Gual. tab. 106.
lett. H.

* Rumph. tab. 41. lit. A.
Gual. tab. 106.
lett. E.

* Arg. pl. 26. lett. C.

* Gualt. tab. 106. litt. G.
Bonan. cl. 1.
n°. 15.

919. Deux Glands de mer : sçavoir, un rare, violet, dont les pétales épaisses sont chargées d'épines, & nommé *Gland épineux* : il adhère

à une valve de *Conque anatifere* ; un de la Mé-
diterranée , conservant ses valves intérieures ,
fixé sur une petite branche de Corail rouge , &
recouvert en entier de cette substance ; & une
Moule Magellanique violette , à tête blanche ,
dont une des valves est chargée d'un grand
nombre de petits Glands de mer blancs & lilas ;
à stries longitudinales ondées sur toutes les pé-
tales , & garnis tous de leurs valves intérieures.

IV. FAM.
GLANDS DE
MER.

920. Un groupe de trois *Glands de mer Turbans* , & un de trois *Glands de mer Tulipe* , ad-
hérens à un fragment de *Moule Magellanique* ;
deux Glands de mer revêtus de Corail rouge ,
liés ensemble par deux branches de même ma-
tière ; un d'Amérique , couleur de rose , dont
les pétales épais sont sans stries longitudi-
nales , mais seulement un peu raboteuses , &
dont les pétales minces finissent par une section
oblique , ce qui en rend la bouche crénelée ;
& un *Gland Turban* adhérent à une valve de
Crête de coq ; en tout dix Glands de mer.

921. Quatre groupes de Glands de mer : sça-
voir , un de plusieurs petits couleur de rose ,
adhérens à un Lithophite épineux , & formant
un joli bouquet , auquel ce Lithophite sert de
tige ; trois autres de gros *Glands Turbans* , dont
un de cinq , & deux de trois chacun ; un *Pé-
toncle* & un *Lépas* de nos mers , chargés l'un
& l'autre de petits Glands de l'espèce commune.

404 COQUILLES MULTIVALVES

Plus, une Coquille des mers du Nord, formée extérieurement comme les Glands de mer, mais différente en ce que les douze pétales en sont un peu recourbées vers le haut, fix desquelles sont chargées chacune de quatre côtes striées transversalement, & en ce que la base en est concave, percée dans le milieu d'un trou rond, & divisée en plusieurs cellules étroites & profondes; espèce que l'on trouve adhérente à la peau des *Baleines*, & qu'on nomme par cette raison

Pou de baleine *: en tout sept pièces.

922. Un groupe de six Glands de mer blancs & de la forme d'un cône tronqué, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales très-saillantes en forme de rayons, de l'espèce nommée *Clochette*, & adhérens au dos d'un *Crabe*; un Gland de mer blanc nué de violet, à pétales épaisses & minces, mieux prononcées que les précédentes, ce qui lui a fait donner le nom de *Gland de mer à côte de Melon*: il est chargé d'onze autres petits Glands de même espèce; un Gland revêtu de corail rouge, tenant à une branche de même matière, & représentant une tulipe avec sa tige; un groupe de *Glands couleur de rose*, & un de trois gros *Glands Turbans*; en tout cinq pièces.

* List. tab.
445. f. 288.
Gual. tab. 106.
lett. Q.



CINQUIEME FAMILLE.

CONQUES ANATIFERES OU POUCE-PIEDS.

CES Coquilles, qui doivent le premier de ces noms à la fausse opinion où l'on étoit autrefois que certains canards de mer y prenoient naissance, sont toutes remarquables par un pédicule plus ou moins long, qui leur sert de support. Nous n'en connoissons que trois espèces.

V. FAM.
POUCE-PIEDS

1°. Celle qui a retenu le nom de *Conque anatifere*, & qui est composée de cinq valves à peu près triangulaires, assez différentes entr'elles, dont deux grandes & trois petites, portées sur un pédicule membraneux, long, étroit & ridé.

2°. Les *Pouce-pieds* de nos mers, lesquels sont composés de cinq valves inégales, dont deux ovales & convexes, deux lozanges, & une en forme de bec,

V. FAM.
POUCE-
PIEDS. sans compter un grand nombre d'autres plus petites qui toutes sont portées sur un pédicule court, large, noirâtre, chagriné & assez semblable à une bottine.

3°. Les *Pouce-pieds* des Indes, composés de huit grandes valves & d'un grand nombre de petites recourbées en façon de panaché, & portées sur un pédicule large & long.

923. Un groupe de *Conques anatiferes* des Indes, adhérentes par leurs pédicules très-longs, à un morceau de bois de sapin de qua-

* Séba, pl. torze pouces de hauteur *.
16. n°. 1.

924. Un très-beau groupe de *Pouce-pieds* de nos mers, formant un bouquet de huit pouces tant de hauteur que de largeur, & de la plus parfaite conservation, sur lequel se trouvent quelques Moules entremêlées avec les Pouce-

* Arg. pl. 26. pieds *.
lett. D.

925. Six variétés de *Pouce-pieds* : sçavoir, deux Pouce-pieds des Indes, rares, nommés *Couronnes de serpens*, tous deux isolés & privés

* Séba, tom. 2. pl. 61. n°. 8. variété de ceux de l'article précédent; deux branches, l'une de trois, l'autre de cinq *Conques anatiferes* d'Europe, à pédicule large &
Ibid. tom. 3. pl. 16. n°. 3.
Rumph. tab. 47. litt. M.

court¹ ; dix Conques anatiferes , à pédicule
mince , groupées ensemble² ; un paquet de
plusieurs autres enfilées , & un morceau de bois
de sapin , chargé de Conques anatiferes des
Indes , de la variété de l'article 923.

V. FAM.

POUCE-

PIEDS.

¹ Séba , pl.16. n^o. 1. b.² Ibid. n^o.

1. a.

Arg. pl. 16.

lett. G.

SIXIEME FAMILLE.

O U R S I N S,

 VI. FAM.
 OURSINS.

CE sont des Coquilles de forme voûtée plus ou moins convexe, composées d'une quantité prodigieuse de pièces de rapport fragiles, hérissées de pointes nombreuses qui tombent après la mort de l'animal, & qui laissent alors à découvert les apophyses & les petits trous sans nombre dont la Coquille est couverte.

Le célèbre M. Klein, en donnant au Public deux distributions de ces Coquilles, tirées l'une de l'*anus*, l'autre de la *bouche*, dit qu'il en auroit pû faire une troisieme prise de la *figure extérieure*; c'est celle que nous présentons dans ce Catalogue, non comme la plus parfaite, mais comme la plus simple & la plus commode. Nous diviserons donc les Oursins en six genres; sçavoir,

1°. Les Ourfins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, nommés *Turbans* (*Cidares.*)

VI. FAM.
OURSINS.

2°. Les Ourfins de forme ovoïde, échancrée d'un côté, à base un peu aplatie, & à partie supérieure sillonnée, nommés *Cœurs marins*, *Barilleis* ou *Pas de poulain* (*Spatagi.*)

3°. Les Ourfins de forme ovoïde sans échancrure, & fort convexe depuis la bouche jusqu'à la pointe tronquée, nommés *Oeufs marins* ou simplement *Ovoïdes* (*Brissi.*)

4°. Les Ourfins à pans irréguliers, de forme large & peu bombée, & ornés dans leur partie convexe d'une espèce de fleur à cinq pétales, nommés *Pavois* ou *Boucliers* (*Scuta.*)

5°. Les Ourfins de forme aplatie, ornés dans leurs deux faces de cinq feuilles, & percés ou non de quelques trous oblongs, nommés *Gâteaux* ou *Beignets* (*Placentæ.*)

6°. Les Ourfins de même forme que

410 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS. les précédens, mais dont la moitié & plus de la circonférence est rayonnée ou dentée en forme de roue, tandis que l'autre moitié est entière & arrondie, nommés *Roules* (*Roulæ.*)

GENRE PREMIER.

T U R B A N S.

926. **D**EUX grands Turbans de la Méditerranée, couleur de rose, de forme sphéroïdale, à sommet très-élevé, à bouche ronde; située, ainsi que dans tous ceux de ce genre, au milieu de la base, qui est un peu convexe, à grands & petits colures, chargés d'apophyses nombreuses en forme de grains de millet, qui ont fait donner à cette espèce le nom de *Turban miliaire*; & desquels l'un est encore hérissé de ses piquans jaune pâle, fins comme des aiguilles.

927. Deux grands *Turbans miliaires* de la même mer, violet foncé, de forme sphéroïdale, mais à sommet moins élevé que les précédens, hérissés tous deux de petits piquans aiguille fauve-gris*.

* Séba, pl.

11. n°. 9.

Klein. pl. 1.

lett. A.

928. Deux autres, dont un fauve-verdâtre, à sommet élevé, à base aplatie, & hérissé de

piquans verts , clair semés & un peu longs : l'autre est de la forme de ceux de l'article précédent , mais un peu plus petit , d'un beau violet , ainsi que les piquans dont l'extrémité tire sur le blanc.

VI. FAM.
OURSINS.

929. Deux très-grands *Turbans miliaires* de la Méditerranée , dépouillés de leurs piquans , de forme sphéroïdale , à petits colures nués de couleur de rose , de verdâtre & de brun , à panneaux bien prononcés , dont les rangs de futures sont fauve clair , à base presque platte , & nommés particulièrement *Turbans à panneaux* *.

* Gualt. tab.
107. litt. E.
Klein. pl. 5.
lett. B.

930. Trois *Turbans miliaires* , dont deux de la Méditerranée , de la forme de ceux de l'article 927 , mais plus petits , violets ainsi que leurs piquans ; & un d'Amérique , dépouillé de ses pointes , de forme hémisphérique , & à bouche décagone de cinq grands & cinq petits côtés alternatifs *.

* Ibid. pl.
1. lett. D.

931. Sept *Turbans miliaires* : sçavoir , cinq armés de leurs pointes , dont un violet foncé , à piquans fauve clair ; un noirâtre en entier ; un marron , à piquans violets ; un couleur de rose , à piquans blancs rabattus ; un olive foncé en entier ; & deux dépouillés de leurs piquans , dont un couleur de rose , à apophyses jaunes , & un violet , à apophyses fauve clair.

932. Douze *Turbans miliaires* , dont dix de

412 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS. ~~_____~~ moyenne grandeur & deux petits , fix desquels sont hérissés de leurs piquans , & de couleurs variées : parmi ceux qui en sont privés, deux sont verts de diverses nuances , deux couleur de rose , un nué de couleur de rose , de fauve & de brun ; tous les cinq à apophyses blanches , & un gris de perle en entier.

933. Trois Turbans d'Amérique : sçavoir , deux grands fauves , teints l'un de rougeâtre , l'autre de blanc , dépouillés de leurs piquans ; tous deux à sommet élevé , à cinq espèces de pans arrondis , & à bouche décagone sinueuse dans les angles , nommés *Turbans miliaires anguleux* * ; & un petit rare , noirâtre , hérissé de piquans très-longs & très-nombreux , nommé *Oursin à soyes* *.

* Klein. pl. 2. lett. F.

* Rumph. tab. 13. n°. 5.

934. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans , dont un grand & sept petits : sçavoir , le premier des Indes , rare , miliaire anguleux , à base & sommet aplatis , à colures marbrés dans toute leur longueur de verd & de violet , & par bandes transversales de blanc , & à bandes percées de trous , larges , blanches & représentant une espèce d'ouvrage en filigrane * ; un des Indes , rare , miliaire , verd pâle , à tête élevée , à colures grands & petits peu inégaux en largeur , chargés d'apophyses nombreuses , entre lesquelles les bandes percées de trous , paroissent à peine ; deux de la Méditerranée , mi-

* Arg. pl. 25. lett. H. Séba , pl. 11. n°. 6. A. B. Gual. tab. 107. lett. M.

liaires & aplatis, à colures verd foncé, & à bandes percées de trous, blanches¹; deux de l'Océan, miliaires aussi, très-applatis, & verd foncé en entier²; & deux de l'Isle de France, nués de fauve & de couleur de tuile, à cinq grands & cinq petits colures, séparés par des bandes en filigrane, & apophyses de moyenne grandeur, qui ont fait donner à cette espèce le nom de *Turbans à grains de petite vérole*³.

935. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans: sçavoir, deux des Indes, rares, à grains de petite vérole, dont un fauve clair, à bouche décagone sinueuse dans les angles, & à base aplatie; & un gris-vineux, à petits colures élevés, à grands colures enfoncés & dépourvus d'apophyses dans le milieu de leurs parties supérieures, & à bouche large, nommé le *Turban turc*⁴; & six miliaires de la Méditerranée, des variétés déjà décrites, dont cinq verds à apophyses blanches, & un grisâtre.

936. Deux Turbans de l'Isle de France, à grains de petite vérole, peu communs: sçavoir, un violet foncé, recouvert en entier de grands piquans aplatis en forme de spatules ou de pignons de pommes de pin, se recouvrant mutuellement, & ne laissant voir les uns des autres en dessus, que de petits pentagones dont l'arrangement imite celui des carreaux d'une chambre, à base hérissée aussi de petits piquans.

VI. FAM.

OURSINS.

¹ Séba, pl.

10. n° 13. a. b.

Klein. pl. 1.

lett. B.

² Ibid. lett. C.³ Ibid. pl. 24

lett. G. H.

⁴ Rumph.

tab. 14. lett. B.

Klein. pl. 2.

lett. B.

414 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS. spatules lie de vin, à dents bien conservées, & que sa ressemblance à un *artichaut*, a fait appeler de ce nom; d'autres le nomment le *Char-*

* Arg. pl. 25. lett. G. Klein. pl. 23. lett. A. B. *don**; & un de même espèce, dépouillé, violet clair, dont la forme est alors elliptique, à base plate, à bouche large & sinueuse, & à grand

* Ibid. pl. 2. lett. C. nombre d'apophyses*.

937. *Idem.*

938. Un grand Turban d'Amérique à grains de petite vérole, rare, de forme sphéroïdale aplatie; noirâtre en entier, à piquans cylindriques longs & fins, chargés de stries longitudinales granuleuses qu'on ne distingue bien qu'à la loupe, & finissant tous par une pointe ob-

* Séba, pl. 13. n°. 5. Klein pl. 27. lett. A. B. tuse & forcée*.

939. Un Turban des Indes, de forme elliptique, rare & très-bien conservé, à cinq grands & cinq petits colures, chargés chacun de deux rangs longitudinaux de grosses apophyses en forme de *mamelons*: cet Ourfin est garni de ses dents, & hérissé dans le corps de gros piquans en forme de *pieux de palissade* ou de *doigts*, cendrés, rayés vers le bout & par zones de fauve clair, longs, arrondis, finissant en tiers point*; & vers la base, d'autres piquans plus petits en forme de *spatule*, violet nué de fauve. Rumphius nomme cette espèce l'*Ourfin*

* Ibid. pl. 21. Arg. pl. 21. lett. C.

* Rumph. *digité**.

tab. 13. n°. 2. Séba, pl. 13. n°. 1 & 2.

940. Un grand Turban à mamelons, & di-


gris, de même forme que le précédent, mais hérissé dans le corps de piquans d'une variété VI. FAM.
rare, en ce qu'ils sont très-longs, d'une seule OURSINS.
couleur verdâtre, & ornés d'une côte longitudinale en vive arrête, qui les fait paroître comme triangulaires; les piquans de la base sont en forme de spatule, beaucoup plus courts, & violet nué de fauve*: cet Ourfin est garni de * Séba, pl. 13. n°. 4.
ses dents, & porte près d'un pied de diametre en mesurant de l'extrémité des piquans d'un côté, à l'extrémité des piquans de l'autre.

941. Un *Turban à mammelons* de la Méditerranée, peu commun, de forme sphérique, noirâtre, à gros piquans gris, à-peu-près cylindriques, & cannelés vers l'extrémité qui est arrondie*. * Ibid. n°. 3.

942. Un *Turban à mammelons* de l'Isle d'Amboine, sphérique, noirâtre, à gros piquans peu longs, en forme de pilon, chargés de stries longitudinales granuleuses bien prononcées vers l'extrémité, qui s'élargit & forme une espèce de tête sur laquelle les stries se prolongent en façon de rayons*. * Ibid. n°.

943. Deux *Turbans* à mammelons de la 10.
Méditerranée, de forme sphérique, l'un fauve dépouillé de ses piquans, garni de ses dents, à cinq grands colures chargés chacun de deux rangs de mammelons, & séparés les uns des autres par des bandes onduleuses dont les bords

416 COQUILLES MULTIVALVES

 sont en filigrane, nommé le *Turban maure*¹;
 VI. FAM. & un *Turban maure* garni de ses piquans ronds,
 OURSINS. très-longs, s'aminçissant de leur base à leur ex-
¹ Rumph. trémité, striés en longueur, & forés dans le
 tab. 13. n^o. 3. bout².
 Klein. pl. 3.
 lett. C.

Arg. pl. 251
 lett. E. 944. Quatre Turbans à mammelons : sça-
 voir, un de la Mer Rouge, blanc sale, dé-
 Gual. tab 108. pouillé de ses piquans, de forme hémisphéri-
 lett. E. que, à cinq grands colures chargés de deux
² Ibid. Ik. D. doubles ratigs de mammelons, & cinq petits
 Bonan. cl. 1. colures chargés d'un double rang seulement³;
 n^o. 17 & 18. & trois *Turbans maures* un peu moins grands
³ Arg. pl. 25. que les précédens, dont deux déponillés de
 lett. D. leurs piquans : on a enlevé la base & le sommet
 de l'un de ces Oursins, & on donne à part
 les dents & osselets, formant ce que l'on ap-
 pelle la *Lanterne d'Aristote* : le troisieme est
 garni de ses piquans grands & petits.

945. Cinq *Turbans à mammelons* : sçavoir,
 deux d'Amérique, à piquans gros & courts,
 grisâtres, striés & granuleux, terminés par une
⁴ Séba, pl. couronne plate, d'où sort un petit mammelon
 87. n^o. 11. radié⁴; un de même espèce, dépouillé de ses
 Rumph. tab. pointes, remarquable en ce que, quoique les
 13. n^o. 4. grands colures en soient fort larges, on n'y
 trouve que deux rangées de gros mammelons,
 séparées par un amas d'autres très-petits; &
 deux *Turbans maures*, l'un garni de ses pi-
 quans, l'autre d'un beau violet dépouillé des
 fiens.

946. Huit *Turbans* dépouillés de leurs pi-
 quans , & par pendans : ſçavoir , deux grands VI. FAM.
 à *mamelons* , de l'efpèce de celui de l'article OURSINS.
 940 * ; deux moins grands , qu'on ne différent de * Gualt. tab.
 ceux-ci qu'en ce que les apophyſes de leurs pe- 108. litt. C.
 tits colures ne ſe continuent point juſqu'au
 ſommet ; ils appartiennent à l'efpèce de l'arti- * Rumph.
 cle 939 * ; & quatre à *grains de petite vérole* , tab. 11. n°. 1.
 dont deux à baſe un peu convexe , & à groſſes Gual tab. 108.
 apophyſes peu nombreuses * ; & deux comme litt. B.
 le dernier de l'article 936. Klein. pl. 3.
lett. A. B.
* Ibid. pl. 2.
lett. E.

GENRES II & III.

CŒURS MARINS ET ŒUFS MARINS.

- 947.** **C**INQ *Cœurs-marins* : sçavoir , un de nos mers , de forme large & médiocrement convexe , orné en dessus d'une fleur à cinq pétales en forme d'étoile , quatre desquelles sont bordées d'une double rangée de petits trous ; semé dans le reste d'apophyses inégales & peu saillantes , à échancrure peu profonde dans le haut , qui se prolonge jusqu'à la bouche : celle-ci est près de la circonférence , ainsi que dans tous les Oursins de ce genre ; & quatre de forme plus oblongue & plus bombée , dont un de nos mers , à sillon large & assez profond , qui passe du dos jusqu'à la bouche , accompagné sur le dos seulement de quatre autres plus petits posés obliquement , percés chacun de quatre rangées de trous , & à robe semée d'apophyses très-fines , espèce nommée *Pas de poulain* ; un de même espèce , revêtu encore de ses piquans capillaires ; un d'Amérique , de même forme & de même grandeur , mais différent en ce que les sillons en sont étroits , profonds & sinueux ; & un de nos mers , plus gros , de
- VI. FAM. OURSINS.**
- ¹ Arg. pl. 25. lcu. K.
- ² Id. lcu. I. Gual. tab. 109. litt. D.
- ³ Séba , tab. 10. n°. 21. a. b.
- ⁴ Klein. pl. 28. litt. A. B.
- ⁵ Gualt. tab. 109. litt. C.

forme un peu plus oblongue que les précédens, ~~_____~~
 & ne différant d'ailleurs du second qu'en ce que VI. FAM.
 les sillons en sont tous très - profonds ; espèce OURSINS.
 nommée *Tête de mort* *.

948 Les mêmes Oursins , avec cette diffé- * Rumph.
tab. 14. n°. 2.
Bonan. cl. 1.
n°. 16.
 rence que le premier est ici plus bombé , &
 que le quatrième est couvert en partie de ses
 piquans capillaires.

949. Sept Oursins : sçavoir , quatre *Ovoides*
 ou *Œufs marins* , dont un de forme étroite ,
 gris en dessus , blanc en dessous , à quatre lar-
 ges sillons partant d'une cavité garnie de quatre
 trous , ornés chacun de quatre rangées de pe-
 tits trous , & entourés d'un autre sillon très-
 léger , qui représente une espèce de demi - dal-
 matique , à base un peu convexe , & à très-
 fines apophyses * ; un de même espèce , couvert * Klein. pl.
13. lett. D.
Gual. tab. 109.
lit. A.
Rumph. tab.
14. n°. 1.
Séba, pl. 10.
n°. 22. a. b.
 en entier de ses piquans capillaires gris , lesquels
 ressemblent à de gros poils de souris ; deux d'A-
 mérique , l'un blanc sale , qui ne diffère du * Ibid. n°. 19. a. b.
 premier qu'en ce qu'il est plus petit , & à pro-
 portion plus bombé * ; & l'autre gris en entier ,
 peu commun , de forme large , à robe semée
 d'apophyses blanches entourées chacune d'au-
 tres plus petites , à sillons ponctués très - pro-
 fonds , entourés d'un autre étroit & peu pro-
 noncé , dont le contour représente cinq bas-
 tions avec leurs flancs & leurs courtines : les
 trois autres sont des *Cœurs-marins* , dont un de

420 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM.
OURSINS.

l'espèce du premier de l'article 947 ; & deux *Pas de poulain* de nos mers , de la variété du second du même article , l'un desquels est garni de ses piquans.

950. *Idem.*

951. Un très-rare & très-bel Ourfin ovoïde , de forme large un peu élevée , gris nué de fauve en dessus , blanc en dessous , orné comme les précédens dans la partie convexe , d'une étoile à cinq rayons , dont quatre seulement sont percés de petits trous , à intervalles des rayons formant un compartiment chargé d'apophyses assez grosses , entourées d'autres très - fines , à apophyses du dessous disposées d'une façon très-élégante , & chargées chacune de petits grains , qui à la loupe brillent comme autant de perles. Cette Coquille que les Hollandois regardent comme une variété de celles qu'ils ap-

* Séba , pl. 24. n°. 5 & 6. pellent *Têtes-mortes* *, porte plus d'un demi-pied de long sur quatre pouces de large.



GENRE QUATRIEME.

PAVOIS OU BOUCLIER.

952. **S**IX Ourfins de différentes grandeurs : ~~VI. FAM.~~
 ſçavoir, deux grands d'Amérique en pendant , ~~OURSINS.~~
 de forme un peu convexe en deſſus , à baſe con-
 cave verſ le centre , à cinq pans arrondis , ornés
 dans leur partie convexe d'une roſe à cinq lar-
 ges pétales bombées , bordées chacune d'une
 double rangée de petits trous , & dans leur
 partie concave , d'une étoile à cinq rayons
 caves & étroits , à robe ſemée dans toute ſon
 étendue de petits cercles creux dans leſquels
 ſont les apophyſes , eſpèce que ſa reſſemblance
 avec un *Bouclier* , a fait appeller de ce nom * ;
 un des Indes , moins grand , plus convexe en
 deſſus , & plus concave en deſſous que les pré-
 cédens ; un plus petit , qui en diffère en ce qu'il
 eſt plus applati , que la baſe n'en eſt preſque
 point concave , & que les cinq pans en ſont
 mieux marqués : variété nommée *Pavois angu-*
laire * ; deux encore plus petits , de forme el-
 liptique , à baſe un peu convexe , à ſommet
 percé de quatre petits trous , d'où partent cinq
 paires de rayons formant autant de pétales qui

* Klein. pl.
 9. lett. B.
 Séba, pl. 11.
 n°. 2 & 3.
 Gual. tab. 110.
 litt. A.

* Klein. pl.
 10 lett. C.
 Séba, pl. 15.
 n°. 13 & 14.

422 COQUILLES MULTIVALVES.

VI. FAM.

OURSINS.

¹ Rumph.
tab. 14. litt. D.
Séba, pl. 15.
n^o. 33 & 37.

² Klein. pl.
16. lett. A. B.

³ Ibid. pl. 10.
lett. H-P.

se prolongent jusqu'à la base ¹. Plus, un grand *Bouclier* de l'espèce des deux premiers, coupé en trois pour faire voir les cloisons intérieures²; & dix *Osselets* en forme de soc dentelé, dont sont composées les cinq doubles dents molaires, & les cinq dents canines du même Ourfin³.

953. Un très-beau *Pavois* d'Amérique, portant près de neuf pouces de long sur sept & demi de large, de forme plate, à pétales plus oblongues & moins bombées que dans les premiers *Boucliers* de l'article précédent, à panneaux quarré-long, larges & bien prononcés; espèce nommée le *grand Pavois applati*, & ayant, ainsi que tous les Ourfins de ce genre, la bouche au centre, & l'anus au bord de la base.



GENRE CINQUIEME.

GATEAUX OU BEIGNETS.

954. **D**eux Ourfins plats de l'Iste de Bourbon, ornés tant en dessus qu'en dessous d'une fleur à cinq pétales, dont l'inférieure a ceci de particulier que les feuilles s'en sousdivisent & se ramifient en plusieurs autres : ils sont percés de part en part de six larges fentes, dont cinq placées près des bords à l'extrémité de chaque pétale, & la sixieme entre les deux pétales de la partie inférieure qui est la plus large * : cette espèce nommée *Pain d'épice*, a la bouche au centre, & l'anús près de la troisieme partie de l'axe. Plus, un Ourfin de même espèce, coupé en trois pour en faire voir le dedans, avec ses osselets.

VI. FAM.
OURSINS

* Klein. pl.
25 & 26.
Séba. pl. 25.
n°. 5 & 6.

955. Trois *Pains d'épice*: sçavoir, un de la *Vera Cruz*, peu commun, à cinq fentes, dont une au-dessous de l'anús, & quatre latérales * ; un plus rare encore, à deux fentes seulement vers le bas, & ayant l'anús près de la circonférence * ; & un de la Barbade, à six fentes, qui ne diffère des deux de l'article précédent, qu'en

* Klein. pl.
11. lett. C.
Gual. tab. 110.
lit. E.
Séba, pl. 15.
n°. 9 & 10.
* Klein. pl.
12. lett. B.

424. COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. ce que les fentes en sont plus longues & moins larges *.

OURSINS.

* Klein. pl.
24. lett. A. B.
Séba, pl. 15.
n^o. 7 & 8.

956. Trois autres : sçavoir, un de la côte Comandel, à six fentes étroites, conservant les piquans capillaires gris - cendré, de forme plus mince & plus platte que les précédens, un de la Barbade, à six fentes, & un de la Vera Cruz à cinq, semblables à ceux de l'article précédent.

957. Quatre Ourfins plats : sçavoir, deux de forme orbiculaire peu régulière, à bords un peu relevés, ornés dans leur partie supérieure d'une fleur à cinq pétales, mais dépourvus de fentes ; espèce nommée *Beignets* ou *Médailles* * ; & deux *Pains d'épice*, l'un à cinq & l'autre à six fentes.

* Rumph.
tab. 14. litt. E.
Gual. tab. 110.
lett. B. C.
Séba, pl. 15.
n^o. 15 & 26.
Klein. pl. 12.
lett. D.

958. Deux Ourfins rares, de forme plate & circulaire, mais un peu sinueuse dans son pourtour : sçavoir, un de couleur terreuse, à sommet un peu élevé, d'où partent cinq pétales dont les extrémités se partagent en deux lignes qui s'écartent & se prolongent jusqu'à la circonférence ; le dessin de sa robe, qui imite assez le réseau de certaines toiles d'araignée, lui a fait donner le nom d'*Arachnoïde* * : la bouche en est au centre de la base, & l'anus à la circonférence ; & un *Arachnoïde* différent en ce que la couleur en est lie de vin noirâtre, la forme plus platte, les extrémités des pétales moins divergentes, & que l'anus en est placé un peu en dessus.

* Ibid. pl. 11.
lett. A.
Gual. tab. 110.
lett. G.

GENRE SIXIEME.

R O T U L E S.

959. **T**ROIS *Rotules*, dont une rare, à sommet un peu élevé, orné de cinq pétales assez semblables à la fleur du jasmin, & à douze rayons dans la moitié de sa circonférence; espèce nommée l'*Oursin solaire* * : la bouche est placée comme dans ceux du genre précédent, mais l'anus est à la troisième partie de l'axe; & deux peu communes, de forme plus aplatie, ornées dans la moitié de leur circonférence d'onze échancrures, trois desquelles sont plus profondes; ces Oursins ont aussi deux fentes latérales vers la partie non échancrée *.

960. *Idem*, à ces différences près que l'*Oursin solaire* n'a que dix rayons, & que l'une des deux autres *Rotules*, a trois échancrures dans la partie de la circonférence qui en est ordinairement dépourvue.

961. Un grand Carton très-intéressant, contenant quarante petites boîtes de différentes parties séparées d'Oursins, de tous les genres précédens: sçavoir; 1°. des Oursins coupés en divers sens pour en faire voir les parties intérieures: 2°. les dents & les osselets de plusieurs

VI. FAM.
OURSINS.

* Rumph.
tab. 14. litt. I.
Klein. pl. 12.
lett. C.
Séba, pl. 15.
n°. 15 & 16.

* Klein. pl.
12. litt. A. B.
Gual. tab. 110.
lett. H.
Séba, pl. 15.
n°. 17 & 18.

426 COQUILLES MULTIVALVES, &c.

VI. FAM.
OURSINS.
* Séba, pl.
23. n°. 12.

espèces, formant ce que l'on appelle la *Lanterne d'Aristote**, dont une entière, & les autres séparées; 3°. des piquans de toutes grandeurs, parmi lesquels il s'en trouve deux espèces extrêmement rares, dont on ne connoît point les Oursins; l'une est cylindrique, granuleuse & remarquable par des espèces d'anneaux ou de moulures dentelées, placées à distances égales; l'autre espèce est en forme de fuseau, à stries longitudinales granuleuses, hérissées de piquans très-pointus, &c. &c.

961. (*bis*) Cinq Bocaux contenant douze Coquilles avec leurs animaux dans l'esprit-de-vin: sçavoir, un *Lépas*, une *Tonne* nommée *l'Oublie*, un *Peigne*, un *Manche de couteau*, une *Came pholade*, un *Dail*, une *Pholade multivalve*, un *Buccin* occupé par un *Bernard l'hermite*, deux *Conques anatiferes*, un *Pouce-pied*, & un *Oursin*.





SECTION SECONDE.

COQUILLES FLUVIATILES.

LES Coquilles d'eau-douce n'étant pas assez nombreuses pour pouvoir suivre ici le même ordre que dans notre première Section, nous les diviserons seulement en deux classes, les *Univalves* & les *Bivalves*. La première de ces classes ne renferme que six familles relatives à celles des Univalves de mer; sçavoir, les *Lépas*, les *Plan-Orbis*, les *Limaçons*, les *Buccins*, les *Tonnes* & les *Vis*. Nous n'en connoissons même que deux dans la classe des Bivalves, qui sont les *Cames* & les *Moules* ou *Tenilles*; ce qui nous engage à n'en point faire de subdivisions.



CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES D'EAU-DOUCE.

962. **V**INGT-SIX petites Boîtes contenant plusieurs Coquilles fluviatiles des trois premières familles : sçavoir , six petits *Lépas* du lac de Genève , blancs , lisses , à tête pointue & recourbée , & à bouche ovale * ; six autres du même lac , différens des précédens en ce que la robe en est réticulée , que la tête s'en élève & recourbe davantage , & qu'on remarque dans le bord opposé au recourbement du sommet , une petite fente ou entaille , qui s'élève jusqu'au quart de la Coquille * ; un autre petit de la forme d'un demi-ovoïde , olive & transparent , orné de trois lignes longitudinales bleues partant du sommet comme autant de rayons* ; deux verd foncé , à stries circulaires inégales , à base presque ronde , & à tête élevée sans être sensiblement recourbée ; quatre de la riviere des Lataniers dans l'Isle de France , dont deux à sommet un peu recourbé , & deux à appendice en demi-cornet ; trois Tuyaux formés d'un amas de petites Coquilles fluviatiles , principalement de *Plan-orbes* & de *Buccins* , de petits brins &
- * Gualt. tab. litt. AA.
- * List. tab. 543. f. 28.
- * Ibid. f. 17.

filamens d'écorce & de bois , lesquels ont servi d'habit & de logement à une *Teigne aquatique* ; huit autres Tuyaux à-peu-près semblables , de la riviere des Gobelins ; trois autres Teignes de la fontaine de Verri près Genève , revêtues de bois & d'écorce ; quatre *Limaçons à bouche ronde* * olivâtres , à zones marron , de forme bombée & élevée , dont un du lac de Genève , un de la Loire , & deux de la Seine ; une petite boîte d'Opercules marron clair , papyracés , provenant de la même espèce de Limaçons ; un Limaçon d'Amérique , du même genre , blanc dans le corps , à base & tête violettes , & à bouche presque triangulaire ; cinq des Indes , de l'espèce du précédent , violets nus de blanc , à bouche formant un peu moins le triangle ; trois *Plan-orbes* fauves des étangs d'Aranjuez * ; trois *Plan-orbes* d'Amérique , dont un blanc , de forme très-renflée , & deux gris ; deux *Plan-orbes* de la riviere des Gobelins , l'un blanc & l'autre marron * ; deux de la Seine ; deux petits du lac de Genève , de forme très-applatie , & à spirale chargée dans son milieu d'une côte mince en vive arrête , & six petites boîtes contenant chacune douze petites *Nérites* de différentes rivieres de l'Europe *.

963. Un Limaçon à bouche ronde d'Amérique , rare , fauve-blanc , marbré par zones de taches quarré-long fauve-roux , à coque

* Arg. pl.
27. f. 2.
Litt. tab. 126.
f. 26.
Gualt. tab. 5.
litt. A.
Séba , pl. 39.
n°. 33 & 34

* Gualt. tab.
4. litt. D. D.

* Arg. pl.
27. f. 8.
Litt. tab. 142.
fig. 41.

* Arg. pl. 27.
f. 3.
Gualt. tab. 4.
litt. LL.
Litt. tab. 136.
f. 38.

430 COQUILLES UNIVALVES.

mince & transparente, umbiliqué, & à lèvres formant dans toute la circonférence de la bouche, un bord très-saillant, mince & plat; & deux Buccins non moins rares, blancs, à coque mince, à fix orbes, dont le premier est remarquable par un double ~~ap~~aplatissement du côté de la bouche, à lèvres sinueuses & retrouffées formant une espèce d'oreille, & umbiliqués.

964. Une Nérîte des Indes, rare, verd foncé, à fix épines forées, placées le long du milieu de la spirale, de plus en plus grandes à mesure qu'elles approchent du bord; la dernière de ces épines est plus longue que la Coquille

* Arg. pl. 7. même, qui conserve encore son opercule *.
E. 2.

965. Deux Nérîtes rares, dont une verd de terrasse nuée de brun vers la tête & les bords, à stries fines transversales, à lèvre intérieure dentelée, & extérieure finissant en une espèce d'oreille ou d'umbilic *; & une de même espèce, polie & devenue blanche en dessus.

* Gualt. tab.
lit. HP.

966. Une très-grande Nérîte du Mississipi, verd-noirâtre, ventrue & umbiliquée, à stries inégales en forme de rides, qui partant d'un peu au-dessous de la clavicule, viennent toutes se perdre dans l'umbilic; espèce connue sous le nom d'*Idole* *.

* List. tab.
125. f. 25.

967. Une *Idole* un peu moins grande que la précédente, dépouillée de son épiderme, & mi-partie de fauve & de blanc.

968. Un Carton contenant dix-huit petites boîtes de Buccins fluviatiles : sçavoir , deux du Mississipi , rares , de forme oblongue , à bouche étroite & sinueuse , dont un revêtu de son épiderme verdâtre , l'autre dépouillé & gris de lin ; un des Indes , ventru , blanc sale , marbré par taches longitudinales , & quelques zig-zags de rouge-brun ; deux autres des Indes , de forme un peu moins renflée , & plus petits ¹ ; un grand des fossés de Genève , blanchâtre , ventru , à coque mince & clavicule très-pointue ² ; deux des canaux d'Aranjuez , semblables au précédent , à cela près qu'ils sont plus petits & moins ventrus ³ ; deux de la Loire , & deux de la Seine , à-peu-près semblables ; deux petits des fossés de Genève , papyracés , à coque blonde & transparente ⁴ ; trois du même endroit , fort ventrus , à bouche encore plus évasée , & regardés par M. d'Argenville comme de petites *Tonnes fluviatiles* ⁵ ; deux d'auprès de Valence en Espagne , blanc de lait , à sept orbes renflés & à petit umbilic ⁶ ; deux fort petits du lac de Genève , blancs , ventrus , à bouche ronde ⁷ ; quatre de la Marne , & seize de la Seine , à-peu-près de même forme ; deux colorés de la riviere de S. Thomé aux Indes orientales ; cinq de la Virginie , en forme de *sabots* , à petite côte aiguë sur le milieu du dernier orbe ⁸ ; six de la Lézarde ; deux de l'Isle de France , peu com-

¹ Gualt. tab. 5. litt. N.

² Ibid. litt. L.

³ Ibid. litt. I.
List. tab. 123.
f. 21.

⁴ Ibid. f. 23.
Gualt. tab. 5.
litt. F.

⁵ Arg. pl. 27. f. 7.
List. tab. 123.
f. 22.

Gualt. tab. 5.
litt. G.

⁶ List. tab. 108. f. 1.

Gualt. tab. 5.
litt. SS.

⁷ Ibid. litt. B.

⁸ List. tab. 111. f. 5.

432 COQUILLES UNIVALVES

mun, verd foncé, à sept orbes couronnés de tubercules aigus en forme d'épines, & nommés *Thiarses fluviatiles* * ; & cinq petites *Thiarses* fauves de la riviere de S. Thomé.

* Arg. pl. 27.
f. 6.
Rumph. tab.
33. litt. FF.

969. Vingt Coquilles fluviatiles : sçavoir, deux Buccins blancs, nués de gris de lin, marbrés par flammes longitudinales de marron, à tête couleur de rose, & à six orbes renflés; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article précédent; un des Indes, à bouche presque ronde, gris de lin tacheté par zones de rouge-brun; un autre rare, blanc rayé par zones de fauve, à neuf orbes, dont les cinq derniers forment une clavicule aiguë, & les quatre autres renflés, finissant par une bouche ovale à doubles lèvres retroussées en dehors, à stries fines longitudinales, & umbiliqué; deux petits peu communs, à cinq orbes renflés, terminés par une bouche saillante & toute ronde * ; deux *Thiarses* semblables aux antépénultiemes de l'article précédent; une plus petite, marron clair; une rousseâtre, grande & ventrue, à coque épaisse; une autre fauve; une petite blanche nuée de fauve, rare en ce que les épines qui couronnent les orbes, en sont moins nombreuses & plus régulièrement disposées; une Vis des Indes, rare, fauve-blond, marbrée par flammes longitudinales de rouge-brun, à cannelures en même sens, & à stries circulaires très-fines * ;
&

* Arg. pl.
27. f. 6.

* List. tab.
117. f. 12.

& cinq petites Vis brunes de la riviere de S. Thomé , à stries longitudinales & transversales formant un rézeau granuleux.

CLASSE SECONDE.

BIVÂLVES D'EAU-DOUCE.

970. **C**INQ Cames fluviatiles , de forme à-peu-près ovale: sçavoir , deux grandes & fort épaisses du Mississipi , dont une revêtue de son épiderme noir , à grosses côtes obliques & onduleuses en forme de rides , à stries circulaires fines & serrées , blanche nacrée en dedans , & à charniere formée dans l'une des valves , d'une très-grosse dent striée sous le sommet , & d'une longue avance latérale , qui s'engraine dans les cavités & la rainure correspondantes de l'autre valve ; & une d'une autre espèce , dépouillée , nacrée d'un très-bel-orient tant au dedans qu'au dehors , & ornée de zones alternatives blanches & couleur de chair : sa charniere diffère de la précédente en ce que la grosse dent des sommets se subdivise en plusieurs lames striées & dentelées dans l'une & l'autre valve * ; une petite des Indes , revêtue en partie de son épiderme brun , qui couvre une très-belle nacre , & à charniere

* List. tab.

150.

434 COQUILLES BIVALVES

formée de deux dents latérales ; une petite des fossés de Genève , à stries fines circulaires , & à robe verte de plusieurs nuances ; & une très-petite du lac de Genève , verd d'eau , de forme plus aplatie , mais du reste semblable à la précédente.

971. Deux Cames du Mississipi , de l'espèce des deux premières de l'article précédent , mais plus grandes.

972. Deux grandes Cames ovales du même fleuve , dont une revêtue en partie de son épiderme noir , qui dans les endroits où il a été enlevé , laisse paroître une très-belle nacre blanche en dehors , jouant l'opale en dedans ; & une dépouillée jouant l'opale tant en dehors qu'en dedans , & déployant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : leur charnière est de la première espèce décrite dans l'article 970.

973. Vingt-deux Moules ou Tenilles fluviales : sçavoir , deux grandes Tenilles d'étang , à coque très-mince , lisse , traversée de quelques rides , à sommet placé vers l'extrémité la plus large , & à charnière formée d'un filet longitudinal & d'une rainure correspondante peu sensible , toutes deux nacrées , & l'une re-

* List. tab. vêtue de son épiderme verdâtre * ; une autre
156. f. 11.
Gualt. tab. 7. moins grande , mais plus bombée , à coque plus
Lit. F. épaisse , conservant en partie son épiderme noirâtre : la charnière est encore moins sensible qu'aux

précédentes *; deux grandes du Mississipi, à bord sinueux dans son milieu, à léger fillon s'étendant de la tête à cet endroit, à coque très-épaisse, & à charniere de la premiere espèce décrite article 970 : l'une est blanche & dépouillée, l'autre conserve son épiderme noirâtre *, une de la riviere de *Connel* en Ecoffe, & deux des rivieres d'Irlande, blanches, revêtues de leur épiderme verdâtre, & aux valves desquelles adherent de très-petites perles; deux de la Vologne en Lorraine, de forme un peu large & renflée, revêtues de leur épiderme noirâtre; & une petite boîte contenant douze perles provenant des Moules de cette espèce; deux de la riviere des Gobelins, à bords sinueux d'un côté, à coque mince, revêtue de son épiderme verd clair *; une de la Loire, dépouillée, & d'une très-belle nacre *; une du Tage, de forme moins allongée, & deux de la Seine, oblongues, toutes trois dépouillées *; deux du Danube, jaune-verdâtre, rayonnées *; une de la Marne, de même couleur, mais non rayonnée *; deux petites du lac de Genève, papyracées, de forme très-applatie, & à bords sinueux; & une très-petite des fossés de Genève, de forme à-peu-près semblable, à stries transversales onduleuses & égales.

* List. tab.
155. f. 10.

* Ibid. tab.
149. fig. 4.

* Arg. pl. 27.
f. 10.
* Ibid.

* Ibid.

* List. tab.
146. fig. 1.

* Gualt. tab.
7. litt. D.





SECTION TROISIEME.

COQUILLES TERRESTRES.

Ces Coquilles ne formant qu'une seule classe composée des trois familles suivantes, les *Limaçons*, les *Vis* & les *Buccins*, nous suivrons le même ordre que dans la Section précédente, sans entrer dans aucune sous-division.

974 Quatre Limaçons à bouche ronde, & umbiliqués, peu communs : sçavoir, un blanc marbré de jaune - roux, à bande transversale blanche, croisée d'une autre longitudinale de même couleur, à tête élevée, à six orbes renflés, & à lèvre extérieure bordée en dehors d'un gros anneau ou bourrelet *; un plus petit, qui en diffère d'ailleurs en ce que son sommet est moins élevé, que sa robe est blanche, à stries fines circulaires, & ornée dans le milieu d'une bande marron; un à-peu-près de même forme, à robe bariolée en rézeau de blanc & de fouci, à pas des orbes bordés d'une suite de petits quarrés blancs & orangés, à base blanche ter-

* List. tab.
53. f. 48.

COQUILLES TERRESTRES. 437.

minée par une large bande orangé , & à lèvres retroussées en dehors ; & un à tête élevée , à bandes circulaires gris-bleuâtre , fauve & marron , à lèvres faillantes & presque applaties.

975. Un Limaçon rare de la Chine , gris de lin , à bouche & pas des orbes bordés d'une petite zone blanche , & ceint dans le milieu du corps , d'une autre de même couleur qu'une ligne blanche bordée de rouge , traverse en forme de croix. M. d'Argenville a rangé cette Coquille parmi celles de mer *.

* Arg. pl. 6.
lett. B.

976. Six jolis Limaçons à bouche presque ronde , & peu communs : sçavoir , un de la Chine , verd nué de violet , à pas des orbes couronnés de rayons blancs , dont plusieurs se prolongent sur le corps en zig-zags jaunes , & à deux petites bandes longitudinales de même couleur vers l'extrémité du premier orbe ; & cinq d'Amérique , dont deux jonquille , à bouche & pas des orbes bordés de rouge & de blanc , & de plus ornés d'une petite bande longitudinale blanche vers le milieu du premier orbe * ; un fauve , à bouche & pas des orbes bordés de brun , & orné dans le milieu du corps d'une petite zone blanche bordée de brun ; & deux verd foncé , l'un desquels a la bouche & les pas des orbes bordés de jaune pâle.

* Liff. tab.
ss. f. 60.

977. Un gros Limaçon à bouche presque ronde , rare , à robe marron , imitant la cou-

438 COQUILLES TERRESTRES.

leur & l'éclat de la fardoine, à quatre zones blanches dans le corps, dont la dernière se prolonge sur tout le bord de la spirale jusqu'à la clavicule, & à lèvre extérieure en bourrelet *.

44

978. Un autre de l'Amérique méridionale, non moins rare, à robe marron, ornée vers le bas d'une large zone blanche, qui s'étrécissant à mesure qu'elle s'élève davantage, se change à la naissance du premier orbe, en une simple ligne jaunâtre jusqu'à la clavicule qui en prend la couleur, à bouche rouge de corail clair, &

* Séb¹, pl.
40. n^o. 6 & 7.

à lèvre extérieure large & retroussée *.

979. Deux gros Limaçons à bouche presque ovale, peu communs, dont un a deux larges zones dans le corps, l'inférieure rousse, & la supérieure fauve, qui se prolongent sur tous les orbes : l'autre à robe blanche, tous deux à clavicule brune, de forme large, umbiliqués & de l'espèce nommée *Œil de bœuf* *.

* Arg. pl.
6. lett. E.
Gualt. tab. 1.
itt. A.

980. Deux grands Limaçons rares, à bouche ovale, à zones alternatives marron, & blanches nuées de bleu, à six orbes peu élevés, dont le premier est très-bombé, à large & profond umbilic, & à lèvres bordées d'orangé *.

* Séba, pl.
40. n^o. 3 & 4.

981. Six Limaçons de l'espèce des précédents, sçavoir, un grand couleur de noisette, à bouche bordée en dedans d'aurore vif, & en dehors de blanc, ainsi que l'intérieur de l'umbilic qui

est très-large , & à pas des orbes un peu concaves * ; un verd clair , à quelques bandes longitudinales brunes ; un rayé par zones de verd clair & de marron ; un noisette & un marron , à zones brunes peu prononcées ; & un fauve de diverses nuances , à deux zones étroites brunes , dont la dernière se prolonge sur tous les orbes , & à umbilic moins grand que les précédens.

* Gualt. tab.
2. litt. T.

982. Douze Limaçons à bouche ovale : savoir , un verd clair , à deux doubles zones brunes dans le bas du corps , à sommet plus élevé , mais du reste semblable à ceux de l'article précédent ; deux de la côte Coromandel , peu communs , verd plus foncé , à très-petit umbilic , & conservant leurs opercules ; six d'Amérique , à spirales roulées l'une sur l'autre comme dans les Planorbes , à un côté plus concave & umbiliqué , nommés *Cornets de Saint-Hubert* , dont deux rayés par zones de blanc & de brun ; deux d'olive & de marron , & deux de fauve clair & de marron * ; & trois autres *Cornets de Saint-Hubert* , très-petits , à sept orbes roulés dans un même plan.

* Arg. pl. 28.
f. 6.
Rumph. tab.
27. litt. P.

983. Deux Limaçons rares , à bouche ovale comprimée , & dont le milieu du premier orbe forme un pli en vive arrête : savoir , un blanc-grisâtre , à robe très-finement réticulée , à quatre orbes presque dans un même plan , à sommet applati & à base un peu convexe * ; & un

* Gualt. tab.
68. litt. E.

440 COQUILLES TERRESTRES

gris-de-lin rayé de brun , à peu près de même forme , mais un peu plus convexe , à stries longitudinales obliques granuleuses & à lèvre extérieure en bourrelet.

* Séba, pl.
40. n°. 22 &
23
Litt. tab. 76.
p. 76.

984. Deux autres non moins rares & umbiliqués , l'un de forme large un peu aplatie , à robe fauve clair , ornée par zones de chevrons canelle & rouge-brun , & à bouche en demi-ovale , dont les lèvres sont légèrement retroussées * , l'autre de forme plus élevée , à clavicule aplatie , à robe fauve-roux , chargée de plis fins & onduleux blancs en forme de rides , à bouche ovale sinueuse , & à lèvres très-saillantes en dehors.

985. Un Limaçon rare , blanc , à petite bouche demi-ronde s'ouvrant du côté où est placée la spirale , à lèvre extérieure retroussée , armée de quatre dents , & intérieure de deux seulement , de forme convexe des deux côtés , & à spirale marquée d'un simple sillon orangé très-

* Arg. pl. étroit *.
28. f. 13 & 14.
Litt. tab. 99.
f. 100.

Bonan. cl. 3.
fig. 334.

986. Un autre Limaçon rare , fauve-roux , de forme aplatie , à six orbes un peu renflés , dont le plus bas est marqué dans son milieu d'un pli en vive arrête , à base dont le centre est umbiliqué , & à bouche dont les deux lèvres retroussées & sinueuses imitent assez les amfractuosités de l'oreille , & finissent par une ef-

pèce de goutière qui se jette dans l'ombilic *,
espèce nommée le *Labyrinthe*.

* Séba, pl.
40. n°. 24 &
25.

987. *Idem*.

988. Six jolis Limaçons peu communs : sçavoir, deux à bouche demi-ovale, de forme aplatie, blancs bariolés de traits obliques fauves, à deux zones marron, dont la plus élevée se prolonge sur toute la spirale, à lèvres faillantes un peu sinueuses, & umbiliqués * ; un fauve à bouche demi-ronde, à six orbes roulés l'un sur l'autre, s'enfonçant dans le milieu qui est umbiliqué d'un côté, & à lèvres un peu retrouffées, nommé le *Cornet de chasseur* * ; un à bouche demi-ovale, armée d'un côté d'une dent, à robe fauve, bordée le long de la spirale d'une zone blanche, à tête un peu élevée, & à lèvres blanches retrouffées ; un fauve orné sur le milieu du corps d'une zone orangé, à tête aplatie, & à lèvres très-peu faillantes en dehors ; & un blanc à stries fines circulaires, & à tête médiocrement élevée.

* Ibid. n°. 55.

* Gualt. tab.
3. litt. M.
Rumph. tab.
27. litt. R.

989. Dix-huit Limaçons peu communs : sçavoir, deux blancs à bouche demi-ronde, à cinq orbes affaîlés dans le milieu, à lèvres faillantes, précédées d'un renflement transversal, & umbiliqués ; un de Valence en Espagne, à bouche demi-ronde peu retrouffée, blanc, à deux zones marron dans le bas du corps, bariolé dans le reste de traits & de zones fauves ; deux

442 COQUILLES TERRESTRES.

- blancs à bouche demi-ronde comprimée , à six orbes aplatis du côté de la clavicule qui est brune , renflés & umbiliqués de l'autre , & à
- * *List. tab.* pli en vive arrête sur le milieu du premier orbe * ;
65. f. 62.
- un petit à peu près de même forme , mais à clavicule moins affaïssée , à bouche demi-ovale , & à lèvres sinueuses retroussées , dont l'intérieure forme une espèce de dent ; deux fauves de Geneve , à bouche sinueuse triangulaire , à sept orbes affaïssés du côté de la clavicule , & umbiliqués de l'autre * ; deux de l'espèce des deux premiers de l'article précédent ; & huit *Lampes antiques* par pendans , dont deux fauve-roux nuées & bordées de fauve clair , de forme renflée , à bouche sinueuse en forme d'oreille , à lèvre intérieure garnie d'une grosse dent , &
- * *Gualt. tab.* extérieure de quatre petites * ; deux fauve-roux
3. litt. R.
- * *List. tab.* à lèvre extérieure garnie seulement de deux
98. f. 59.
- * *Arg. pl.* dents * ; deux petites de Geneve , noisette , à
28. f. 9.
- List. tab.* 83. bouche sinueuse garnie de trois dents , imitant
f. 87.
- * *Ibid. tab.* encore mieux l'oreille que les précédentes * ; &
93. f. 93.
- deux du Mexique de l'espèce qui rampe sur le Cedre , à bouche demi-ovale , à zones alternatives blanches & brunes , à six orbes un peu élevés , dont le plus bas forme dans son milieu un pli en vive arrête , & à lèvres en bourrelet recouvrant en partie l'ombilic *.
- * *Ibid. tab.*
69. f. 66.
990. Quatre Limaçons à bouche demi-ovale , peu communs , dont deux fauves nués de blanc ,

à six orbes un peu renflés, à lèvres saillantes en dehors, & recouvrant l'ombilic, à bouche placée dans l'un de droite à gauche, & de gauche à droite dans l'autre, formant ainsi l'*Unique* & la *Contre-unique* de cette espèce; & deux fauve-brun, remarquables par un enfoncement transversal au milieu du premier orbe, laissant un repli intérieur, & à bouche garnie d'une grosse dent.

991. Dix gros Limaçons d'Amérique, à bouche demi-ovale, & par pendans: sçavoir, deux blancs de forme bombée, marron foncé en dedans, & à lèvre extérieure retroussée, nommés l'*Oignon blanc* *; deux blancs teints en dedans de fauve, & de bleu vers la clavicule, à six orbes très-renflés, & à tête un peu élevée; deux marron clair, à zones brunes fines & nombreuses, & du reste semblables aux précédens*; deux de l'espèce commune, blancs fasciés de fauve, l'un desquels conserve son opercule *; & deux marron foncé, à six orbes aplatis, dont le premier a le milieu plié en vive arrête, espèce rangée aussi parmi les *Lampis antiquæ* *.

* List. tab.
81. f. 83.

* Ibid. tab.
43. f. 40.

* List. tab.
51. f. 46.
Gualt. tab. 1.
litt. B. C.

* List. tab.
64. f. 61.
Gualt. tab. 3.
litt. I.

992. Quinze Limaçons à bouche demi-ovale: sçavoir, un rare, blanc nué dans une large zone d'orangé, de forme aplatie, quoiqu'à orbes renflés, à lèvres en bourrelet, garnies d'un côté d'une petite avance intérieure; un blanc teint

444 COQUILLES TERRESTRES.

de fauve, de forme plus bombée, & à lèvres en bourrelet, garnies d'un côté de quatre à cinq

* Liff. tab. 94. fig. 25. dents * ; un blanc qui ne diffère du précédent qu'en ce que la bouche en est plus large & dé-

pourvue de dents ; deux blancs & un fauve, à

* Scba, pl. 40. n°. 9. Gualt. tab. 3. litt. G. six orbes un peu affaîssés & umbiliqués * ; un

mais sans umbilic, à spirale bordée de bleu céleste, à bouche très-étroite, à lèvre extérieure retroussée, échancrée, & sous laquelle on re-

* Scba, pl. 40. n°. 30. marque deux dents * ; un de l'espèce de celui

de l'article 978, mais dont la bouche est bordée de noir ; un comme les deux premiers de l'article 988 ; un qui en diffère en ce que le sommet en est moins affaîssé ; deux *Lampes antiques* de l'espèce des dernières de l'article 991 ; trois des variétés décrites à l'article 989. Plus un Limaçon coupé transversalement pour en faire voir la columelle & les spires intérieures.

993. Onze très-jolis Limaçons de la Chine, à bouche demi-ovale, à cinq orbes un peu renflés, & légèrement umbiliqués, dont un blanc, quatre citron, & cinq de diverses nuances de noisette & de marron, tous ornés dans le milieu du corps d'une zone ou double zone d'autres couleurs tranchantes sur le fond, se prolongeant jusqu'à la clavicule, & un blanc en en-

* Ibid. pl. 39. n°. 1-8. Arg. pl. 28. tier *.

f. 10. Gualt. tab. 3. litt. D-E. 994. *Idem*, à de légères différences près

COQUILLES TERRESTRES. 445

dans les couleurs des zones & du fond.

995. Un carton contenant soixante-deux petites boîtes de Limaçons de jardins, prés, bruyères & forêts de l'Europe & de l'Amérique, de diverses espèces, couleurs, formes & grandeurs, jusqu'à la dernière petiteffe, avec les étiquettes des lieux d'où toutes ces Coquilles ont été prises¹. On y trouve les espèces nommées la *Luisante*, la *Livrée*², &c. &c.

¹ List. tab. 52. n°. 47.
Ibid. tab. 58.

996. Sept Limaçons : sçavoir, deux très-beaux de la Chine, de l'espèce de ceux de l'article 993, dont un marron clair à large zone blanche se prolongeant sur toute la spirale, & un blanc à zone étroite brune dans le milieu du premier orbe, mais ne se prolongeant pas plus loin ; & cinq *Limaçons-Sabots* à bouche demi-ovale, dont deux gris-de-lin, à base & clavicle brunes, & à spirale bordée d'un lizeré de même couleur³ ; & trois ornés sur tous les orbes de zones alternatives blanches & rouge-brun, plus ou moins larges, tous à sept orbes & à lèvres relevées en tranchant.

n°. 54.
Gualt. tab. 1.
litt. C-Q.
Ibid. tab. 2.
litt. A-F.
² Arg. pl. 24.
28. f. 4 & 8.

³ List. tab. 16. f. 11.
Gualt. tab. 4.
litt. L.

997. Vingt-quatre Buccins ; sçavoir, un rare à bouche ronde & petite, orné de zones marron sur un fond jaune pâle, à six orbes renflés, séparés par des pas profonds, de forme effilée, approchante de celle des *Vis*, & à clavicle émoussée ; un autre peu commun, à bouche ronde assez large, lie de vin foncé, à robe très-

446 COQUILLES TERRESTRES.

* *Litt. tab.* finement réticulée, & umbiliqué * ; douze petits
25. f. 23. tits couleur de chair vif, & du reste semblables

* *Ibid. tab.* au précédent * ; neuf autres de même espèce,
26. f. 24 des environs de Geneve, blanc-grisâtre, dont
Gualt. tab. 4. cinq avec leurs opercules ; & une petite *Unique*
litt. B. ou *Bouche à gauche*, blanche, ornée de deux
zônes canelle sur le premier orbe, & de flammes
longitudinales de même couleur sur les sui-

* *Litt. tab.* vans *.

33. f. 31.

998. Deux Buccins rares en pendant, à bouche presque ovale, blancs nués dans une large zone & par traits longitudinaux interrompus de fauve-roux, à lèvres un peu retrouffées, dont une *Bouche à gauche* & une *Bouche à droi-*

* *Ibid. tab.* te *. Les Hollandois ont nommé cette espèce le
35. f. 34 Pavillon du Prince.
Gualt. tab. 5.
litt. O.

999. *Idem*, à cette différence près que la *Contre-unique* est toute blanche, & l'*Unique* foible en couleur.

1000. Deux Buccins de la forme des précédens, mais un peu moins allongés, dont une
* *Litt. tab.* *Unique* jonquille vif dans le bas, s'éclaircissant
34. f. 33. vers le haut, & à bande longitudinale brune
Gualt. tab. 5. sur le premier orbe seulement * ; & un blanc à
litt. P. zônes gris-de-lin sur le premier orbe, dont la
Arg. pl. 9. plus élevée se prolonge sur le suivant, & de
lett. G plus orné de deux bandes longitudinales brunes
sur le premier & le second orbe.

1001. Trois Buccins, dont une *Unique* de

COQUILLES TERRESTRES. 447

l'espèce de la précédente , citron vif dans le corps , s'éclaircissant vers le haut , mais dépourvue de bande brune ; & deux blanc-grisâtre , de forme un peu moins renflée & à neuf orbes.

1002. Quatre Buccins : sçavoir , deux *Uniques* , à robe blanc-sale nué de verdâtre , ornée dans le premier orbe de zones jonquilles & bleues , flambée & tachetée par zones de gris-bleuâtre dans les suivans , jusqu'à la clavicule qui est rouge vif ; & deux *Contre-uniques* à clavicule brune , fasciées dans les orbes suivans de blanc-fauve & bleuâtre , de gris-de-lin & de brun.

1003. Quatre Buccins peu communs : sçavoir , deux des montagnes d'Amboine , marron bariolé de blanc , à dix orbes se recouvrant l'un l'autre , ressemblant pour la forme à une grosse Chrysalide un peu comprimée , à bouche demiovale très-étroite , armée de sept dents , & umbiliqués , espèce nommée *Gueule de loup* * ; un grisâtre flambé par bandes longitudinales de marron , de forme allongée , à longues lèvres retroussées en bourrelet , fléchies & sinueuses , ayant de part & d'autre une avance en forme de dent , qui rendent la bouche semblable à une oreille * ; & un de même espèce , entièrement blanc & de forme plus raccourcie. Plus quatre petites boîtes de *Vis-Buccins* , la première contenant une *Unique* de Valence en Espagne ,

* Arg. pl.
9. lett. T.
Rumph. tab.
27. litt. I.
Gualt. tab. 4.
litt. S.

* Litt. tab.
32. fig. 30.

448 COQUILLES TERRESTRES.

blanche, à bouche armée de deux dents sous la lèvre extérieure, & d'une seulement sous l'intérieure; & une *Contre-unique* de même for-

² *Lift. tab. 20. f. 15.* me, mais sans dents ¹: la seconde boîte contient neuf petites *Uniques* de Geneve, blanc-grisâtre, à stries fines longitudinales, & à lèvre

² *Ibid. tab. 41. f. 39.* intérieure armée de deux dents ²: la troisième en contient onze autres de forme plus effilée ³;

Arg. pl. 28. f. 20. & la quatrième, quatorze autres *Uniques* des mêmes lieux, de forme plus courte, ressem-

³ *Lift. tab. 41. fig. altera.* blante à celle des *Enfans au maillot*, & à bouche garnie de trois dents ⁴.

⁴ *Lift. tab. 40. fig. 38.* 1004. Sept *Vis-Buccins* d'Amérique, peu communes pour leur grosseur: sçavoir, cinq à huit orbes médiocrement bombés, à robe ornée dans le corps de zones alternatives plus ou moins larges blanches, gris-verdâtre, rouge & marron, & vers la tête de flammes longitudinales des mêmes couleurs, espèce nommée le

⁵ *Séba, pl. 39. n°. 62-74.* *Pavillon d'Hollande* ⁵; & deux en pendant, de même forme, cerclées dans toute leur robe

Lift. tab. 12. n°. 7. de zones inégales en largeur, blanches, pourpre foncé, aurore, gris-de-lin & citron pâle, à clavicule marron foncé, & de la variété nom-

⁶ *Ibid. pl. 11. lett. M.* mée le *Ruban* ⁶.

⁷ *Séba, pl. 40. fig. 38.* 1005. Deux *Rubans* un peu moins grands, mais dont une *Unique*, & par cette raison très-rare.

Lift. tab. 15. f. 19.

1006. Deux grandes *Vis-Buccins*, dont une très-

très-rare & *Unique* ; grise , à flammes longitudinales rousses , & à robe réticulée * ; & une *Contre-unique* blanche peu commune , à stries longitudinales très-fines , & à clavicule un peu obtuse *.

* Gualt. tab.

6. litt. L.

1007. Un carton contenant quarante-deux boîtes de *Vis-Buccins* de forme très-variée : sçavoir , une rare blanche papyracée , à stries longitudinales très-fines , de forme un peu bombée , à clavicule aiguë , à bouche demi-ovale , bordée de fauve , à lèvres un peu retroussées , & umbiliquée ; une qui ne diffère de celle-ci qu'en ce que sa forme est plus pyramidale , & sa clavicule un peu affaîssée ; une blanc-grisâtre à bouche semblable à celle des précédentes , mais de forme plus effilée ; une fauve , à stries longitudinales , de la forme des *Enfans au maillot* , & à bouche garnie d'une seule dent * ; un *Enfant au maillot* , à stries plus fines , de forme moins renflée & plus cylindrique que le précédent ; une *Vis-Buccin* fasciée dans tous ses orbes de brun & de marron , de forme un peu bombée , à clavicule aplatie , & à lèvres saillantes en vive arrête ; deux de forme plus effilée , blanches cerclées de lignes fauves , à lèvre intérieure ou bas de la columelle convexe & cylindrique , strié transversalement , & laissant derrière un umbilic * ; deux fasciées comme les précédentes , mais à bouche ovale simple ,

* Ibid. tab.

4. litt. R.


* Ibid. litt.

M.

450 COQUILLES TERRESTRES.

- ¹ List. tab. sans stries & sans umbilic ¹ ; une jaune-pâle pa-
^{8. f. 2.}
² Ibid. f. 3. pyracée ² ; deux blanches à bouche presque
ronde, & légèrement umbiliquées ; deux de Va-
lence en Espagne, dont une blanche veinée, &
⁹ Ibid. f. 1. l'autre blanche fasciée de fauve ³ ; dix Vis d'A-
ranjuez de différentes grandeurs, fauve clair ou
⁴ Ibid. tab. grisâtre, à clavicule tronquée ⁴ ; quatre petites
^{17. f. 12.}
Gualt. tab. 4. du même endroit, à coque mince & transpa-
^{litt. O. P. Q.}
Mém. de l'A- rente, à tête effilée, terminée par une clavicule
^{cad. des Sc. an.}
^{1759, pl. 3.}
^{f. 1.} arrondie en mammelon ⁵ ; une boîte de petites
Vis blanches à une zone noire dans le bas ⁶ ;
⁵ List. tab.
^{18. f. 13.} une boîte d'autres de même espèce, mais tou-
^{Mém. de l'Ac.}
^{ibid.} tes blanches ; une de petites Vis fauves de Ge-
⁶ List. tab. neve, ventruës, à six orbes & à bouche garnie
^{19. f. 14.}
⁷ Gualt. tab. de dents ⁷ ; une d'autres de même forme, mais
^{4. litt. F.}
⁸ List. tab. plus effilée & à neuf orbes ⁸ ; une d'autres en-
^{20. fig. 16.} core plus petites, lisses, fauves, à six orbes,
⁹ Arg. pl. 18. nommées *Grain d'orge* ⁹ ; une d'autres à cinq
^{f. 15.}
¹⁰ List. tab. orbes, nommées le *Grain d'avoine* ¹⁰ ; une de
^{22. f. 19.} très-petits *Enfans au maillot* ; & cinq d'autres
variétés, dont deux infiniment petites, trouvées
dans les environs de Geneve. Plus, quatorze
Rubans de couleurs très-variées, & une *Gueule*
de loup.





TROISIEME PARTIE.

Z O O P H I T E S.

QUOIQU'A strictement parler, nous ne connoissons point de véritables *Zoophites*, c'est-à-dire, d'*Animaux-plantes*, nous nous servons du premier de ces noms, consacré déjà par l'usage, pour désigner une certaine classe d'animaux marins, qu'on ne peut regarder ni comme des Insectes, ni comme des Coquillages, ni comme des Poissons proprement dits, mais qui tiennent une espèce de milieu, & dont plusieurs n'ont qu'un sentiment de vie fort obscur.

Nous les rapporterons tous à deux familles, dont la première contiendra les *Etoiles de mer*, & la seconde les autres animaux mous, auxquels M. Linnæus a donné le nom de *Mollusques*.

PREMIERE FAMILLE.

ETOILES DE MER.

Les dépouilles de ces animaux approchent à plusieurs égards de celles des Ourfins; elles sont composées extérieurement d'un cuir calleux souvent hérissé de petites éminences osseuses qui le traversent , & en dedans d'un nombre prodigieux de vertèbres & autres osselets articulés uniformément , soit ensemble , soit avec les éminences osseuses de la peau.


Leur forme , presque toujours radieuse , leur a fait donner le nom d'*Etoiles de mer*. Elles sont à plus ou moins de rayons , chacun desquels est formé ou de deux suites de vertèbres laissant entr'elles un canal plus ou moins large , ou d'une suite de vertèbres presque rondes & percées toutes dans le milieu d'un petit trou qui communique des unes aux autres.

C'est d'après ces caractères généraux
que nous en ferons avec M. Lincké *
deux Sections que nous nommerons
Genres :

* V. son ouvrage de *Stellis marinis*,
Lips. 1733. in-folio.

1°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes fendus en-dessous suivant leur longueur, & dont les unes ont moins de cinq rayons, les autres cinq, & les autres plus de cinq.

2°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes entiers, qui comprennent les *Etoiles vermiformes*, les *Chevelues* & les *Méduses*, que l'on nomme aussi *Etoiles arborescentes* ou *Astrophytes*.



GENRE PREMIER.

ETOILES A RAYONS FENDUS.

1. **S**EPT variétés d'Etoiles à quatre rayons, peu communes, & nommées *Cruciformes* : sçavoir, une des côtes de Barbarie, à rayons de sept pouces de long chacun, à surface supérieure couverte de grains, qui vus à la loupe, font autant de petites houpes cylindriques serrées les unes contre les autres, & bordées de quarrés-longs en relief aussi granuleux : le milieu de chaque rayon s'élevé en forme de côte, & présente ainsi une seconde étoile ; ce qui fait donner à cette espèce le nom d'*Etoile étoilée* : la surface inférieure est recouverte d'un amas très-nombreux de petites pointes ; une d'Amérique, de moyenne grandeur, à rayons larges dans l'origine, & s'étrécissant vers le bout, à surfaces supérieure & inférieure chargées de tubercules ou mammelons garnis de piquans coniques plus ou moins gros, & à bords des rayons formés de mammelons granuleux, plus gros que les autres, espèce nommée *Falciforme* * ; une des Indes, de moyenne grandeur, couverte en dessus d'espèces de pustules granuleuses, qui l'ont fait nommer *Etoile à grains de petite vé-*

* Linck. tab.
31. f. 51.
Rumph. tab.
15. litt. D.
Séba, pl. 5.
n°. 4.

role *; une d'Amérique, à rayons étroits arrondis, plus longs & plus effilés que dans la précédente, contournés, & où l'on remarque à peine la fente longitudinale, qui est bordée de petits grains ovoïdes très-nombreux: les tubercules granuleux de sa surface lui ont fait donner le nom d'*Etoile à grains de millet*; une petite de nos mers, à surface supérieure réticulée & de l'espèce des *Coriacées* *; & deux autres variétés de *Coriacée*, dont une des Indes, à rayons en forme de pétales, recourbés à l'extrémité, nommée de-là *Pétaloïde* *; & une de nos mers, hérissée de petites pointes coniques, & ayant un de ses rayons plus court que les autres.

2. Une *Etoile étoilée* à cinq rayons de sept pouces & demi de long chacun, parfaitement conservée, & des mêmes parages que la première de l'article précédent: son organisation est à-peu-près la même, mais elle en diffère en ce que les bords du dessus y sont armés de piquans courts qui s'élèvent de chaque quarré-long: ces piquans sont un peu courbés vers la pointe du rayon auquel ils appartiennent; le tranchant du pourtour de toute l'Etoile est aussi hérissé de pointes longues couchées dans son plan, & à distances égales les unes des autres, ce qui l'a fait nommer *Pectinée* *.

3. Deux grandes *Etoiles étoilées* à cinq

F f iv

* Linck. tab. 1. n°. 1.

* Ibid. tab. 34. n°. 55.

* Ibid. tab. 30. n°. 50.

* Ibid. tab. 5 & 6. n°. 6. Séba, pl. 7. n°. 21.

Aldrov. de insect. l. 7. p. 748.

rayons ; l'une ne diffère de la première de l'article premier, que par le nombre de ses rayons, l'autre est de l'espèce de la précédente.

4. Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une de nos mers, très-grande & peu commune, à rayons partant d'un disque qui fait donner aux Etoiles où on le remarque, le nom de *Soleil*, revêtus chacun de trois côtes longitudinales épineuses, & de stries transversales, qui s'étendent des épines d'une côte aux correspondantes de l'autre ; espèce nommée *Soleil à treillis épineux** ; deux digitées d'Amérique, qui ne diffèrent de l'*Etoile à grains de millet* de l'article premier, que par le nombre de leurs rayons*, qui d'ailleurs sont inégaux ; cette dernière circonstance les fait nommer *Cometes digitées miliaires* ; une petite de nos mers, à rayons inégaux très-hérissés d'épines, nommée *Comete épineuse* ; deux des mêmes parages, à rayons en forme de pétales, aigus à l'extrémité, hérissés en dessus de petites pointes cylindriques, & qu'on peut nommer *Pétaloïde velue** ; une de l'espèce de celles-ci, mais dont les rayons retrouffés en faisceau & en forme de tulipe, laissent mieux voir la structure de la face inférieure ; & une queuelette d'une semblable, montrant en dessus une espèce d'ouvrage en filigrane très-curieux*, que des fourmis auxquelles on a laissé manger le cuir & le dedans, n'ont point attaqué.

* Linck. tab.
38 & 39. n°.
69.

* Ibid. tab.
28. n° 47.
Rumph. tab.
15. litt. E.

* Linck. tab.
9 & 10. n° 19.

* Séba, pl.
5. n° 3.

5. Une grande Etoile des Indes , à cinq rayons pyramidaux , de forme renflée & très-élevée en dessus , un peu concave en dessous , ornée d'un rézeau , à mailles triangulaires , sur chaque jointure desquelles s'élève un denticule conique , & bordée dans son contour de gros mammelons armés chacun d'un denticule semblable : on nomme cette espèce *gros Pâté réticulé* *.

6. Un *gros Pâté réticulé* d'Amérique , différent de l'espèce précédente en ce qu'il est moins convexe en dessus , plat en dessous , & que les denticules du rézeau y sont plus nombreux , & disposés d'une manière moins régulière *.

* Linck. tab.

41 & 42. n°.

72.

Séba, pl. 7.

n° 1.

* Ibid. pl. 8.

n° 1.

7. Quatre Etoiles à cinq rayons ; sçavoir , deux *Pâtés réticulés* des Indes , peu communs , mais un peu dégradés ; un à sommet pentagone dont chaque angle est terminé par un gros tubercule ; ce qui a fait donner à cette espèce le nom de *Fort pentagone* * ; & un bordé dans son contour & sur le milieu de chaque rayon , de gros tubercules lenticulaires , à robe semée de tubercules semblables , mais moins grands & très-ferrés dans la partie inférieure * ; les rayons de ces deux espèces d'Etoiles se terminent en pointes émouffées ; un *Pâté réticulé* d'Amérique , de l'espèce de celui de l'article cinquième , mais moins grand , & à sommet plus enfoncé ; & une Etoile des Indes , à rayons pyramidaux trian-

* Linck. tab.

26. n° 41.

* Séba , pl.

6. n° 1.

gulaires , bordés tant dans leur milieu que dans leur contour , de piquans assez longs , qui peuvent faire nommer cette espèce *Pyramidale pectinée*.

8. Seize Etoiles à cinq rayons : sçavoir , une pentagone peu commune , bordée en dessus & en dessous de gros tubercules , & ornée en dessus seulement de cinq compartimens de petits tubercules cylindriques , espèce nommée *petite Pâté* * ; un *Pâté réticulé* de moyenne grandeur , à sommet circulaire enfoncé , & à denticules très-nombreux ; trois petites *réticulées lentigineuses* , de forme un peu aplatie , à sommet aussi enfoncé * ; deux *Digitées à grains de petite vérole* , qui ne diffèrent de celles de même nom de l'article premier , que par le rayon qu'elles ont de plus * ; une *Comete digitée miliaire* des Indes ; cinq *Etoiles coriacées* de nos mers , dont trois réticulées * ; une hérissée de petites pointes coniques * , ayant un de ses rayons plus court que les autres ; & une platte à rayons émoussés , & à cavité dans le milieu de sa partie supérieure * ; une petite peu commune , convexe en dessus , concave en dessous , & dont la surface paroît comme chagrinée : elle est ornée à son sommet d'une petite Etoile à cinq rayons , dont les angles saillans répondent aux angles rentrans de la grande * ; une à-peu-près semblable de l'Isle de Sainte-Helene * ; & une
- * Linck. pl. 23. n°. 37.
Séba , pl. 6. n°. 9 & 10.
- * Ibid. pl. 5. n°. 5 & 6.
- * Linck. tab. 8. n°. 10.
- * Ibid. tab. 4. n°. 5.
- * Ibid. tab. 35. n°. 59.
- * Ibid. tab. 34. n°. 57.
- * Ibid. tab. 9. n°. 10.
- * Séba , pl. 8. n°. 3.

qui n'en diffère que par sa forme aplatie.

9. Treize autres : sçavoir , une *Etoilée* rare , aussi mince que le carton le plus fin , dont les rayons grêles sont comme engagés dans une membrane granuleuse , qui lui a fait donner le nom d'*Etoile en patte d'oye* * ; deux petites à *grains de petite vérole* , dont une *digitée* ou à rayons arrondis , & l'autre à rayons aplatis & triangulaires ; une peu commune , à corps plus petit & plus élevé , à rayons plus étroits & moins plats que la précédente , & à robe fermée de tubercules à-peu-près sphériques ; trois de moyenne grandeur de la Méditerranée , *étoilées & peçlinées* * , dont une à sommet élevé en demi-sphère , & à verrue élevée * ; une à cinq bossés aux origines des arrêtes longitudinales formant la seconde étoile , & à dents de peigne relevées toutes en en-haut , & la troisième à sommet & verrue groupés ensemble en bosse irrégulière ; une petite de Curaçao , à dessus plat & granuleux , dans le milieu duquel on observe une petite cavité forcée au centre , & à bords canelés transversalement * ; deux *Digitées réticulées* de la Méditerranée , à rayons longs , partant d'un tronc assez petit * ; deux *Pâtés réticulés* , comme le second de l'article précédent , & un squelette d'Etoile de l'espèce de celui par où finit l'article quatre.

* Linck. tab. 1, n°. 2.
Aldrov. l. 7. de inf. cap. 18. p. 743.

* Linck. tab. 27. n°. 44.
* Lochner rior. Mus. Besslerian. p. 76. tab. 22.

* Linck. tab. 4. n°. 14.

* Ibid. tab. 9 & 10. n°. 16.

10. Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir , une

* Linck. tab.
36. n°. 61.

* Ibid. tab.
21. n°. 15.

* Ibid. tab.
5. n°. 13.

Digitée miliaire de l'Isle de France ; deux *Coriacées* assez grandes , dont une réticulée des mers de Hollande , & l'autre des mers d'Irlande , à rayons plats & rabotteux , chargés en dessus d'une côte longitudinale bien prononcée , & nommée la *Jaune vulgaire de Luid* * ; deux *Pâtés réticulés* de moyenne grandeur , dont un à sommet enfoncé , & l'autre à tronc & lobes aplatis ; deux *Soleils* , dont un à pointes & treillis de moyenne grandeur , à disque du milieu un peu enfoncé , & lobes plus larges à proportion que dans celui de l'article quatre ; un à rayons aplatis , nommé le *Soleil plat coriacé* * ; & une *peçinée* de moyenne grandeur *.

11. Une grande Etoile pentagone de l'Isle de France , qui est une variété rare de l'espèce des *Pâtés* , que nous n'avons trouvé dessinée dans aucun Auteur : elle forme un pentagone régulier de sept pouces de longueur sur un pouce d'épaisseur , chargé en dessus de petits denticules coniques clair semés sur une espèce de réseau , & en dessous d'un compartiment régulier de petits tubercules oblongs , disposés par groupes de cinq à six ensemble , & parallèlement aux deux rainures entre lesquelles ils se trouvent , imitant par-là un ouvrage en mosaïque des plus élégans : les bords en sont très - finement granulés , & coupés dans toute leur largeur par les cinq rainures. Plus, un Carton contenant dix-

huit petites boîtes d'osselets, vertebres, denticules, &c. provenant d'une Etoile de cette espèce.

12. Une Etoile de la Méditerranée, de plus d'un pied de long, à quatre grands rayons triangulaires simples, & un cinquième formant vers son milieu une fourche, & se divisant ainsi en deux plus petits, à la manière d'un des rayons du *Soleil* représenté dans la pl. 40, n°. 70 de Lincke : cette espèce peu commune est du genre des *Pectinées*, & ne diffère de celle de l'article second de notre Catalogue, que par la bifurcation d'un de ses rayons : elle peut se rapporter à celle dont parle Séba *.

* Séba, pl.
B. n°. 2.

13. Une autre de même espèce, un peu moins grande, & semblable, à cela près que la fourche du rayon double, ne commence qu'à une plus grande distance du centre, que l'angle de cette fourche est plus aigu, & les branches qu'elle forme, plus petites.

14. Deux Etoiles peu communes : sçavoir, un *gros Pâté réticulé* à six rayons, dont un plus petit, & moins écarté de ses voisins que les autres, & paroissant naître du dessous en forme de petite queue : il est néanmoins garni de sa rainure longitudinale, partant du centre comme celle des autres ; & une *Etoile en patte d'oye*, qui ne diffère de celle de l'article 9, qu'en ce qu'elle est à six rayons, engagés dans

une membrane encore plus mince , formant un hexagone sinueux.

15. Une Etoile rare de l'Isle de France , de forme hexagone régulière , & qui ne diffère de celle de l'article 11 , que par le lobe qu'elle a de plus.

16. Trois Etoiles : sçavoir , une *Digitée miliare* à six rayons d'inégale grandeur , dont un très-court ; une grande *Coriacée* à sept rayons triangulaires aplatis & épineux : c'est le *Soleil*

* Aldrov. de *digité d'Aldrovande* * ; & une *Coriacée* à large corps circulaire réticulé & hérissé de piquans mousses , d'où partent douze rayons semblables

& courts en dessus , mais plus longs , & naissant d'un cercle plus étroit en dessous , espèce

* Ibid. tab. nommée *Tournesol à douze rayons* *.

17. n°. 28.

Séba, pl. 8.

n°. 5.

Aldrov. ibid.

P. 757.

17. *Idem* , à cette différence près que l'Etoile à sept rayons est encore plus grande , & à bords pectinés.

18. Un rare & beau *Tournesol* de sept pouces de diamètre , à trente-sept rayons en forme de doigts ferrés les uns contre les autres jusqu'à quinze lignes ou environ de distance de la circonférence , à corps rond & élevé , hérissé de petites houppes cylindriques blanchâtres , qui se partagent en trois rangs longitudinaux sur chacun des rayons : cette Etoile qui est de la plus parfaite conservation , vient du beau Cabinet de feu Madame de Boisjournain , qui l'a fait mon-

ter sous une cloche de crystal , dont le pied est en cuivre , & le fond garni d'une glace , au moyen de laquelle on voit très - distinctement la surface inférieure de ce curieux morceau.

19. Deux autres *Tournesols* , dont un à treize rayons en forme de doigts velus & assez longs *, & un qui ne diffère du précédent , qu'en ce qu'il est à trente-huit rayons , & un peu dégradé.

* Linck. tab.
84. n°. 54



GENRE SECOND.

ETOILES A RAYONS ENTIERS.

20. **QUINZE** Etoiles *vermiformes* à cinq rayons : sçavoir , quatre à *queue de lézard*, ainsi nommées de la ressemblance de leurs rayons à la queue de cet animal : ces rayons arrondis en dessus , plats en dessous , sont composés de vertebres articulées ensemble comme par nœuds , & sortent d'un corps lenticulaire aplati , très-remarquable en ce qu'il est chargé d'espèces de petites écailles , dont celles qui se trouvent placées deux à deux à la naissance de chaque rayon , imitent parfaitement les ailes d'une mouche qui

* Linck. tab.
2. n°. 4.
Mém. de l'Ac.
1-12. p. 132.
pl. 7. f. 5.

auroit la tête tournée vers le centre de l'étoile * ; une qui diffère des précédentes en ce que le corps en est pentagone , que les rayons en sont ronds , & que les cinq fentes de la bouche pa-

* Linck. tab.
22. n°. 35.

roissent à peine * ; une de même espèce , bariolée par zones , mais mutilée d'un de ses rayons ; quatre de l'Isle de France , noirâtres , à corps rond granuleux , d'où partent des rayons écailleux comme ceux des précédentes , mais différens en ce qu'ils sont chargés de quatre rangées longitudinales de pointes longues plus

ou

ou moins fines : espèce nommée *Scolopendroïde granuleuse* * ; quatre de l'Amérique , qui ne diffèrent des précédentes qu'en ce que le tronc en est pentagone , & plus petit à proportion * ; & une autre *Scolopendroïde* rare , à rayons chargés de piquans blancs , fins , transparens & granuleux ; forés dans toute leur longueur *.

* Linck. tab.
26. n°. 43.

* Ibid. tab.
27. n°. 46.

* Ibid. tab.
34. n°. 36.

21. Trois Etoiles *chevelues* : sçavoir , deux petites à dix rayons , naissans deux à deux de cinq tiges courtes , composés en dessus de pièces en forme d'anneaux , articulées ensemble , alternativement larges d'un côté , & étroites de l'autre , creusés en dessous en forme de gouttière , & bordés de chaque côté de filets ou petites pattes alternes aussi articulées : les cinq tiges principales sortent d'un petit tronc pointillé , arrondi en dessus en forme de demi-sphère , plat en dessous , & ne montrant aucun vestige de bouche : espèce nommée par Luid *Décapède de Cornouaille* , & par Linck *Rosacée* * ; & une grande de dix-sept rayons organisés comme ceux des précédentes , l'un desquels manque : les seize restans naissent de cinq tiges fort courtes , qui sortent elles-mêmes d'un petit tronc cylindrique , foré dans son milieu , du haut duquel partent en forme de verticille , d'autres rayons courts & déliés , posés dans un plan parallèle aux grands : chacune des cinq tiges principales se divise d'abord en deux : de celles-

* Ibid. tab.
37. n°. 66.

ci, sept se subdivisent en autant de rayons, & trois restent simples, ce qui donne le nombre des dix-sept rayons que nous avons dit devoir se trouver dans cette Etoile : cette espèce, qui a beaucoup de ressemblance avec celle que

* Linck. tab.
22. n° 34.

* Séba, pl.
7. n° 3 & 4.

Lincké nomme *Tête de Méduse brune* *, & la *Lune-marine* de Séba *, pourroit bien n'être, ainsi que la première de cet article, vu le défaut de bouche qu'on y remarque, que l'extrémité d'une tige d'*Etoile arborescente*, différente cependant de celles qui sont connues sous le nom de *Méduses*, ainsi que l'a conjecturé M. Guettard, en parlant du *Palmier marin*.

22. Un rayon d'Etoile arborescente connu sous le nom de *Palmier marin*, portant environ dix-sept pouces de haut, & renfermé dans une case de verre. Ce morceau unique dans son espèce, est extrêmement précieux par le jour qu'il a répandu sur l'origine des *Astéries*, des *Encrinites* & des *Entroques* : il nous vient aussi du Cabinet de feu Madame de Boisjournain, qui l'avoit reçu de la Martinique où il avoit été porté par un Officier qui venoit des Indes, & qui ignoroit dans quelles mers cet animal avoit été pêché : quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il fait époque dans l'Histoire Naturelle, depuis le sçavant & curieux Mémoire que M. Guettard a donné à son sujet. Nous sentant incapables de rien ajouter à l'exakte description qu'en a donnée

cet habile Naturaliste, nous y renvoyons nos lecteurs *.

23. Une très-belle *Tête de Méduse* de la Nouvelle-Espagne, & parfaitement conservée, dont le corps a près de deux pouces de diamètre : l'origine de chacun des cinq gros rayons est chargée en dessus de cinq grosses côtes longitudinales épineuses, & marquée en dessous de trois rangées de points : l'extrémité de ces cinq rayons ou troncs est percée latéralement de deux trous, à l'endroit où se fait la première division en deux grosses branches, qui se subdivisent bientôt après elles-mêmes en deux autres, & ainsi de suite, jusqu'à un nombre prodigieux de ramifications toutes semblables, dont les dernières sont recourbées en forme de cheveux frisés, & donneroient à l'Etoile entière, si elles étoient développées, une extension de près d'un pied & demi : on nomme cette espèce *Astrophite* ou *Méduse à côtes* *.

24. Une autre *Méduse* portée sur un pied de bois des Indes, & renfermée sous une cloche de verre : elle diffère de la précédente en ce que son corps a près de trois pouces de diamètre, & se termine en une espèce d'écusson d'un pourtour très-gracieux, qui a fait donner à cette espèce le nom de *Méduse à écusson* * : les branches & les ramifications de celles-ci se recourbent en dessous, imitant une rose de Jé-

* Mém. de
l'Ac.R. des Sc.
ann. 1755. p.
224. & suiv.
pl. 8. 9. & 10.

* Linck. tab.
18 & 19. n°. 29
30. 31.
Rumph. tab.
16. litt. A. B.
Séba, pl. 9.
n°. 1.

* Linck. tab.
29 & 30. n°. 48
& 49.
Séba, pl. 114
n°. 1.

richo , ou un sphéroïde applati de près de huit
pouces de diametre sur quatre pouces & demi
de haut : ces branches sont armées en dessous
de deux rangées longitudinales de petites stries
transversales , formées chacune de quatre petits
tubercules aigus , & assez ressemblantes à des
pattes de chenille.

SECONDE FAMILLE.


M O L L U S Q U E S.

25. **V**INGT-UN Mollusques desséchés : sçavoir , deux *Polypes* de la mer des Indes , l'un mâle , l'autre femelle , une *Sèche* , un *Calemar* de la grande espèce , une *Holoturie* ou *Verge marine* , deux *Concombres marins* , cinq *Orties de mer* , six *Plumes marines* ou *Verges ailées* , dont trois variétés ; une quatrième variété de *Plume - marine* semblable à une large feuille de roseau , espèce que Séba dit être fort rare * , & deux *Mains de mer*.

* Séba , tom.
3. pl. 16. n^o. 9.

26. Vingt-cinq autres Mollusques dans l'esprit-de-vin : sçavoir , dix *Calemars* de la petite espèce , une *Velette* de la Méditerranée , deux *Anemones de mer* , quatre *Chenilles* ou *Taupes marines* , dont une des parages de Hollande , remarquable par ses poils en forme de pinceaux jouant l'opale * , & trois de la Méditerranée , l'une desquelles adhère à une *Scolopendre* ou *Pinceau de mer* , & à des *Corallines* ; une *Pomme-folle de mer* ; une *Ortie de mer* , des *Concombres* & des *Raisins de mer* ; une *Holoturie* , deux *Sèches* , & trois *Poumons marins*.

* Ibid. pl. 4.
p^o. 7 & 8.



QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES.

CE sont des animaux couverts d'une croûte assez dure, mais molle en comparaison des coquilles ou écailles pierreuses des Testacées. On les divise ordinairement en trois genres, dont le premier comprend ceux qui ont le corps allongé, tels que les *Ecrevisses*, les *Langoustes*, &c. Le second renferme ceux dont le corps est large & évasé, tels que les *Crabes*; & le troisieme les Crustacées à corps arrondi, ou les *Cancres*.



GENRE PREMIER.

CRUSTACÉES A CORPS ALLONGÉ,

1. **U**NE *Langouste* de la mer des Indes ¹, desséchée & parfaitement conservée. ¹ Rumph. tab. 1. lit. A.
2. Une grande *Squille* des Indes, nommée par Rumphius *Squille large* ou *Cancre-ours* ², & une très-grosse *Langouste* de nos mers. ² Ibid. tab. 2. lit. D.
3. Huit Crustacées : sçavoir, une *Ecrevisse* de mer d'Amérique ³, une de Norwege ⁴, une *Squille* sabloneuse de nos mers, de l'espèce appelée *Mante* ⁵; l'*Ecrevisse* nommée *Lion de mer* par Rondelet ⁶; un petit *Cancre-ours*, & une *Chevrette* de nos mers ⁷; une *Chevrette* du détroit de Davis ⁸, & une *Langouste* des Indes, moins grande, mais du reste semblable à celle de l'article premier. ³ Séba, tom. 3. pl. 17. n^o. 3. ⁴ Ibid. pl. 21. n^o. 3. ⁵ Ibid. pl. 20. n^o. 2. ⁶ Ibid. pl. 19. n^o. 19. ⁷ Ibid. pl. 20. n^o. 8. ⁸ Ibid. n^o. 9. & 10.
4. Les mêmes Crustacées de l'article précédent, à l'exception du second & du dernier, qui sont remplacés par une petite *Ecrevisse* de mer d'Amérique; & une grosse *Ecrevisse d'eau douce*.



G E N R E S E C O N D.

C R U S T A C É E S A C O R P S L A R G E E T É V A S É .

5. **U**N rare & beau Crabe d'Amérique, véritable : ses pieds, ses deux longs bras, & le contour de sa coque sont hérissés de pointes, mais ses pinces sont lisses, & au lieu de se terminer en pointe comme dans les autres espèces, leur extrémité est arrondie, un peu concave & dentelée : la partie supérieure de sa coque est couverte de petits mammelons fort serrés, la plupart peu élevés,

6. Deux Crabes rares, l'un de la côte Coromandel, ayant sur le dos une croix très-bien faite, avec deux personnages de chaque côté. Ces Crabes sont rares même dans le pays : on peut voir dans le Pere Kirker *, l'origine merveilleuse qu'il attribue à la croix dont ils sont décorés : l'autre est d'Amérique, à larges taches rouges, & de l'espèce de celui qui est représenté dans Séba *.

* *China illustrata*. p. 35.
* Séba, tom. 3. pl. 19. n^o. 12.

7. Quatre autres Crabes : sçavoir, deux *Saxatiles* d'Amérique, dont un rouge tacheté de jaune pâle, à bras gros & courts * ; l'autre à coque bordée vers la tête de piquans aplatis en

* *Ibid.* pl. 22. n^o. 4.

forme de petites feuilles dentelées , à jambes velues, & à bras épineux ; & deux de nos mers, dont un à pincés en crête de coq, nommé de-là *Coq de mer*¹ ; & un *Poupart*, dont le dos est chargé d'une touffe de Coralline , de l'espèce nommée *Queue d'écureuil*, & de quelques *Glands de mer*.

¹ Séba, tom.
3. pl. 20. n°. 7 & 8.
Rumph. tab.
11. n°. 2 & 3.

8. Sept Crabes : sçavoir , un des Indes, peu commun, hérissé d'épines & de tubercules qui le rendent fort hideux² ; le *Silloné* de Rumphius³ ; deux *Crabes velus*⁴ ; l'un mâle, l'autre femelle ; le premier est presque totalement recouvert par un *alcyon* de substance fongueuse & coriacée ; deux *Coqs de mer*, l'un mâle, l'autre femelle ; & un d'Amérique, de l'espèce du second de l'article précédent, remarquable par une cicatrice qu'il a sur le dos, & par une pince naissante qui remplace celle qui lui a été enlevée par quelque accident.

² Ibid. tab. 9.
³ Ibid. tab. 6.
litt. O.
⁴ Ibid. tab.
11. n°. 1.

9. Vingt-deux petits Crabes, formant quatorze variétés, entr'autres un Crabe de la Chine, à rides granuleuses, très-rare. Plus, la dernière articulation d'une des jambes postérieures d'un Crabe de Sicile, garnie de son ongle, & recouverte de longs poils soyeux couleur d'or⁵.

⁵ Séba, tom.
3. pl. 18. n°. 14.




GENRE TROISIEME.


CRUSTACÉES A CORPS ARRONDI.

* Rumph. tab. 12. list. A. B. 10. **U**N Cancres des Moluques * parfaitement conservé dans une boîte vitrée.

11. Un grand & très-beau *Cancres squinado* * Séba, pl. de la Méditerranée *, couronné d'un groupe considérable de Glands de mer.

12. Vingt-deux Cancres de moyenne grandeur & petits : sçavoir, quatre variétés de Cancres squinades, dont un à longs bras; une *Araignée de mer*, à coque lisse & à bouche pointue*; * Ibid. pl. 19. n°. 4 & 5. une à coque triangulaire *, & trois à coque granuleuse *; * Ibid. pl. 20. n°. 13. sept autres petits Cancres, un *pou de mer*, & un *Bernard l'hermite* dans un bûrgau.





CINQUIEME PARTIE.

P O I S S O N S.

1. **U**N *Chien de mer* de cinq pieds de longueur, & un gros *Poisson armé* ou *Porc-épic* de mer *, desséchés & bourrés.

* Séba, tom.
3. pl. 23. n°
1 & 2.

2. Deux *Porc-épics* de mer : le corps de l'un est rond comme un ballon, celui de l'autre est de forme ovoïde.

3. Trois gros Poissons desséchés : sçavoir, un *Diable de mer* *; l'*Orbis* à tête de lièvre de Grew *, & un *Porc-épic* de mer.

* Jonst. tab.
47. f. 4 & 5.
* Grew. Mus.
p. 108. tab. 7.

4. Trois Poissons desséchés, l'un peu commun, est la petite *Licorne de mer* du Brésil *; les deux autres sont deux variétés de *Porc-marin*, dont une de la Méditerranée *, & l'autre des Antilles, à grandes taches blanches sous le ventre.

* Ibid. p. 104.
tab. 7.

* Salvian.,
Hist. aquatil.
tab. 76.

5. Vingt-deux autres Poissons desséchés : sçavoir, cinq variétés de *Poissons-coffre*, dont trois triangulaires & deux quadrangulaires; deux petits *Poissons-armés*, l'un quadrangulaire, l'autre sphérique; la *Pastenaque* nom-

Grew. Mus. p.
113. tab. 7.

mée l'*Aigle*; deux *Rémores* ou *Sucets*; une *Hirondelle de mer*; deux variétés de *Trompette*; un *Hippocampe* ou *petit Cheval marin*; un *Serpent marin*, un *Humantin*, un *Rouget*, un *Malarmat*, un *Baliste Scolopax*, un *Rana Piscatrix*. Plus, une petite *Raye*, ajustée en forme de *Basilic*.

6. Quarante - quatre petits Poissons, les uns desséchés, les autres dans l'esprit-de-vin, tels que *Poissons dorés de la Chine*, *Rémores*, *Scorpions-marins*, *Poissons-volans*, plusieurs variétés de *Balistes*, &c. Plus, un *Basilic factice*.

7. Une Défense de *Narwal*, de près de sept pieds de longueur.

8. Un Membre de *Baleine*, de six pieds de longueur.

9 Une très-belle Défense de *Poisson-scie*, de quatre pieds quatre pouces de longueur, & une Vertébre de *Baleine*.

10. Une Gueule de *Lamie* ou *grand Chien de mer*; une Tête de *Dauphin*, & deux Défenses, l'une de *Scie*, l'autre d'*Espadon*.

11. Les Machoires de six Poissons : sçavoir, celles de la *Zygène* ou *Marteau*, celles du *Requin*, du *Loup - marin*, du *Dauphin*, de la *Bécune*, de l'*Espadon* avec sa Défense, & une Défense du *Poisson Scie*.

12. Sept parties osseuses de différens Poissons; sçavoir, une prétendue *Main de Syrene*,

qui n'est autre chose qu'une nageoire de Baleine ; un os de la tête de la Baleine , nommé l'*Os de l'ouie* ; le Membre d'une *Vache-marine* : il est de nature osseuse , & long de dix-neuf pouces. Bartholin en fait grand cas pour certaines maladies , étant pris en poudre* ; la Queue de quelque long Poisson plat , qui paroît être du genre des Murènes , ayant trois pieds & demi de longueur ; une Vertébre de Baleine , une Tête de Dauphin , & une Machoire de Requin.

* Barthol.
Hist. ana. Gen-
tur. II.


13. Trente autres parties détachées de différens poissons : sçavoir , des Machoires de Raye , de jeunes Requins , de Dauphins , &c. des Dents de Cachalot , les Vertébres d'un autre poisson , des Ovaires de Rayes , des Fanons de Baleine , un lambeau de la peau de la grande *Aiguille de mer* , & divers Os de poissons , entr'autres un peu commun , que l'on croyoit autrefois provenir de la *Rémora**.

* Mus. Worm.

P. 270.

14. Le Palais d'une espèce de Raye de la Chine , composé d'osselets de diverses formes , les uns épineux , les autres granuleux , & couronné de maniere à représenter deux espèces de Buccins : ce morceau est rare & curieux.





SIXIÈME PARTIE.

AMPHIBIÈS.

1. **U**N grand Serpent d'Amérique , à écailles larges , variées de blanc , de brun , & de noir : il est , ainsi que tous les suivans , dans l'esprit-

* Séba, tom. de-vin *.

2. pl. 75. n°.

20

2. Deux *Serpents-javelots* des Indes , à corps grêle d'environ trois pieds de longueur : on les nomme dans le pays *Cobra verde* , à cause de leur belle couleur verte plus foncée sur le dos que sous le ventre : ces deux nuances sont séparées dans l'un par deux raies longitudinales blanches qui régneront depuis la tête jusqu'à environ six poutes de l'extrémité de la queue : l'autre à quelques raies semblables sous le ventre.

3. Deux Serpens , dont un des Indes , verd taché de noir , à deux raies blanches sous le ventre , & un de Surinam , cerclé de bandes noires & grises d'inégale grandeur.

4. Deux autres Serpens , dont un cerclé de

larges bandes noires & blanches, nommé *Serpent d'Esculape* * ; & un de l'espèce du premier de l'article précédent. * Séba, tome 2. pl. 18. n. 4.

5. Cinq Serpens, dont un femelle du Cap-Verd, un d'Amérique, un de Madagascar, un du Japon, & un du pays.

6. Six autres: sçavoir, deux des Indes, deux d'Amérique, dont un bleuâtre, orné sur le dos d'une suite de taches noires disposées par ondes, & de deux suites latérales de taches plus petites, l'autre est cerclé de bandes noires & grises; un orné de bandes longitudinales de diverses couleurs, & un *Serpent aveugle* de notre pays.

7. Deux *Amphisbenes* ou *Doubles-Marcheurs*, dont un de Ceylan, couvert de petites écailles rousses, & à queue presque d'égale grosseur avec la tête, & l'autre d'Amérique, orné sur le dos d'une large bande onduleuse noire, marbré sur les côtés de noir & de bleuâtre. Son corps est presque d'une égale grosseur jusqu'à un pouce de distance de la queue qui finit en pointe obtuse.

8. Quatre Serpens d'Amérique, dont un *Cæcilia* dépourvu d'écailles, & à petits anneaux marquetés de brun & de blanc * ; un ceint de bandes alternatives, dont les unes sont entièrement noires, tandis que les autres sont bleuâtres sur le dos, jaunâtres sous le ventre: il est * Séba, pl. 22. n. 3.

rare & remarquable en ce que sa queue est aplatie ; & deux à queue pointue , ceints d'anneaux blancs & rougeâtres. Plus , une queue de *Serpent-sonnette* , & deux petits Orverts de notre pays.

9. Deux Viperes en pendant , l'une mâle ,

¹ Aldrov. de l'autre femelle ¹.
serp. lib. 1. p.
115 & 116.

10. Un Serpent à deux têtes , très-rare. Ce monstre diffère de ceux qui sont représentés

² Ibid. p. 60.
³ De serpenti-
b. tab. 1.

⁴ Mus. mu-
seor. tab. 33.
f. 3.

dans Aldrovande ² , Jonston ³ & Valentin ⁴ , en ce que les deux têtes en sont contigues à leur origine , & naissent ensemble du même tronc , sans former une bifurcation , comme celles dont parlent ces Auteurs. Il peut être comparé à celui dont on trouve la figure dans l'Histoire Naturelle des Oiseaux de Georges Edwards ⁵.

⁵ 4e. Partie ,
pl. 107.

11. Un Lézard volant d'Afrique , parfaitement conservé dans l'esprit-de-vin : ses ailes , couvertes ainsi que le corps ; de petites écailles marbrées de taches brunes , noires & blanches , sont dans la position où il les met pour voler : il a sous le cou une poche cartilagineuse de médiocre grandeur. On le nomme aussi *Dragon ailé* ⁶.

⁶ Séba , tom.
2. pl. 86. n^o.

⁷ Valent. Hist.
simpl. reform.
lib. 3. cap. 38.

12. Un Lézard volant d'une autre espèce , desséché. Celui-ci est d'Amérique , & a les ailes moins grandes que le précédent , mais sa poche est plus longue : ses ailes sont de couleur grise , dépourvues

dépourvues d'écaïlles , & membraneuses comme les nageoires des poissons ¹. Plus, deux *Scincs* d'Afrique , auffi defféchés.

¹ Séba, tom. 1. pl. 102. n^o.

13. Un Crocodile de Siam , d'environ cinq pieds de longueur , bourré : il est de l'espèce de celui que nous citons ².

². Planches enluminées de M. d'Aubenton, pl. 46.

14. Un autre de même espèce , un peu moins grand.

² Mém. de l'Acad. des Sc. tom. 3. part. 2. pl. 64.

15. Un jeune Crocodile de Ceylan , ; ; & un Caméléon de la côte Coromandel : tous deux dans l'esprit-de-vin , ainsi que les suivans.

¹ Séba, tom. 1. pl. 104. n^o.
².

16. Un jeune Crocodile d'Amérique , & un Lézard des Indes , à dos épineux , nommé dans Séba *Galéotes* ⁴. Plus , un œuf de Crocodile , & un Scinc defféché.

⁴ Ibid. pl. 93. n^o.

17. Une Salamandre aquatique , différente de celle de Séba ⁵ , en ce que sa queue est moins longue , & que les espèces d'aïlerons qu'on y remarque , se prolongent des deux côtés du ventre & des cuisses ; un jeune Crocodile , de l'espèce de celui de l'article quinziesme , & deux Scincs.

⁵ Ibid. tom. 2. pl. 103. n^o.
².

18. Deux Lézards d'une grande beauté , l'un de S. Domingue ⁶ , & l'autre d'Amboine ⁷ , pareils à ceux que nous citons.

⁶ Ibid, tom. 1. pl. 100. f. 3.
⁷ Ibid. pl. 94. f. 3.

19. Vingt-deux petits bocaux , contenant les Reptiles suivans : sçavoir , une Salamandre terrestre ; une Salamandre à queue courte ; une dépouille de Salamandre , un Lézard *Galéotes* ,

* Séba, tom. 1.
pl. 82. n°. 4-5.
* Ibid. pl. 84.
n°. 4.

deux petits Caméléons * ; un Lézard à queue écailleuse hérissée de pointes * : deux à queue plate ; deux à queue semblable, avec une crête dentelée le long du dos ; & dix petits Lézards d'Amérique & de notre pays , de couleurs & marbrures fort variées. Plus, une Grenouille de buisson, d'Afrique *.

* Ibid. tom. 2.
pl. 37. n°. 3.

Trois grands Lézards bourrés : sçavoir, un *Iguana* d'Amérique, de l'espèce nommée *Sénembi* * ; le Lézard *Téjuguacu*, dont le corps est parsemé de taches en forme d'yeux * ; & une autre variété de *Tejuguacu*, nommée *Tecui-xim* *. Plus, une belle & très-grosse Grenouille de Virginie, remarquable par une large bande longitudinale sur le milieu du dos *.

* Ibid. tom. 1.
pl. 97. f. 3.
* Ib. tom. 2.
pl. 105. n°. 1.

* Ib. tom. 1.
pl. 96. n°. 3.

* Ibid. pl. 75.
n°. 1.

21. Une Tortue de mer, connue en Amérique sous le nom de *Carret*, ouverte & desséchée, adhérente à son écaille, dont les pièces sont en recouvrement les unes sur les autres * : elle a vingt-deux pouces de long de l'extrémité de la tête à celle de la queue. Plus, une Carapace de Tortue de terre d'un brun obscur, & de seize pouces de longueur *.

* Ibid. pl. 80.
n°. 9.

* Mém. de
l'Ac. tom. 3.
part. 2. pl. 58.

22. Deux Tortues de mer complètes, l'une de l'espèce du *Carret*, l'autre nommée *Caouanne* : elles ont environ un pied de longueur. Plus, le squelette de la tête d'une grosse Tortue ; & un bocal contenant quatre petites Tortues de mer ; des Indes, dans l'esprit-de-vin : celles-ci

sont en dessus d'un brun très - obscur , à l'exception du cou & des bords qui sont ceints d'une petite bande jaune *.

* Séba , tom.

23. Cinq Carapaces de Tortue : sçavoir , une ^{1. pl. 79. n°. 5.}

de Tortue de terre du Brésil , formée de larges écailles rhomboïdales dont le centre est poin-

tillé * ; une de même espèce , mais moins gran- ^{* Ibid. pl. 80.}

de ; une autre variété , dont le contour est orné ^{n°. 2.}

de triangles alternatifs noirs & blancs * ; & deux ^{* Grew. mus.}

de Tortue de mer , l'une de *Carret* , l'autre de ^{reg. soc. tab. 3.}

Caouanne.

24. Six autres Carapaces de Tortue de terre :

sçavoir , une à écailles hexagones brunes rele-

vées en bosse , du centre de chacune desquelles

partent neuf à dix bandes jaunes en forme de

rayons * ; une à-peu-près semblable , mais à ^{* Séba , tom.}

écailles moins convexes ; une à écailles brunes ^{1. pl. 90. n°. 3.}

pointillées de traits jaunes ; & trois de l'espèce

des premières de l'article précédent , dont une

avec une Tortue artificielle.

25. Quatre petites Tortues , dont trois des

Indes , de l'espèce des dernières de l'article

vingt-deux ; une Tortue de terre de nos climats ,

à écailles brunes pointillées de jaune. Plus ,


quatre petites Carapaces de desseins variés &

fort jolis *.

* Ibid. n°. 4.

6. 8.





SEPTIEME PARTIE.

INSECTES.

- U**N grand Scorpion des Indes * ; & un grand Millepieds oriental * dans l'esprit-de-vin.
- * Séba, tom. I. 1. pl. 70. n°. 4.
* Ib. tom. 2. pl. 25. n°. 3.
2. Quatre variétés de Millepieds dans l'esprit-de-vin , & un Scorpion defféché , moins grand que le précédent. Plus , une Scolopendre de mer sur une branche de Sargazzo *.
- * Ib. tom. 1. pl. 81. n°. 7.
3. Deux très-grosses Araignées dans l'esprit-de-vin , dont une de Ceylan , ayant sur le dos comme un bouclier * : l'autre est une Tarentule d'Italie. Plus , six petites boîtes vitrées , contenant autant de variétés d'Araignées , dont une très-grosse d'Amérique * ; & un nid d'Araignée très-singulier en ce qu'il est pratiqué dans un morceau de terre , & que son couvercle assez épais , ferme par une espèce de ressort : il a été trouvé dans les avenues d'Aranjuez.
- * Ib. tom. 2. pl. 41. lett. C.
4. Dix petits Bocaux contenant divers insectes dans l'esprit-de-vin : sçavoir , deux de Vers palmistes , cinq de Chenilles , un de Cloportes , un de Chenilles à tiges , un de Chrysalides , & une Courtilliere ou Taupe-grillon.

5. Dix-huit petites Boîtes vitrées : ſçavoir, trois de Millepieds , une de Cloportes , trois de Punaiſes terreſtres & aquatiques , cinq de Teignes aquatiques, avec leurs étuis formés, les uns de grains de ſable , les autres de petits brins de bois, de fragmens de Coquilles , de planorbes, &c. deux de Fourmis , les unes aîlées de Cayenne, les autres ſans aîles ; une de rouleaux de feuilles de Roſier , formés en terre par une Mouche à ſcie ; une de petites coques faites par des Vers mangeurs de Chenille ; une Blatte , un Kakerlac , & une Chryſalide. Plus , deux Cocons de Chenilles des Indes , dont un tissu de fils couleur d'or , & l'autre composé d'un grand nombre de cellules.

6. Vingt autres Boîtes ſemblables , contenant autant de variétés de Mouches , les unes à deux aîles , les autres à quatre aîles , telles qu'Abeilles, Guêpes, Frêlons, Ichneumons, Couſins, Ephémères , &c. Plus , un Guêpier de Cayenne , & deux Gâteaux de Frêlons.

7. Quinze autres Boîtes : ſçavoir, douze de Demoïſelles , très-variées , dont trois d'Eſpagne , & les autres de France ; & trois de Cigales de différentes groſſeurs.

8. Deux Mantes peu communes, l'une eſt la *Fraiſe de S. Domingue* ¹ : l'autre eſt nommée le *Spéctre* ².

9. Deux autres Mantes des Indes , dont une

H h iij

¹ Planches
enluminées de
M. d'Auben-
ton , pl. 65.
f. 2.
² Roëſel. Lo-
cuſt. tab. 7.
f. 3.
³ Ibid. tab.
19. f. 9.

très-singulière, en ce qu'elle a six aîles, dont les extérieures sont de même nature que les intérieures, & ne peuvent servir de fourreaux à celles-ci, comme dans les autres Sauterelles

* Séba, tom. aîlées *.

4. pl. 73. n°.

3 & 4.

10. Une *Feuille ambulante* d'une espèce

* Roësel. Lo- rare * , & trois Sauterelles aîlées des Indes, cust. tab. 17. f. 4.

dont deux variétés.

11. Vingt-deux petites Boîtes vitrées : savoir, neuf de Sauterelles, formant autant de variétés, deux de Courtilières, une de Tipules, une de Scorpions aquatiques; une de Punaises aîlées, & huit de Galles de chêne, d'orme, de hêtre, de genêt, d'églantier, &c.

12. Trois beaux Scarabées : savoir, le *Tau-reau volant*, le *Rhinoceros* de Cayenne, & un *Cerf-volant*.

13. Huit Scarabées étrangers, peu communs :

* Pl. enlum. de M. d'Au- benton, pl. 64. f. 1.

savoir, un grand Arlequin de Cayenne *, un Bupreste doré, deux autres Buprestes en pendant, deux variétés de Capricornes, un Rhinoceros, & un Cerf-volant femelle.

14. Huit autres Scarabées : savoir, un Arlequin de Cayenne, de moyenne grandeur; quatre Buprestes des Indes, dont un entièrement doré, un qui est, de plus, remarquable par deux taches couleur de paille, presque rondes sur le milieu de chaque élitre; & deux à élitres

rouges & corselet doré ; deux variétés de Capricornes , & deux de Rhinoceros.

15. Quatorze petites Boîtes vitrées , contenant quatre variétés de *Scarabées porcs* ou à *trompe* , entr'autres le *Scarabée palmiste* de Mademoiselle Mérian * ; trois variétés de Capricornes ; deux variétés de Buprestes , des Hanne-
tons , des Ditiques , & autres Scarabées de différentes espèces.

* Insect. de
surinam. pl.
48.
Séba ; tom. 4.
pl. 95. n°. 3.

16. Dix-huit autres Boîtes contenant autant de variétés de Scarabées , tels que Buprestes , Scarabées pillulaires ou Escarbots, Chrysomeles, Staphilins , Grillons , Proscarabées , Taupins , Dermestes , &c.

17. Dix-huit autres Boîtes de Scarabées , dont une de Scarabées voraces des Isles , une de petits Scarabées gris à trompe ; plusieurs variétés de Cantharides , des Escarbots , des Hanne-
tons , des Staphilins , &c.

18. Vingt-autres Boîtes , dont une de Puce-
rons , & les autres de petits Scarabées , entr'autres quatre variétés de Coccinelles , des Charensons dubled , de petits Scarabées du seigle sauvage , des Cantharides , &c.

19. Une belle Phalene de la Chine , dont les aîles ont huit pouces d'envergure : sur le milieu de chacune est une espèce de vitrage triangulaire , bordé de noir sur un fond

rouge , qui la peut faire nommer la *Vitrée de la Chine*.

20. Le beau Papillon de la riviere des Amazones : ses aîles sont d'un bleu lustré des plus vifs.

21. Deux grands Papillons d'Amérique : les aîles de l'un sont bleu d'azur , avec une large bordure brune , & deux rangs de taches blanches : celles de l'autre n'ont qu'une simple écharpe bleue sur un fond rembruni : les aîles de ces deux Papillons sont oculées en dessous.

22. Six Boîtes vitrées contenant autant de variétés de Papillons : sçavoir , le *grand Paon de nuit*, le *Sphinx du Troesne* , le *Tabac d'Espagne* , la *Belle - dame* , la *grande Tortue* & le *Vulcain*.

23. Douze Boîtes de Papillons : sçavoir , cinq variétés tant des Indes que d'Amérique , & sept de France , dont le *Papillon à queue du fenouil* , le *petit Paon du jour* , le *Morio* , &c.

24. Quinze autres Boîtes : sçavoir , trois de Papillons étrangers , dont une Phalène couleur de rose , à bandes blanches pointillées de noir , de S. Domingue ; sept de Papillons diurnes , & cinq de Phalènes de France. Les noms des Papillons sont sur chaque boîte.

25. Dix-huit Boîtes de Papillons : sçavoir , six de Papillons étrangers , dont le *Verd doré* ,

le *Nacré*, le *Paon du jour* de la Martinique, & deux Papillons porte-queue des Indes, & douze de Papillons & Phalènes de France, dont le *Souci*, le *Silene*, la *petite Tortue*, l'*Ecaille maître*, le *Ptériophore*, &c.


26. Seize Boîtes de Papillons diurnes de France & d'Espagne, formant autant de variétés, dont le *Porte-queue à deux bandes blanches*, le *petit Nacré*, le *Gamma* ou *Robert le Diable*, le *Deuil*, le *Demi-deuil*, le *Gazé*, l'*Aurore mâle*, &c.

27. Seize autres Boîtes de Papillons diurnes de France, dont l'*Aurore femelle*, le *Satire*, le *Bronzé*, l'*Argus bleu*, l'*Argus brun*, l'*Argus vert* ou l'*Argus aveugle*, le *demi - Argus*, &c.

28. Dix-huit Boîtes de Phalenes de France : sçavoir, la *Minime à bandes*, la *Likenée rouge*, la *Phalene - chouette*, la *Feuille morte*, le *Volant doré*, le *Lamda*, le *Zig-zag*, &c.

29. Vingt autres de Phalènes plus petites, telles que la *Phalène-Carmin du Senegon*, la *Chappe verte*, &c. tous ces Insectes sont bien conservés.





HUITIEME PARTIE.

OISEAUX.

* Edwards, I. **U**N *Lorri perruche* des Indes orientales *,
 Hist. nat. des très-bien conservé, & monté sur un petit pied
 ois. pl 174. de bois.

* Ib. pl. 173. 2. Un *Lorri écarlatte* à longue queue *,
 monté pareillement.

3. Une rare & belle *Grive* des Indes, à tête
 noire ornée de deux bandes jaunes, à gorge
 jaune & collier bleu-turquin : ses ailes sont
 mairdoré, bordées de noir & de blanc ; le
 ventre & la poitrine rayés de jaune & de bleu
 obscur, & la queue de même couleur que le
 collier.

* Ib. pl. 149. 4. Un *Paille-en-cul* * de l'Isle de France, &
 un *Damier* ou *Pierrot tacheté* du Cap de Bonne-

* Ib. pl. 90. *Espérance* *.

5. Un *Fou* de l'Ascension, & un *Damier*.

6. Un *Moineau* de Bengale, & un *Martin-pé-
 cheur* du Pérou.

7. Un *Tangora* du Pérou, à tête & ventre

jaune , & la petite *Perruche* du Pérou , à tête bleue & gorge rouge.

8. Deux *Colibris* & deux *Cardinaux* , l'un mâle , l'autre femelle.

9. Neuf Becs d'oiseaux étrangers : sçavoir, deux peu communs du *Colao* , espèce de Corbeau cornu d'Amérique , nommé aussi *Rhinoceros* , ou *Oiseau trompette* , & des deux variétés gravées d. ns *Wilingbi* * ; un de *Casouar* ; un d'une espèce de Grue du Brésil , nommée *Jabitu* * ; un de *Toucan* , un de *Pelican* , un de *Phœnicoptere* ou *Becharu* , un d'*Espatule* , & un de *Lancette* ; un squelette de Canard , trois variétés de Nids d'oiseaux , dont un *Nid penfile* des Indes , fait en forme de chauffe d'Hypocrate , & ayant près de trois pieds de longueur ; un de *Colibri* , deux d'*Alcyons* , l'un dans son état naturel , l'autre nettoyé de ses plumes , & tel que les Chinois l'emploient dans leurs ragouts les plus exquis. Plus quatre Œufs , dont deux verts & un bleu.

* Ornithol.
tab. 17.

* Ibid. tab.


47.

10. La peau & le bec d'un *Toucan* , & plusieurs gorges de petits Oiseaux d'un joli plumage. Ces dernières sont encadrées , & sous verre.

11. Deux Œufs d'Autruche en pendant.

12. *Idem.*





NEUVIEME PARTIE.

Q U A D R U P E D E S.

1. **D**EUX premières dents molaires d'*Eléphant*, l'une de treize pouces de longueur sur six de hauteur, & trois & demi de largeur; l'autre un peu moins grande.

2. Deux autres dents molaires d'*Eléphant*, dont une première à peu près de la grandeur des précédentes, tenant encore à une portion de la mâchoire, & usée dans sa partie supérieure par le frottement de la mastication; & une seconde de sept pouces de longueur sur autant de hauteur, & près de trois pouces de largeur, sciée en deux, & polie pour montrer l'organisation des plaques verticales & transversales. Plus un tronçon de défense de cinq pouces & demi de longueur sur trois de diamètre.

3. Une Corne de *Rhinoceros*, de deux pieds trois pouces de hauteur sur sept de largeur à la base: elle est un peu comprimée, fort recour-

bée en arriere, & de couleur brune obscure dans toute sa longueur.

4. Une autre de deux pieds huit pouces & demi de hauteur sur près de huit pouces de largeur à sa base, de forme à peu près semblable à la précédente, mais différente en ce qu'elle a un fillon longitudinal sur sa partie postérieure, assez profond vers le bas, diminuant insensiblement & disparoissant tout-à-fait vers la moitié de sa hauteur : elle est couverte vers le bas de fibres faillantes, courtes & très-dures, semblables aux soies d'une brosse.

5. Une Corne de *Rhinoceros* de deux pieds cinq pouces de haut sur quatre pouces & demi de diametre à sa base qui est presque ronde. Cette Corne diffère des précédentes, en ce qu'elle est plus effilée, presque droite dans les deux tiers de sa hauteur, & se recourbant ensuite en arriere. Elle est aussi couverte de fibres & un peu gercée vers le bas, mais lisse dans le reste.

6. Une autre rare, en ce qu'elle est double. L'antérieure est haute de deux pieds deux pouces, & latéralement comprimée à mesure qu'elle s'élève. La seconde n'a que dix pouces de hauteur : sa forme est conique, aussi comprimée par les côtés, ce qui lui donne la figure d'un coin. Ces deux Cornes, presque contiguës par la base, adhèrent ensemble à une portion

494 Q U A D R U P E D E S.

de la peau. La grande Corne a six pouces de diametre à sa base qui est presque ronde. La base ovale de la petite a six pouces dans son plus grand diametre, sur quatre dans son petit; & la base commune, formée par le contour de la peau, est de treize pouces & demi de long sur sept de large. Toutes deux sont de couleur brune ¹.

¹ Transact.
phil. n°. 470.
pl. 111. f. 6
& 8.

7. Quatre Cornes de *Rhinoceros*: sçavoir, une de près de deux pieds de longueur, quoique la base en ait été coupée; une Corne naissante de six pouces & demi de haut, à base fort concave & polie; & deux autres petites Cornes naissantes que nous avons reçues adhérentes à la même peau, mais qu'un accident a détachées. L'une porte cinq pouces de haut, & l'autre deux seulement. Plus un tronçon de queue de *Rhinoceros*.

8. Une tête d'*Hippopotame*, garnie de ses dents; elle porte deux pieds de longueur ².

² Grew. mus.
regal, soc. tab.
1.

9. Une autre un peu moins grande.

10. Une grande tête de *Vache-marine*, avec ses défenses.

11. Une autre moins grande.

³ Hist. de l'A-
cad. tom. 3.
pars. 1. pl. 2.
lett. A-F.

12. Une tête de *Lion* ³, & une d'une espèce de Sanglier des Moluques, nommé *Baby-Roësa* ⁴ ou *Baby-Rouffe* ⁵.

⁴ Séba, tom.
1. pl. 50. f. 3.
⁵ Grew. mus.
reg. soc. tab. 1.

13. *Idem*.

14. Une tête de *Tigre*; deux de *Renard* de

Sénégal, & douze Défenses par pendans, dont deux de la *Vache-marine* de dix-huit pouces de long, six d'*Hippopotame* de différentes grosseur & longueur, deux de *Phocas* ou *Loup-marin*, & deux de *Sanglier*. Plus un morceau de peau de *Sanglier* avec son poil.

15. Un bois de *Cerf* à seize andouillers sur chaque perche, dont une à deux pieds neuf pouces de longueur, & l'autre un peu plus.

16. Un *Refait* de *Cerf* à huit andouillers, quatre sur chaque perche, revêtu de son écorce tuberculeuse, crevassée, & de la dureté du cuir.

Il a dix-neuf pouces de hauteur, & près de dix pouces de circonférence au-dessus des meules *; & la moitié d'un bois de cerf monstrueux, précisément semblable, tant pour la forme que pour les dimensions, à celui dont il est parlé dans la Description du Cabinet du Roi, sous le N^o. 588 *.

17. Un très-beau bois d'*Elan* à dix-sept andouillers, huit d'un côté, & neuf de l'autre, portant plus de deux pieds de hauteur, sur deux pieds dix pouces d'ouverture.

18. Un autre à peu près de même grandeur, mais à vingt andouillers, dix de chaque côté.

19. Un bois de *Rhenne* à vingt-huit andouillers, quatorze de chaque côté; sa hauteur passe trois pieds, & chaque perche se divise en trois branches palmées, d'où naissent plus ou moins

* Buffon. Hist. gén. & part. du Cab. du Roi. tom. 6. pl. 24. f. 2.

* Ibid. pl. 21. f. 2.

496. Q U A D R U P E D E S.

d'andouillers ; & un bois de *Daim* de vingt-deux pouces de longueur.

20. Cinq bois de jeunes *Cerfs*, dont un tenant à la tête, & les autres à des portions de l'os du front : l'un de ceux-ci n'a point encore d'andouillers. Plus la moitié d'un petit bois de *Cerf*, bizarre en ce qu'il sort trois andouillers presque immédiatement au-dessus de la meule, & que la perche fait un coude en cet endroit ; la partie palmée d'un *Bois d'Elan*, taillée en cœur, un *pied d'Elan* avec son ongle ; & une moitié de bois d'Elan, sur les deux côtés de laquelle on a gravé une chasse.

21. Trois paires de Cornes : sçavoir celles d'un *Buffle* du Cap de Bonne-Espérance, te-

* Buff. Hist. gén. & part. du Cabin. du Roi, tom 11. pl. 41. f. 4 & 5.
nant à l'os frontal * ; celles d'un *Bouc*, & celles d'un *Bouquetin*, adhérentes à la tête de ces animaux.

22. Trois autres paires de Cornes : sçavoir, celles d'une espèce de Bœuf sauvage, nommé *Bison* : les autres sont de *Chamois*. Elles sont toutes montées sur des têtes postiches, sculptées en bois.

23. Deux Cornes rares, l'une d'un Bœuf sauvage de Buenos-Ayres : cette Corne, qui est d'une grosseur remarquable, a deux pieds neuf pouces de longueur sur six pouces de diamètre à sa base. Celles de cette espèce sont fort recherchées au Pérou, où l'on s'en sert en
forme

forme d'outres pour porter le vin dans les voyages. L'autre d'un animal des Indes qui nous est inconnu, a deux pieds dix pouces de longueur sur quatre pouces de diamètre à la base. Elle est noire, presque droite & relevée jusqu'aux deux tiers de sa hauteur de deux plis en spirale, dont un très-saillant. Le reste, jusqu'à la pointe, est lisse & un peu recourbé.

24. Deux paires de Cornes : sçavoir, une paire de l'espèce de la dernière de la précédente, & une qui en diffère en ce que les Cornes en sont moins grandes, plus droites, & leur spirale du bas moins saillante. Plus une Corne de *Bouquetin*, & une de trois pieds quatre pouces de long, courbée en arrière, & comprimée latéralement comme celles du *Bouquetin*, mais différente en ce qu'elle est comme garnie d'anneaux un peu onduleux jusqu'à huit pouces de distance de la pointe.

25. Quatre Cornes de *Gazelles* des Indes, dont deux un peu courbes de deux pieds dix pouces de longueur, & deux droites un peu moins grandes : les unes & les autres sont garnies d'anneaux depuis la base jusqu'à la moitié de leur longueur, ou environ.

26. Seize autres Cornes : sçavoir, deux de la *Gazelle des Indes*, l'une courbe, l'autre droite ; deux de la *Gazelle d'Afrique*, annuleuses presque jusqu'au sommet, & courbées en arc vers le

498 Q U A D R U P E D E S.

haut ; quatre de la *Gazelle du Bézoard*, dont une paire adhère à une portion de l'os frontal ; deux d'une *Gazelle d'Arabie*, adhérentes à la tête entière de l'animal ; deux petites de *Chamois* ; deux de *Bizon*, & deux d'un animal des Indes : ces dernières sont contournées en spirale, & adhèrent, ainsi que les quatre précédentes, à des portions de l'os frontal.

27. Un *Pangolin* ou *Diabie de Java*, de trois

* Buff. tom. 10. pl. 34. Séba, tom. 1. pl. 54. f. 1. pieds de longueur *.

28. Un *Tatou* ou *Armadille de Cayenne*, de

* Buff. tom. 10. pl. 37. Séba, tom. 1. pl. 29. f. 1. deux pieds trois pouces de long, & de l'espèce

nommée *Cachicame* ou *Tatou à neuf bandes* ;

& deux peaux, l'une d'*Hermine*, l'autre d'*Ecureuil des Indes*.

29. Un *Cachicame* femelle, moins grand que le précédent, & parfaitement conservé dans l'esprit-de-vin. Plus, un Foetus de *Cachicame* dans la même liqueur.

30. Un *Philandre* d'Amérique, ou *Marmose* femelle, avec douze de ses petits, adhérens à

les mamelles * : tous sont très-bien conservés

* Buff. tom. 10. pl. 53. Séba, tom. 1. pl. 31. f. 2. Merian. insect. surin. pl. 66. dans l'esprit-de-vin.

31. Une *Rougette* ou *Chien-volant à cor*

rouge de l'Isle de Sainte-Hélène, dans l'esprit-

* Buff. tom. 10. pl. 17. de-vin *.

32. Le Squelette & la peau séparée d'un *H-*


rifson, garnie de ses piquans ; une jambe du *Chevrotain des Indes* : elle est de la grosseur

d'une plume à écrire. Plus, quatre Squelettes, dont un de *Taupé*, un de *Rat*, un de *Souris*, & un de *Chat monstrueux nouveau né*. Ce dernier, outre les quatre pattes qui y sont dans leur position naturelle, en offre encore quatre autres, deux desquelles sont placées au dessous de la première vertebre du cou, & deux sous le *sternum*.

33. Un *Chat monstrueux nouveau né*, dans l'esprit-de-vin : il est composé de deux corps joints par la poitrine, de maniere que chacun a quatre jambes & une queue, quoiqu'il n'y ait qu'un cou & qu'une tête pour les deux. Cette tête n'a rien de monstrueux que sa position par rapport aux deux corps, le museau se trouvant placé entre l'épaule droite de l'un & l'épaule gauche de l'autre.

34. Un *Cochon monstrueux nouveau né*, aussi dans l'esprit-de-vin : il n'a qu'un œil au milieu du front, trois dents incisives à la mâchoire supérieure, & il est privé de mâchoire inférieure.





DIXIEME PARTIE.

L' H O M M E.

PIÈCES D'ANATOMIE.

1. **L**E Squelette d'une tête humaine dans une boîte vitrée : cette tête est parfaitement conservée , & a toutes les dents : elle a été coupée en différens sens , & montée avec des vis & charnières d'argent , pour en faire la démonstration. On trouve dans la même boîte l'explication détaillée de ce qu'on doit observer dans l'intérieur de la tête par les diverses coupes qu'on y a pratiquées.
2. Les Tégumens d'une tête humaine injectés & séchés : il est aisé de remarquer les plus petites ramifications artérielles , & on y a conservé les parties externes des oreilles , les cils & les sourcils.
3. Un Cœur humain injecté , & une Ratte préparée.
4. Un Foetus mâle , d'environ dix pouces de hauteur , dans l'esprit-de-vin.

5. Un Foetus mâle de Nègresse un peu moins grand.

6. Deux Foetus , l'un mâle de quatre pouces de hauteur, l'autre femelle à-peu-près de même grandeur , tous deux dans l'esprit-de-vin ; le premier est de trois mois.

7. Deux Squelettes de foetus de près de trois pouces de hauteur. Plus, deux Foetus, l'un d'un pouce & demi, l'autre un peu moins grand ; & un Embrión de six lignes , n'ayant encore aucune de ses parties bien distinctes. Ces trois derniers sont dans l'esprit-de-vin.

8. Une tête & un pied gauche de Momie d'Egypte.



BÉZOARDS, CALCULS, &c.

1. UN Bézoard de *Rhinoceros* , de forme ovoïde un peu aplatie , ayant près de deux pouces & demi dans son plus grand diamètre , sur environ deux pouces dans le petit. Sa surface est presque entièrement recouverte de protubérances tortueuses comme les replis du cerveau humain. Personne n'ignore la rareté de ce Bézoard.

2. Un Bézord de *Porc* ou *Piedra del Porco* ,

Li iij

501 **CALCULS ET BÉZOARDS.**

de près de deux pouces de diametre , monté en vermeil.

3. Un Bézoard oriental monté en or.

4. Un Bézoard de Cerf du Pérou , de deux pouces de diametre , monté en or dans le pays : cette monture est enrichie de quatre grosses perles & de neuf émeraudes.

5. Un Bézoard d'*Eléphant* , de forme sphéroïdale un peu comprimée , pesant près de deux livres & demie.

6. Un Bézoard de *Porc-épic sauvage* , & un Bézoard oriental de Bornéo.

7. Quatre Bézoards orientaux , dont deux de *Singe*.

8. Trois Bézoards , dont un de *Singe* , un Bézoard verd de la côte Coromandel , & un blanc de Guinée , coupé en deux , pour en faire voir les couches & le noyau intérieur.

9. Quatre Bézoards , dont un de *Porc-épic* , un de la *Vigogne* du Pérou , & deux orientaux.

10. Deux gros Bézoards , l'un de *Cayman* des Indes , l'autre d'un animal du Paraguay , nommé *Ania*.

11. Un gros Bézoard de la côte Coromandel ; & deux Pierres rares : l'une est de la vessicule du fiel de la plus grande espèce de *Torine* de terre de l'Isle de Bourbon : elle est de

forme sphéroïdale irrégulière , épaisse de trois pouces dans son plus grand diamètre , & fort légère relativement à sa grosseur : l'autre Pierre , qui est d'un blanc-jaunâtre , & fort pesante , se trouve dans le poisson *Belluga* , espèce d'Esturgeon du fleuve Wolga , dont on fait la colle de poisson. M. Collinson a donné , dans les Transactions philosophiques * , un Mémoire sur cette sorte de Bézoard.

* Phil. trans-
fact. Angl. vol.
44. n°. 483.
p. 451.

12. Deux Bézoards des Indes , l'un de forme ovoïde un peu comprimée , pesant onze onces ; l'autre aussi de forme ovoïde , mais dont l'applatissement se trouve en trois endroits également éloignés les uns des autres , de manière que l'ovoïde a trois faces dont les plans sont parallèles à son grand diamètre , & trois côtes arrondies.

13. Quatre Bézoards de moyenne grosseur : sçavoir , un de l'Abyssinie , coupé en deux , & dont le centre est occupé par une petite pelotte filamenteuse ; un de la côte Coromandel ; & deux orientaux , l'un desquels a la forme d'une amande , & en contient effectivement une , dont l'enveloppe desséchée est un peu entr'ouverte.

14. Trois Bézoards , dont un de Tenasserim , un de *Cayman* du Pérou , & un Bézoard blanc de Guinée , coupé en deux pour montrer ses

couchés concentriques , & le noyau qui lui sert de base.

15. Quatre autres : sçavoir , deux du Pérou , dont un de *Sanglier* , & un cassé en deux parties, duquel le noyau paroît être un fruit ; un Bézoard de *Cochon* , & un Bézoard artificiel doré , ou *Pierre de Goa*.

16. Un Bézoard oriental , & trois du Pérou.

17. Quatre autres Bézoards , dont un oriental , un de la côte Coromandel , un du Pérou , & un artificiel.

18. Huit Bézoards tant orientaux qu'occidentaux , dont un de *Sanglier des Indes* , &c. Plus trois prétendues *Pierres de Serpens* , dont une très-grosse : on croyoit autrefois que ces pierres se trouvoient dans la tête d'une espèce de *Serpent à lunettes* des Indes orientales , nommé par les Portugais *Cobra de Capelo* ; mais on est revenu de cette erreur. Un Brame nous a assurés dans le pays que cette pierre n'étoit autre chose qu'un morceau de corne de Cerf , taillé & calciné ensuite comme nous le voyons : il s'en fait un grand débit à la côte Coromandel , où l'on croit cette pierre un remède souverain contre la morsure des *Coulevres Capelles* , & la piquûre des Scorpions.

19. Douze Bézoards , dont un de *Chien* , & les autres des Indes ou de l'Amérique ; plusieurs

desquels ont été usés ou cassés pour en voir l'intérieur. Plus, dix Noyaux de Bézoards orientaux, & les fragmens d'un Bézoard occidental.

20. Sept autres Bézoards, dont trois *Hippolithes*, ou Bézoards de Chevaux,

21. Sept *Egagropiles* ou Bézoards de Poils, dont deux de forme sphéroïdale, un de forme ovoïde, & un cylindrique, revêtus d'une croûte mince & luisante; deux de Mouton, revêtus d'une croûte noire, & un formé de Poils roux assez longs & sans croûte. Plus, cinq Pierres du fiel des bœufs de Coromandel, & des Pierres du *Castoreum*. Ces Pierres sont celles que M. Geoffroy trouva dans les poches d'un Castor, & dont il donna la description à l'Académie des Sciences, dans la seconde partie de son Mémoire sur les Bézoards *. Elles ont passé dans notre Cabinet avec la suite entière des autres Bézoards que M. M. Geoffroy père & fils avoient rassemblés : c'est cette même suite qui étoit sans contredit une des plus complètes que l'on pût voir en ce genre, que nous présentons aujourd'hui, augmentée de plusieurs autres Bézoards, particulièrement de ceux d'Amérique qui nous ont été envoyés du Pérou.

* Mém. de l'Acad. des Sc. ann. 1712. p. 206 & 207.

22. Deux Pierres humaines d'une grosseur extraordinaire : elles sont du genre de celles que l'on nomme *Murales*, de forme ovoïde appla-

tie , & pefent l'une dix onces & demie , l'autre fix onces & cinq gros.

23. Huit Pierres humaines , la plûpart de la veflie , & très - groffes , les unes de fubftance plâtreufe & friable , les autres compactes , dures & fort rabotteufes. Plus , une noirâtre dont le noyau joue en dedans , comme aux Pierres d'aigle , lorsqu'on la fecoue.

24. Douze autres Pierres de veflies humaines, remarquables les unes par leur groffeur , les autres par leur forme & la fubftance qui les compofe : il y en a entr'autres trois affez groffes qui furent tirées du Pere Ange de Tréport après fa mort.

25. Douze Boëtes contenant plufieurs Calculs & Pierres humaines tant de la veflie que de la veficule du fiel , avec une veficule féchée , remplie de ces Pierres ; un *Spongia Veneris* , & une fuite de Gravier rendus par plufieurs perfonnes , à la fuite de l'ufage des pillules Angloifes.

26. Vingt & une petites Boëtes qui contiennent une fuite de Perles très-intéreffante : favoir , deux Perles orientales rondes de la plus belle eau ; une Boëte de *Semences de Perles orientales* ; une de Perles occidentales du Pérou , auffi d'une belle eau ; une de Perles d'Afrique plombées ; trois de Perles d'Ecoffe , les unes

blanc-mat , les autres grises , & les autres *onices* ; une de Perles gris de lin , une de Perles en poire blanc de lait , une de Perles hémisphériques , deux de Perles baroques , cinq de Perles de la *Pinne-marine* , dont une de rondes , rouge de Corail ; une de Perles en poire de même couleur , une de grises , une de grises-verdâtres , & une grosse en poire , noire à zones verdâtres ; deux dont on a enlevé une partie de la couche extérieure , pour voir les intérieures ; deux *Loupes de Perles* , dont une très-fingulière en ce qu'elle est semblable au gros mordant d'un Crabe : peut-être même en est-ce un , qui ayant été renfermé dans l'Huitre par quelque accident , aura été entièrement recouvert tant en dedans qu'en dehors , de la liqueur nacrée qui transsusoit du corps de l'animal ; & une *Coque de Perles*.

27. Vingt & une boîtes de Perles de toutes les variétés de l'article précédent.

28. Un morceau d'*Ambre-gris* du poids de fix onces (*).

[*] Nous rangeons ici l'*Ambre-gris* , non comme un Bézoard , mais à cause de son origine qui est probablement dûe au regne animal. Il est constant , par le rapport de plusieurs Voyageurs instruits & bons Naturalistes , tels que Kempfer¹ , Anderson² , &c. que l'*Ambre-gris* se trouve tout formé dans les intestins de quelques Cétacées. Nous avons eu plus d'une fois occasion de nous assurer nous-mêmes que les prétendus becs d'oiseaux

¹ *Amoen. exoticæ. fasc. 3.*
² *Hist. de l'Islande & du Groënland , t. 2. p. 128.*

29. Deux autres qui pèsent ensemble environ trois onces.

30. Trois Vessies de *Muse* du Tonquin, dans une boîte de plomb.

que l'on y trouve presque toujours, & souvent même en grande quantité, ne sont que des *Bess de Soche* ou du *Polype*, animaux qui servent souvent de proie à ceux qui produisent l'*Ambre-gris*. Si cette substance a donc été mise par la plupart des Naturalistes & des Chymistes au nombre des *Bitumes*, c'est, comme le remarque très-bien M. Macquer *, » plutôt d'après les propriétés » & à cause des principes qu'elle fournit lorsqu'on la » distille, que, par une connoissance certaine de son » origine; car on ne connoît point d'*Ambre-gris* véritablement fossile.

* Diction. de
Chym. au mot
Ambre.



ONZIEME PARTIE.

VÉGÉTAUX

1. CINQUANTE morceaux de Bois d'Europe & des deux Indes, dont quarante-quatre échantillons en petites tablettes polies & étiquetées. Plus un morceau de Bois rouge du Japon, & deux Bâtons des Indes, curieux par les nodosités & tubercules dont ils sont revêtus dans toute leur longueur.

2. Deux morceaux de Bois, curieux : dans l'un, qui se sépare en deux, se trouve une espèce de Croix de Malte qui y a été comme imprimée par la nature ; l'autre est une loupe d'arbre, creuse & mammelonée en dedans ; mais dont l'extérieur est comme ciselé, à cause des fibres sans nombre qui y serpentent par ondes ou en forme de tourbillons.

3. Cinq morceaux ; sçavoir, un très-beau Bâton nouveau des Indes, de cinq pieds de hauteur, & quatre variétés de cannes, dont une à sucre, une de Bambou, &c.

4. Deux morceaux curieux : l'un est le fameux *Boramez* ou *Agneau de Scythie*, que l'on a cru long-temps être un *animal-planté*, mais qui n'est dans le vrai que le collet d'une racine de fougère revêtu d'un duvet jaune rougeâtre, & dont on a eu soin de retrancher les petites racines; tandis qu'avec les bouts des tiges, on a formé les prétendues pattes de cet Agneau. Cette espèce de fougère croît proche de Samara sur le Wölga : l'autre est un morceau de Bois rongé par les fourmis blanches connues aux Indes orientales sous le nom de *Carias*, & au Pérou sous celui de *Comegen*. On voit à la base de ce morceau, les trous par où se sont introduits ces insectes destructeurs. L'intérieur est évuidé presque en entier, & ne montre plus que des cloisons délicates parallèles les unes aux autres, striées suivant leur longueur, & qui ne tiennent ensemble que par des jambages latéraux & parallèles à la base, que ces insectes y ont laissés de distance en distance.

5. Différentes parties de végétaux; telles que racines, écorces, &c. entr'autres, une racine de la Chine qui imite un quadrupède; une qui représente la tête d'un oiseau à long bec; une racine de Manglier sur un granite; un agaric à longue tige; canelle blanche, canelle de la Province de Quito, avec la fleur

de l'arbre qui la produit ; écorce de l'arbre du girofle de Maragnon ; autre d'un arbre des Îles Malouines , laquelle réunit le goût de toutes les épices ; écorce du *Simarouba* ; écorce de l'arbre *Aquila* de la Havanne , dont on fait de la dentelle ; avec un morceau de cette dentelle ; deux bougies , l'une jaune , l'autre verte , faites de la cire de l'arbre de cire de la Louisiane , cire végétale de la Chine , &c. en tout vingt-fix morceaux.

6. Deux Cocos remplis : l'un de *Baume de Tolu* , l'autre de *Baume du Pérou* ; plus une phiole de véritable *Baume de la Meque*.

7. Une suite de Baumes , gommes , résines , &c. tels que Baume de Sainte-Marie , Baume de Tolu , Gomme Copal , Laque en bâtons , Sang-dragon , Gomme Elemi , Oliban , Benjoin , Réfine du pin , un morceau du bois qui donne la gomme Caragne , dans lequel on voit beaucoup de cette résine , &c. en tout trente morceaux , dont quelques-uns renferment des insectes.

8. Un Herbar contenant deux cent soixante-dix plantes tant terrestres que marines. La collection des *algues* , *fucus* , *mousses marines* , est sur-tout intéressante par le nombre & la variété des espèces qu'elle réunit. Plus cinq *Egagropiles de mer* , composées de fibres végétales , entrelacées ensemble à peu près comme dans les

Bézoards de poils. Deux sont ovoïdes, une sphérique, & deux très-grandes, cavernueuses semblables pour la forme à certains Aleyons.

9. Un très-grand Coco de mer des Maldives, il est formé comme de deux lobes ovoïdes qui se réunissent par le milieu, de manière à représenter une paire de fesses & les parties naturelles de la femme. Ces Cocos se trouvent sur le rivage des Isles Maldives, où ils sont jettés par les flots, sans que l'on sçache quelle est leur origine. Ils sont très-recherchés des Indiens, qui les regardent comme un remède universel, & qui les payent au poids de l'or.

10. Six fruits des Indes & de l'Amérique; sçavoir, deux grandes Calebasses, un *Pain de singe*, fruit du Baobab, arbre du Sénégal; trois grands Cocos revêtus de leur écorce, dont un entier, un coupé suivant sa longueur, & un coupé transversalement pour faire voir l'épaisseur & la nature de l'enveloppe extérieure. Plus un Coco des montagnes d'Andos au Pérou, avec son couvercle, & un faisceau de branches à fruit du Palmiste.

11. Vingt-deux variétés de Cocos de moyenne grandeur, & petits, tant de terre que de mer: il y en a des Indes orientales, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Choëo au Pérou, &c. & plusieurs noix d'Areque, dont une avec son enveloppe.


12. Un tiroir contenant divers fruits d'Europe & des deux Indes , tels que Cocos , Pommes de Pin , de Cedre , de Cypres , Coloquintes , Calebasses , Courbaris , Huras , Pain de singe , Figue banane , Coton du fromager avec son enveloppe , feuilles de Coca , que les Amériquains mangent , comme les Indiens le Bétel , &c. en tout soixante morceaux.

13. Trois cent variétés de graines , filiques , amandes , noyaux , &c. d'Europe & des Indes. Plus vingt - quatre échantillons de Thé , avec les différentes préparations de cette feuille ; ce qui forme une suite complète de tous les états par où elle passe avant de nous être apportée.

14. Un bocal & un flacon qui contiennent , l'un deux fruits de Muscade entiers , l'autre une *Ate* ou *Pomme de Cannelle* d'Amérique ; cette dernière , qui avoit été mise petite dans la liqueur , y a pris tout son accroissement , comme il est aisé d'en juger par son diamètre , qui est du double plus grand que le goulot du flacon qui la renferme.

15. Deux bocaux contenant , l'un des Citrons de la Chine , de l'espèce nommée vulgairement le *Monstre* , l'autre trois racines en forme de mains.

Fin du premier volume.



TABLE

ALPHABÉTIQUE

DES CURIOSITÉS NATURELLES

Contenues dans le premier Volume.

A.

A BRILLES, .	Page 485
l'Abricot,	336
Acétabule,	58
Agaric. Voy. <i>Alcyons, Astroïtes, Éponges, Madrépores & Rétépores.</i>	
l'Agate,	269
l'Agatine,	150
Agneau de Scythie,	510
l'Aigle (Poisson),	476
l'Aigrette,	163
l'Aiguille,	223
à coudre,	220
en vis de tambour,	223
de mer (Poisson)	477
l'Aile d'Ange,	188
de Chauvesouris femelle,	191
de Chauvesouris mâle,	<i>ibid.</i>
de Papillon (cornet)	234

TABLE ALPHABÉTIQUE 315

l'Aîle de Papillon (telline),	370
les Aîlées,	179
l'Aîle large,	<i>ibid.</i>
Alcyons,	66
en agaric,	68
en cornes de daim,	67
en figue,	<i>ibid.</i>
en poire,	<i>ibid.</i>
en vessie de loup,	89
l'Alène,	220
Algues,	511
l'Amadis,	234
l'Amande,	340
à cils,	345
rôtie,	357
Ambre gris,	507
l'Amiral,	233
à deux bandes,	<i>ibid.</i>
d'Angleterre,	234
d'Orange,	232
masqué,	233
Ammonies,	101
Amphibies,	478
Amphisbene, Voyez <i>Double Marcheur</i> .	
l'Anémone de mer,	469
l'Ane rayé,	134
Anomies,	9, 10, 14, 311
Antales,	98
l'Antenne d'écteville,	57
l'Apan,	390
Araignée (insecte),	484
l'Araignée. Voyez <i>Bécasse épineuse</i> .	
femelle } (<i>murex</i>)	189
mâle }	188

l'Arche de Noé,	359
les Arches,	357
l'Argus (porcelaine),	270
l'Argus fascié (Buccin),	143
l'Argus aveugle (Papillon)	489
bleu (<i>idem</i>),	<i>ibid.</i>
brun (<i>idem</i>),	<i>ibid.</i>
verd (<i>idem</i>),	<i>ibid.</i>
l'Arlequin de Cayenne,	486
l'Arlequine,	270
Armadille. Voyez <i>Tatou</i> .	
l'Arrofoir,	97
l'Arrichaut,	414
l'Artimon entortillé,	180
Astroïtes,	21
Astroïte à étoiles anguleuses,	22, 23
à étoiles rondes,	<i>ibid.</i>
agaric,	22
globuleux,	22, 23
tête de more,	22
l'Astrolépas,	86
Astrophite. Voyez <i>Tête de Méduse</i> .	
Ate ou Pomme de Cannelle,	513
l'Annusse,	244
l'Asore femelle,	489
mâle,	<i>ibid.</i>

B.

BABY-ROESA	} (tête de),	594
ou		
Baby-Rouffe		
Baleine (fanons de),		477
(membre),		476
(nageoire),		477

A L P H A B É T I Q U E 517

Baleine (os de l'ouie),	<i>ibid.</i>
(vertèbre),	476
Baliste scolopax,	<i>ibid.</i>
la Barbe de mer,	57
Barillets. Voyez <i>Cœurs marins.</i>	
Barnacle. Voyez <i>Conque anatifera.</i>	
Basilic factice,	476
Bateau (cœur en)	349
Bateau (lépas en)	82
Baume de la Méque,	511
de Sainte-Marie,	<i>ibid.</i>
de Tolu,	<i>ibid.</i>
du Pérou,	<i>ibid.</i>
la Bécasse. Voyez <i>Tête de Bécasse.</i>	
épineuse,	203
Bec de Becharu,	491
de Canard (coquille),	377
de Casouar,	491
de Colao,	<i>ibid.</i>
d'Espatule,	491
de Jabiru,	<i>ibid.</i>
de Lancette,	<i>ibid.</i>
de Pélican,	<i>ibid.</i>
de Perroquet (coquille),	311
de Toucan,	491
Bécharu. Voyez <i>Phœnicoptere.</i>	
Becune (machoire de),	476
les Beignets,	423, 424
la Belle-Dame,	488
le Benitier (cœur),	368
le Benitier (peigne),	517
le Bézoard, Voyez <i>casques.</i>	
Bézoard d'Anta,	502

Bézoard de Bœuf,	505
de Cayman,	502
de Cerf du Pérou,	<i>ibid.</i>
de Cheval,	505
de Chien,	504
d'Éléphant,	502
de Mouton,	505
de Poil, Voyez <i>Egagropiles</i> .	
de Porc,	501
de Porc-épic,	502
de Rhinocéros,	501
de Sanglier,	504
de Singe,	502
de Tortue de terre,	<i>ibid.</i>
de Vigogne,	<i>ibid.</i>
du poisson Belluga,	505
factice. Voyez <i>Pierre de Goa</i> .	
la Bille d'ivoire,	336
Bison (cornes de),	496
la Bistournée,	285
Bivalves. Voyez <i>Coquilles</i> .	
<i>Blatta bisantia</i> . Voyez <i>Ongle odorant</i> .	
Blatte,	485
Bœuf de Buenos-Ayres (cornes de)	496
Bois de Cerf,	495
le Bois de Cerf. V. <i>Madrépores & Millepores</i> .	
le Bois de Cerf. Voyez <i>Patte de Crapaud</i> .	
Bois de Daim,	496
d'Elan,	495
de Rhenne,	<i>ibid.</i>
Bois (échantillons de)	509
figuré,	<i>ibid.</i>
rongé par le Carias,	510

A L P H A B É T I Q U E. 519

Bois rouge du Japon ,	509
le Bois veiné ,	160
le Bonnet Chinois ,	90
de Dragon ,	86 , 87
de Fou. Voyez <i>Cœur de bœuf</i> .	
de Matelot ,	92
de Neptune (éponge) ,	62
de Neptune (fongipore) ,	38
de Pologne ,	174
Borametz. Voyez <i>Agneau de Scythie</i> .	
la Bossue ,	265
sans dents ,	<i>ibid.</i>
Bouc (tête de)	496
Boucarde. Voyez <i>Cœur de bœuf</i> .	
la Bouche à droite. Voyez <i>Contre-unique</i> .	
à gauche. Voyez <i>Unique</i> .	
d'argent ,	112
de lait ,	145
d'or ,	112
double ,	120 , 128
les Boucliers (Lépas) ,	78 , 86
les Boucliers (Ourfins)	421
la Bouée ,	222
Bouquetin (tête de) ,	496
la Bourse ,	321
le Bout de Chandelle ,	234
le Bouton de Camisole ,	123
de la Chine ,	125
le Brocard de soie ,	256
la Brocatelle ,	323
le Bronzé ,	489
la Brulée ,	195
la Brunette ,	254

les Buccins ,	131
à bouche entiere ,	133
à bouche échancrée ,	136
à longue queue ,	155
à petite queue ,	143
fluviales ,	430
terrestres ,	445
le Buccin crenelé ,	147
de la Mer Rouge ,	181
feuilleté ,	144
Buffle (cornes de)	496
la Bugle Coralline ,	57
la Bulle d'Eau ,	206
Buprestes ,	486
dorés ,	<i>ibid.</i>
les Burgaux ,	110
le Burgau perlé ,	111
Byssus de la Pinne-marine ,	389
Byssus (bas & gands faits de)	390

C.

le CABESTAN ,	144
Cabochon. Voyez <i>Lépas.</i>	
Cachalor (dent de)	477
Cachicame femelle ,	498
mâle ,	<i>ibid.</i>
le Cadran ,	123
<i>Cæcilia.</i> Voyez Serpent aveugle.	
le Caffé au lait ,	271
Calcul humain ,	505 , 506
Calemar ,	469
le Calice. Voyez <i>Madrepores.</i>	

ALPHABÉTIQUE. 521

la Calotte ,	60
les Cames ,	328
à bases ovales irrégulières ,	344
à bases ovales régulières ,	339
à bases rondes irrégulières ,	335
à bases rondes régulières ,	329
d'Eau douce ,	433
la Came coupée ,	369
coupée en bec de flute ,	361
feuille ,	340
luisante ,	341
Pholade ,	375
radiée ,	362
truitée ,	340
tronquée ,	360
violette ,	343
Caméléon ,	481
Canard (squelette de)	491
Canères ,	474
le Cancre des moluques ,	<i>ibid.</i>
ours ,	471
squinate ,	474
velu ,	<i>ibid.</i>
Cannelle blanche ,	510
du Pérou ,	<i>ibid.</i>
Cantharides ,	487
Caouanne ,	482
Carapaces de Tortue ,	<i>ibid.</i>
le Cardinal (oiseau)	491
la Cardinale (coquille)	141
Carrer ,	482
la Carte géographique ,	267
Caryophylloïdes ,	37

Casouar (bec de)	491
le Casque Bézoard ,	173
en baudrier ,	174
pavé ou traité ,	172
plume ,	171
rayé ,	174
triangulaire ,	177
tricotté ,	178
la Castagnette ,	299
Cauris. Voyez <i>Kauris</i> .	
le Cedo Nulli ,	339
Cérébrites ,	27
Cerf (bois de)	495
Cerf-volant ,	486
la Chagrinée } ou }	346
le Chagrin ,	
la Chaloupe. Voyez <i>Oscabrion</i> ,	
Chamois (cornes de) ,	496
le Chapeau de Neptune ,	59
la Chappe verte ,	489
le Char de Neptune. Voyez <i>Madrépores</i> .	
le Chardon ,	414
de mer ,	68
Charensons ,	487
Chat monstrueux ,	499
la Chauffetrape ,	164
de M. Dargenville ,	194
la Chauvesouris. Voyez <i>Foudre</i> .	
Chenille (insecte) ,	484
à riges ,	<i>ibid.</i>
la Chenille bariolée ,	226
blanche ,	229

ALPHABÉTIQUE.

la Chenille blanche réticulée ,	227
de mer. Voyez <i>Oscabrion</i> .	
de mer. Voyez <i>Taupe marine</i> .	
granuleuse ,	227
noire ,	226
le Cheval de frise ,	194
marin (petit) ,	476
le Cheveu de mer ,	56
Chevrette ,	471
Chevrotain des Indes (jambe du) ,	498
la Chicorée ,	199
Chien de mer ,	475
(fa gueule) ,	476
Chien volant ,	498
le Chou ,	366
de mer ,	38
Chou-fleur. Voyez <i>Madrépores</i> .	
Chrysalides ,	484
Chrysoïmeles ,	487
le Cierge (Cornet) ,	247
Blanc ,	<i>ibid.</i>
Jaune ,	<i>ibid.</i>
le Cierge (éponge) ,	61
le Cierge (tuyau de mer) ,	98
Cigale ,	485
le Cigne , Voyez <i>Cierge blanc</i> .	
le Clocher Chinois ,	226
Gothique ,	228
la Clochette , Voyez <i>Glands de mer</i> .	
la Clonisse ,	333
Cloporte (insecte) ,	484
le Cloporte , Voyez <i>Oscabrion</i> .	
le Cloporte (porcelaine) ,	276

le Cloud,	219
Coccinelle,	487
Cochon monstrueux,	499
Coco des Maldives,	512
des montagnes d'Andos,	<i>ibid.</i>
Cocons de Chenille,	485
les Cœurs,	348
marins,	418
nommés Arches,	357
ou Conques de Venus,	360
proprement dits,	349
le Cœur allongé,	354
de Bœuf,	355
de l'Homme,	353
de Pigeon,	<i>ibid.</i>
de Venus,	349
en bateau,	349
en soufflet,	353
épineux,	355
triangulaire,	353
tuilé,	<i>ibid.</i>
Colao, ou oiseau trompette,	491
Colibri,	<i>ibid.</i>
la Colique,	273
la Comete digitée miliaire,	456, 458
épineuse,	456
<i>Concha exotica,</i>	351
<i>Concha veneris</i> à pointes,	363
<i>Concha veneris</i> à réseau,	<i>ibid.</i>
<i>Concha veneris</i> sans pointes, V. <i>la Créole.</i>	
la Conchiliologie, Voyez <i>La Fripiere.</i>	
le Concho-Lepas,	87
Concombre marin,	469

ALPHABÉTIQUE. 525

la Conque de Triton,	149
exotique,	351
persique,	214
Conques Anatifères,	405
de Venus,	360
sphériques, <i>Voyez Tonnes.</i>	
la Contre-unique (limaçon),	443
la Contre-unique (porcelaine),	266
la Contre-unique (vis-buccin),	448
le Coq de mer,	473
le Coq & la Poule,	312
Coque de perles,	507
le Coqueluchon de Moine,	358
Coquilles,	71
Bivalves d'eau douce,	433
Bivalves de mer,	277
fluviales,	427
Multivalves de mer,	391
terrestres,	436
Univalves d'eau douce,	428
Univalves de mer,	75
Corail,	5
articulé, <i>Voyez faux Corail.</i>	
blanc,	8, 9
blanc oculé, <i>Voyez Madrépores.</i>	
noir, <i>Voyez kératophites.</i>	
rouge,	6, 10
rouge & blanc,	8, 9
violet, <i>Voyez Madrépores.</i>	
la Coralline,	319
Corallines,	9, 14, 56, 58
à cils,	57
à cosses,	<i>ibid.</i>

Corallines à lentes ,	<i>ibid.</i>
à touffe couleur d'ivoire ,	<i>ibid.</i>
Coralline bugle ,	57
commune ,	<i>ibid.</i>
rampante ,	<i>ibid.</i>
rubuleuse de Malte ,	104
la Corbeille (came) ,	339
la Corbeille (cœur) ,	358
la Corbeille (huitre) ,	289
la Cordeliere ,	151
le Cordon bleu ,	117
la Corne d'abondance ,	289
Corne de Rhinocéros double ,	493
Corne de Rhinocéros simple ,	492
Cornes de Bœuf de Buenos-Ayres ,	496
de Bison ,	496
de Bouc ,	<i>ibid.</i>
de Bouquetin ,	<i>ibid.</i>
de Chamois ,	<i>ibid.</i>
de Daim ,	<i>ibid.</i>
de Daim. Voyez <i>Fron dipores</i> ,	
<i>Alcyons</i> , <i>Éponges</i> , <i>Madrépores</i> .	
de Gazelle ,	497
d'Elan ,	495
de Rhenne ,	<i>ibid.</i>
le Cornet de chasseur ,	441
de postillon ,	101
de S. Hubert ,	439
ponctué ,	141
les Cornets ,	232
la Cornue ,	399
le Courlis , Voyez <i>tête de Becasse</i> .	
Couronne de serpens ,	406

A L P H A B É T I Q U E.	527
la Couronne d'Ethiopie,	210
Impériale,	247
Papale, Voyez <i>Thiars</i> .	
Courtilliere,	484
Cousins,	485
le Coutelier, Voyez <i>manches de couteau</i> .	
le Coutil, Voyez <i>toile à matelas</i> .	
le Crabe à nœuds ou gouteux,	191
commun,	189
porte-croix,	472
saxatile,	472
filonné,	473
velu,	<i>ibid.</i>
le Crapaud (porcelaine),	273
le Crapaud (rocher),	170
la Créole,	363
la Crête de Coq,	287
Crocodile,	481
Croix naturellement empreinte dans un morceau de bois,	509
Crustacées,	470
à corps allongé,	471
à corps arrondi,	474
à corps large,	472
la Cuiller de Neptune,	212
à pot,	223
la Cuisse,	286
la Culotte de Suisse,	169
les Culs de lampe,	125
le Cyprès de mer,	57
marin,	49

D.

D AIM (bois de),	496
Damier (oiseau),	490
le Damier (coquille),	245
à bandes jaunes,	<i>ibid.</i>
Dattes (coquilles),	386
Dauphin (tête de)	476
le Dauphin (coquille)	110
Décempede de Cornouaille,	465
Défense d'Elephant,	492
d'Espadon,	476
d'Hippopotame,	495
de Narwal,	476
de Phocas,	495
du poisson scie,	476
de Sanglier,	495
de Vache marine,	<i>ibid.</i>
le Demi-argus,	489
le Demi-deuil (coquille),	112
le Demi-deuil (papillon),	489
Demoiselles,	485
Dentales,	98
Dentelle de l'arbre <i>Aquila</i> ,	511
Dents de Cachalot,	477
d'Elephant,	492
d'Hippopotame,	} <i>V. Défenses.</i>
de Loup marin,	
de Sanglier,	
de Vache marine,	
Dermeftes,	387
le Devidoir. Voyez <i>la Bistournée.</i>	
le Deuil,	489
	Diable

A L P H A B É T I Q U E. 519

Diablo de Java,		498
de mer,		475
Ditiques,		487
le <i>Dofan</i> ,		105
Dorade de la Chine,		476
le <i>Dotel</i> . Voyez <i>Gueule de Souris</i> .		
Double marcheur,		479
Dragon ailé. Voyez <i>Lézard volant</i> .		
le Dragon, (coquille),		168
le Drap d'argent,		254
d'or,		251
d'or à fond bleu,		252
d'or fascié,		251
d'or piqueté,		253
d'or de la Chine,		252
mortuaire,		258
orangé,		253
Drap-marin,	151, 333,	359

E.

l' E CAILLE martre,		489
l'Écotchée,		155
Écrevisse d'eau douce,		471
de mer,		<i>ibid.</i>
l'Écriture Atabique,		
ou		
l'Écriture Chinoise,		344
Écureuil des Indes (peau d')		498
Égagropiles,		505
Égagropiles de mer,		511
Élan (bois d'),		495
Élan (pied d'),		496
Éléphant (dent d'),		492

l'Enclume, Voyez *la cuisse*.

l'Enfant au maillot, de mer. 222

terrestre, 448

l'Enfumée, 195

l'Entonnoir, 80, 86

l'Éperon, 123

Ephémères, 485

l'Epi de bled, 15

l'Episcopale, 186

Eponges, 59

Eponge agaric, 63, 64

commune, 59

des Frotteurs, 60

en colonne, 60, 61

en cornes de Daim, 64

en mie de pain, *ibid.*

en morille, 63, 64

Oursin, 63

l'Equerre, 286

l'Escalier. Voyez *Scalata & Cadran*.

Escarbots, 487

Escares molles, 56, 57

pierreuses, 30, 31

Espatule (bec d'), 491

l'Esplandian, 248

l'Ethiopienne, 150

Etoiles de mer, 452

à cinq rayons, 455

à dix rayons, 465

à dix-sept rayons, *ibid.*

à douze rayons, 462

à grains de millet, 455, 456

à grains de petite vérole, 454, 458

ALPHABÉTIQUE. 331

Étoiles à quatre rayons,	454
à queue de Léopard,	464
à rayons entiers,	<i>ibid.</i>
à rayons fendus,	454
arborescentes,	466
à sept rayons,	462
à six rayons,	461
à treize rayons,	463
à trente-huit rayons,	<i>ibid.</i>
à trente-sept rayons,	462
chevelues,	464
coriacées,	455, 458
cruciformes,	454
digitées	458, 462
en patte d'oye,	459, 461
étoilées,	454, 455
falciformes,	454
jaune vulgaire de Luid,	460
pectinées,	455
réticulées lentigineuses,	458
rosacées,	465
vermiformes,	464
l'Éventail (éponge),	60
l'Éventail, Voyez <i>la Solé.</i>	
des Mennonites,	331
de Thétis, Voy. <i>panache de mer.</i>	

F.

la FAITIERE, Voyez <i>la Tuilée.</i>	
le Falier,	266
la Fausse aîle de Papillon,	244
Arlequine,	271
Gourgandine,	364

la Fausse oreille de Midas,	134
Scalata,	221
le Faux Amiral, Voyez <i>le Navet</i> .	
le Faux Amiral de Guinée,	235
Argus,	270
Faux Corail,	43
Blanc articulé,	45, 46
géniculé ou	46
nouveux,	<i>ibid.</i>
rouge articulé,	<i>ibid.</i>
la Féverolle,	346
la Feuille (cane),	340
la Feuille (huître),	287
la Feuille ambulante,	486
de chou,	366
de chou. Voyez <i>Millepore</i> .	
morte (phalene),	489
la Figue blanche,	216
violette,	217
la Filcuse,	249
la Flamboyante,	236
la Flute de Pan,	60
Fœtus humain,	500, 501
Fongipores,	36
en bouquet,	36, 37
le Foret,	225
le Fort Pentagone,	457
Fou (oiseau),	490
le Foudre,	160
le Four ardent. Voyez <i>Bouche d'or</i> .	
Fourmis ailées,	485
sans aîles,	<i>ibid.</i>
la Fraise (coquille),	353

ALPHABÉTIQUE. 537

la Fraïse de Saint-Domingue (insecte),	485
de Veau, Voyez <i>Millepores</i> .	
Frêlons,	485
la Fripiere,	124
le Fromage verd,	239
Frondipores,	30, 31
en cornes de Daim,	31
<i>Fucus</i> ,	511
la Furie,	331
le Fuseau,	155
à dents,	<i>ibid.</i>

G.

G ALÉOTES (Lézard),	481
Galles de chêne,	} 486
d'églantier,	
de genêt,	
de hêtre,	
d'orme,	
le Gamma,	489
le Gâteau feuilleté,	293
Gâteaux de Frêlons,	485
les Gâteaux (ourfins),	423
la Gaufre,	145
le Gazé,	489
Gazelle d'Afrique (cornes de)	497
d'Arabie (cornes de)	498
des Indes (cornes de),	497
du Bézoard (cornes de)	498
la Géographique. Voy. <i>Carte géographique</i> .	
la Gibeciere. Voyez <i>la Bourse</i> .	
Glands de mer,	401
à côte de melon,	404

Glands de mer clochette ,	404
couleur de rose ,	<i>ibid.</i>
épineux ,	402
rayés ,	<i>ibid.</i>
tulipe ,	<i>ibid.</i>
turban ,	<i>ibid.</i>
le Gochet ,	120
Gomme caragne ,	}
copal ,	
élémi ,	
laque ,	
la Gondole ,	212
mammillaire ,	210
la Gourgandine ,	353
(fausse)	364
la Gousse de fèves ,	378
le Grain d'avoine ,	450
le Grain d'orge ,	<i>ibid.</i>
Grappe marine. Voy. Raisin de mer.	
Grenouille d'Afrique ,	482
de Virginie ,	<i>ibid.</i>
la Griblette ,	373
la Griffe du Diable ,	188
Grillons ,	487
la Grimace ,	171
Grive des Indes (oiseau)	490
la Grive (coquille) ,	117
Guêpes ,	485
Guêpier de Cayenne ,	<i>ibid.</i>
de mer ,	66
Gueule de Lamie ,	476
la Gueule de Loup ,	447
de Souris ,	384

A L P H A B É T I Q U E. 535

la Gueule noire ,	182
la Guillochée ,	337.

H.

la H ALLEBARDE ,	191
Hannetons ,	487
la Harpe ,	213
noble ,	ibid.
l'Hébraïque ,	240
l'Hébraïque. Voy. <i>Bois-veiné.</i>	
Hérisson (squelette de) ,	498
le Hérisson (coquille) ,	165
Hermine (peau d') ,	498
l'Hermine (coquille) ,	249
Hippocampe ,	476
Hippolites ,	505
Hippopotame (rête d') ,	494
l'Hirondelle ,	283
de mer ,	476
Holothuries ,	469
Huîtres ,	278
à feuilles de persil ,	304
à talon ,	298
de la mer rouge ,	297
épineuses ,	298
feuille , Voyez <i>feuille.</i>	
feuilletées ,	293
proprement dites ,	280
Humantin ,	476.

J.

la J ABIRU (bec de) ,	491
la Jamaïque ,	336

le Jambon,	
le Jambonneau,	
le Jatou,	198
le Jaune d'œuf,	117
aplati,	<i>ibid.</i>
Ichneumons,	485
l'Idole,	430
l'If,	227
Iguana,	482
Insectes,	484
l'Isabelle,	272
l'Ivoire. Voyez <i>Mitre jaune.</i>	

K.

KAKERLAC,	485
le Kaman. Voyez <i>Conque exotique.</i>	
Kauris,	273
Kératophites,	9, 13, 47
plume de mer,	49
romarin,	50

L.

le LAMBDA,	489
le Lambis,	185
Lamie (gueule de),	476
la Lampe antique,	442
Lancette, (bec de)	491
Langouste,	471
la Langue,	346
de Chat, Voyez <i>chagrinée.</i>	
d'or,	372
la Lanterne,	377
d'Aristote,	416, 426

ALPHABÉTIQUE. 537

le Lapin,	268
le Lard,	162
le Léopard,	269
Lépas ou Patelles,	77
à appendice en demi corner,	91
cabachons,	87, 91
chambrés,	89
de Magellan,	79, 80
en bateau,	82
en gondole,	86
entiers,	78
fluviatiles,	428
percés au sommet,	88
la Levantine (grande),	365
la Levantine (petite),	<i>ibid.</i>
Lézard,	481
Galeotes,	<i>ibid.</i>
Téjuguacu,	482
volant,	480
la Licorne (coquille),	137
de mer (grande), <i>V. Narwal.</i>	
de mer (petite),	475
le Lievre,	270
à gouttes de suif,	<i>ibid.</i>
la Likénée rouge,	489
la Limace,	40
Limaçons à bouche demi-ronde, <i>Voy.</i>	
<i>Nérites.</i>	
à bouche ovale, <i>Voyez Sabots.</i>	
à bouche ronde,	110
de mer,	109
fluviatiles,	429
terrestres,	436

Limas, Voyez <i>Limaçons</i> .	
la Lime,	326
douce,	<i>ibid.</i>
Lion (rête de),	494
Le Lion de mer,	471
Lithophites, Voyez <i>Kératophites</i> .	
la Livrée,	445
Lorri écarlate,	490
Perruche,	<i>ibid.</i>
Loupe de perles,	507
Loup marin (défenses de),	495
(machoire de),	476
la Luifante,	445
la Lune marine,	464

M.

M ACHOIRES de Bécune,	476
de Dauphin,	<i>ibid.</i>
de Loup marin,	<i>ibid.</i>
de Raye,	477
de Requin,	476
d'Espadon,	<i>ibid.</i>
de Zygène,	<i>ibid.</i>
Madrépore abrotanoïde,	14
agaric,	17, 20, 22
blanc étoilé,	12, 15
blanc oculé,	11, 12
bois de Cerf,	14, 17
branchu,	11 - 18
calice ou tasse,	19
char de Neptune,	18
en buisson,	15, 17, 19
en choux fleurs,	16

ALPHABÉTIQUE. 539

Madrépore en cornes de Daim,	18
épi de bled,	15
grisâtre,	13, 15, 17
jaunâtre,	14, 16, 17
rougeâtre.	13, 16
violet,	12
<i>Magna Vetula,</i>	365
Main de mer,	469
de Sirene,	476
Malarmar,	<i>ibid.</i>
le Mammelon blanc,	117
jaune,	118
Manches de couteau,	378
les Manchettes de Neptune,	30, 31
le Manchon de Neptune,	59
Mante (squille),	471
Mante (insecte),	485
le Manteau blanc, Voyez <i>bourse</i> .	
ducal ou royal,	320
le Mantelct,	266
la Mappemonde, V. <i>Carte géographique</i> .	
le Marbre,	153
Marmose & ses petits,	498
le Maron épineux,	356
roti,	113
le Marteau (coquille),	286
le Marteau (poisson), Voyez <i>Zigène</i> .	
la Martelée. Voyez <i>Vis</i> .	
Martin-pêcheur,	490
la Massue d'Hercule,	204
Matrices de coquillages,	69
Méandrites,	32
en priapolite,	33

la Médaille ,	424
Méduse. Voyez <i>Tête de Méduse</i> .	
la Mennonite. Voyez <i>Cierge blanc</i> .	
Mere-perle ,	282
stérile. Voyez <i>Pintade</i> .	
le Millepieds (insecte) ,	484
mâle (coquille) ,	191
femelle (coquille) ,	192
Millepore à feuilles de chou ,	26
bois de Cerf	29
digité ,	27
en éventail ,	14, 22, 28
en fraise de Veau ,	27
le Minaret ,	142
la Minime (Buccin.) Voyez <i>Cordeliere</i> .	
la Minime (corner) ,	242
bleue (<i>idem.</i>)	<i>ibid.</i>
à bandes (phalene) ,	489
la Mitre ,	140
jaune ,	<i>ibid.</i>
Polonoise. V. <i>Bonnes de Neptune</i> .	
Moineau de Bengale ,	490
la Moire ,	256
Mollusques ,	469
Momie d'Egypte ,	501
la Monnoie de Guinée ,	266
la Moresque. Voyez <i>la Nègresse</i> .	
le Morille ,	63, 64
le Morio ,	488
le Mortier ,	60
Mouches ,	485
à deux aîles ,	}
à quatre aîles ,	
à scie ,	
	<i>ibid.</i>

ALPHABÉTIQUE. 141

Moules,	379
cylindriques. Voyez <i>Dattes</i> .	
fluviales. Voyez <i>Ténilles</i> .	
proprement dites ,	380
triangulaires. V. <i>Pinnes-marines</i> .	
la Moule arborisée,	386
d'Alger ,	384
de la Plata ,	383
des Papous ,	382
double ,	381
magellanique ,	380
Mousses marines ,	515
Multivalves. Voyez Coquilles.	
la Mure,	165
de Dargenville ,	214
de hayes ,	136
Murex. Voyez Rochers.	
à dents de chien ,	164
Musc ,	508
la Muscade ,	206
la Musique ,	160
bâtarde. Voyez <i>Bois-veiné</i> .	
couleur de rose ,	161
verte ,	<i>ibid.</i>

N.

NACELLE (la) (Lépas) ,	90
la Nacelle. Voyez Oscabrion.	
le Nacré ,	489
Nageoires de Baleine ,	477
Narwal (sa défense)	476
la Natte de jonc. Voy. Ecriture arabe.	
d'Italie ,	239
le Navet ,	243

la Navette de Tisserand ,	264
Nautilus ,	106
épais & chambrés ,	107
papyracés , non chambrés ;	108
Nautiloïdes ,	100
la Nébuleuse. Voyez <i>les Nuages</i> .	
la Négresse ,	259
la Neigeuse ,	268
Nérites de mer ,	116
épineuses ;	121, 430
fluviales ,	429
Nid d'Alcyon ,	491
d'Araignée , singulier ,	484
de Colibri ,	491
pensile des Indes ,	<i>ibid.</i>
la Noix de mer ,	206
le Nombril de Vénus ,	116
les Nuages ;	254

O.

l'**O**BÉLISQUE Chinois. V. *Clocher Chinois*.

l'Œil de Bœuf ,	438
de Bouc radié ,	82, 83
de Rubis radié ,	83, 84
l'Œillet de mer ,	36 - 38
l'Œuf (coquille) ,	264
papyracé (<i>idem.</i>)	<i>ibid.</i>
Œufs marins (Oursins) ,	418
d'Autruche ,	491
de Crocodile ,	481
l'Oignon blanc ,	443
Oiseaux ,	490
l'Oiseau. Voyez l' <i>Hirondelle</i> .	
trompette. Voyez <i>Colao</i> .	

A L P H A B É T I Q U E. 543

l'Olearia,	110
l'Olive de Panama,	258
les Olives,	257
l'Omelette,	254
Ongle du pied d'Élan;	496
l'Ongle odorant,	153
l'Onix. Voyez <i>Cierge blanc</i> .	
Opercules de Bouche d'or,	115
de Buccins,	153
d'Olearia,	115
l'Orbis à tête de lievre;	475
Oreilles de mer,	92
à trous,	93
sans trous,	95
l'Oreille d'Ane,	187
de Cochon	} 184
ou	
déchirée,	
de Cochon. Voy. <i>Crête de Coq</i> .	
de Midas,	132
de Vénus,	95
l'Orpheline,	331
Orrie de mer,	469
Orvert,	480
Oscabrion,	392
<i>Ostreum tortuosum</i> ,	285
Ovaires de coquillages;	69
de Raie,	477
l'Oublie,	206
Ovoïdes (Ourfins). V. <i>Œufs marins</i> .	
Ourfins,	408
l'Ourfin à foyes,	412
digité,	414
solaire,	425

P.

la PAGOD ,	115
Paille-en-cul,	490
le Pain de bougie,	101
d'épice,	423
le Palmier marin,	466
Pangolin. Voyez <i>Diable de Java</i> .	
le Pannache de mer,	54, 55
Paon de nuit, (le grand),	488
Paon de jour (le petit),	<i>ibid.</i>
de la Martinique,	489
le Papier de la Chine,	254
marbré,	250
roulé,	206
Papillon à queue du fenouil,	488
de la riviere des Amazones,	<i>ibid.</i>
porte-queue,	489
la Papyracée, Voyez <i>la lanterne</i> .	
le Patafol Chinois,	78
le Pas de Poulain,	418
Pastenaque,	475
le Pâté réticulé (gros),	457, 461
(petit),	458
Patelles, Voyez <i>Lépas</i> .	
la Patte de Crapaud,	200
d'oye,	191
le Pavillon d'Hollande,	448
d'orange,	136
du prince,	446
Pavois angulaire,	421
aplati,	422
la Peau d'Ane,	275
de chagrin,	236
	de

À L P H A B É T I Q U E. 545

la Peau de serpent,	113
de Tigre,	267
les Peignes,	314
à oreilles égales,	316
à oreilles inégales,	319
sans oreilles,	327
la Pélerine,	316
tuilée,	320
Pélican (bec de);	498
la Pelotte de beurre, V. <i>Tine de beurre.</i>	
Pelottes marines, Voy. <i>Égagropiles de mer.</i>	
la Pelure d'oignon;	181
le Perçoir,	225
la Perdrix,	209
rouge,	134
Perles d'Afrique;	506
d'Écosse,	<i>ibid.</i>
de la Pinne matine,	507
du Pérou;	506
Occidentales,	<i>ibid.</i>
Orientales,	<i>ibid.</i>
le Perron,	144
le Perroquet perlé,	111, 113
Perruche;	491
la Perruque à l'Angloise,	22
la Perspective, Voyez <i>l'Escalier,</i>	
la Petaloïde,	455
velue,	456
le Petit Ane,	273
Argus,	272
Cheval marin;	476
deuil,	112

le Petit Paon ,	488
la Petite Tortue ,	489
vérole ,	276
Pétoncles, V. <i>Peignes à oreilles inégales.</i>	
sans oreilles ,	327
Phalenes ,	487
la Phalene carmin	489
chouette ,	<i>ibid.</i>
couleur de rose ,	488
vitrée de la Chine ,	<i>ibid.</i>
Philandre ,	498
Phocas , Voyez <i>Loup marin.</i>	495
Phœnicoptere (bec de) ,	491
Pholades bivalves , Voyez <i>Datms.</i>	
multivalves ,	395
quintivalves ,	397
sextivalves ,	396
la Pie ,	112
Pieces d'Anatomie ,	500
Voyez <i>squélettes.</i>	
le Pied d'Ane ,	302
Pied d'Élan ,	496
<i>Piedra del Porco ,</i>	502
Pierre de Goa ,	504
de Serpent ,	<i>ibid.</i>
de Tortue ,	503
du Castoreum ,	505
du poisson Belluga ,	503
humaines ,	505, 506
murales ,	505
Pierrot tacheté ,	490
le Pigeonneau , Voyez <i>la Tourterelle.</i>	
la Pince de Chirurgien ,	375

ALPHABÉTIQUE. 547

le Pinceau de mer,	58
le Pinceau de mer, <i>Voyez arrosoir.</i>	
le Pinceau de mer, <i>Voyez scolopendre.</i>	
Pinnes marines,	388
la Pintade,	282
la Piqure de Mouches, <i>V. Drap d'argent.</i>	
la Pirogue,	291
la Pistache,	207
le Pitar,	333
Plan-orbes,	429
le Plein-chant,	161
le Plomb,	152
la Plume de mer, <i>Voyez Kératophires.</i>	
marine,	469
le Poinçon,	220
le Point d'Hongrie,	332
le Pois de mer,	122
Poissons,	475
armés,	<i>ibid.</i>
coffre,	<i>ibid.</i>
dorés de la Chine,	476
trompette,	<i>ibid.</i>
volans,	<i>ibid.</i>
Polypes de mer,	469
du corail,	10
Polypiers,	I
moux ou flexibles,	43
solides ou pierreux,	5
la Pomme d'Acajou,	186
folle de mer,	469
Porcelaines,	263
à bouche moins étroite,	264
à bouche plus étroite,	267

la Porcelaine à tête de Serpent	168
de M. Adanson,	135
tigrée, Voyez <i>peau de Tigre</i> .	
le Porc-épic de mer,	475
le Porc marin,	<i>ibid.</i>
le Porphyre,	258
le <i>Potan</i> ,	266
le Pot verd,	110
Poucepieds,	405
le Pou de Baleine,	404
de mer,	275
Poulette,	312
le Poutmon marin,	469
Poupart,	473
Pourpres,	192
à longue queue,	202
à petite queue,	194
la Pourpre de Panama. V. <i>Conque persique</i> .	
Pourpres épineuses,	199
rameuses triangulaires,	194
triangulaires,	197
triangulaires ailées,	198
le Prépuce,	211
Priapolite. Voyez <i>Méandrites</i> .	
la Princesse,	110
Proscarabées,	487
le Ptérophore,	489
Pucelages,	273
Pucerons,	487
Punaise ailée,	486
aquatique,	485
de mer. Voyez <i>Oscabrion</i> .	
terrestre,	485

A L P H A B É T I Q U E. 549

la Pyramide,	159
la Pyramidale pectinée,	458

Q.

QUADRUPEDES,	492
la Quenouille,	155
la Quenotte saignante,	117
la Queue d'Ecureuil,	56
d'Hermine,	248
Queue de Rhinoceros,	494

R.

la RACINE de Brione,	198
la Raccrocheuse,	170
la Radice (cœur),	362
la Radice (telline),	371
le Radix,	216
à pointes noires,	201
le Raisin de mer,	469
<i>Ranapiscatrix</i> ,	476
la Rape,	316
le <i>Rastellum</i> ,	288
ou	
le Rateau,	498
Rat (squelette de)	
la Ratissoire. Voyez <i>la Rape</i> .	
la Rave,	153
Raye en forme de Basilic,	476
(mâchoire de),	477
(ovaires de),	ibid.
le Rayon de miel,	335
la Rayonnée,	342

Rémore ,	476
(son os prétendu) ,	477
Renard (tête de) ,	494
Requin (mâchoire de) ,	476
Rérépore agaric ,	31
dentelle ,	30, 31
la Retorte. Voyez <i>la Cornue</i> .	
le Rezeau blanc ,	329
Rhenne (bois de) ,	495
le Rhinoceros (coquille) ,	168
(insecte.) ,	486
(oiseau) ,	491
(quadrupe.) Voyez <i>Corne</i> .	
la Robe Persienne. Voy. <i>Tapis de Perse</i> .	
Robert le diable ,	489
Rochers ,	158
aîlés à pattes ,	188
aîlés sans pattes ,	179
à petite queue ,	168
sans queue ,	159
triangulaires ,	168
le Rodolphe. Voyez <i>Conque Persique</i> .	
le Romarin. Voyez <i>Kératophiles</i> .	
la Rosette d'Epinette. Voyez <i>Cadran</i> .	
les Rotules ,	425
Rouget ,	476
Rougette ,	498
les Rouleaux ,	251
le Ruban (limaçon) ,	112
le Ruban (vis-buccin) ,	448

S.

les SABOTS ,	123
Salamandre aquatique,	481
terrestre,	<i>ibid.</i>
la Sandale,	90
Sanglier (défenses de),	495
des Moluques. V. <i>Baby-roësa</i> .	
le Sapin de mer,	57
la Sapotille,	297
le Satyre,	485
Sauterelles,	486
la <i>Scalata</i> ,	99
le Scarabée (coquille),	313
palmiste,	487
pillulaire,	<i>ibid.</i>
porc,	<i>ibid.</i>
la Scie,	361
Scinc,	481
Scolopendre de mer,	104, 469, 484
Scolopendroïdes,	50, 465
le Scorpion aquatique,	486
femelle, } (coquilles),	191
mâle, }	<i>ibid.</i>
le Scorpion (insecte),	484
marin,	476
orangé (coquille),	191
Seche,	469
la Selle Polonoise,	280
Semence de perles,	506
Sénembi,	482
Serpents,	478

Serpent à deux têtes,	480
aveugle,	479
d'Esculape,	<i>ibid.</i>
javelot,	478
marin,	476
sonnette (sa queue),	480
le Silene,	489
la Sole,	317
de la rare espee,	318
marquetée,	<i>ibid.</i>
le Soleil. Voyez l'Éperon.	
à treillis épineux,	456
digité d'Alorovande,	462
levant,	376
plat coriacé,	460
le Solen du sable,	97
Serpent,	100
la Sorciere,	113
le Souci,	489
Souris (squelette de),	499
la Souris (coquille),	271
le Spectre (coquille),	242
le Spectre (insecte),	485
la Spéculation,	244
le Sphinx du Troesne,	488
Spondiles,	298
<i>Spongia Veneris</i> ,	506
Squelette de Canard,	491
de Chat monstrueux,	499
de fœtus humain,	501
de Hérisson,	498
de la tête d'une Tortue,	482
de Souris,	422

A L P H A B É T I Q U E. 555

Squélette de Rat,	499
de tête humaine,	500
de Taupe,	499
Squille large,	471
sablonneuse,	<i>ibid.</i>
Staphilins,	487
Sucer. Voyez <i>Rémoré.</i>	

T.

le T A B A C d'Espagne,	488
le Taffetas,	256
le Tamaris de mer,	97
Tangara du Pérou,	490
le Tapis de Perse,	154
Tarentule,	484
le Tarer,	400
la Tarrière,	220
la Tasse. Voyez <i>Calice.</i>	
de Neptune,	212
Tatou ou Armadille,	498
à neuf bandes,	<i>ibid.</i>
Taupe (squélette de),	<i>ibid.</i>
Taupe-grillon,	484
la Taupe (coquille),	271
marine (fongipore),	41
marine (mollusque),	469
Taupins,	487
le Taureau volant,	486
<i>Tecuixim</i> (Lézard),	482
Teigne aquatique,	429, 485
<i>Tejuguacu</i> (Lézard),	482
le Téléscope,	222

Tellines,	369
béantes à une extrémité,	370
béantes aux deux bouts,	375
fluviales,	434
improprement dites. Voy. <i>Manches de couteau.</i>	
radiées,	371
la Telline de la Chine,	374
feuille. Voyez <i>Langue d'or.</i>	
Tenilles. Voyez <i>Tellines.</i>	
fluviales,	434
Térébratules. Voyez <i>Anomies.</i>	
les Testicules,	117
Tête de Baby-rousse,	494
de Bouc,	496
de Bouquetin,	<i>ibid.</i>
d'Hippopotame,	494
de Lion,	<i>ibid.</i>
de Renard,	<i>ibid.</i>
de Tigre,	494
de Vache marine,	<i>ibid.</i>
la Tête de Becasse,	202
de Méduse,	467
de Méduse à côtes,	<i>ibid.</i>
de Méduse à écusson,	<i>ibid.</i>
de Méduse brune,	466
de More,	22
de Mort,	419
de Serpent,	184
Thé (échantillons de),	513
la Thiaré,	140
à trous,	141
bâtarde,	142

ALPHABÉTIQUE. 353

la Thiare fluviatile,	432
le Thorax,	273
Tigre (tête de),	494
le Tigre jaune,	246
noir,	245
rouge,	246
lx Tine de beurre,	241
Tipules,	486
le Tire-bourre,	99
la Toile à matelas. <i>Voyez Lard.</i> d'araignée. <i>V. l'Esplandian.</i>	
le Toit Chinois,	91, 92.
le Toit Chinois. <i>Voyez la Pagode.</i>	
Tonnes,	205
à bouche échancrée,	208
à bouche entière,	206
à queue,	216
fluviatiles,	431
Tortue de mer,	482
de terre,	<i>ibid.</i>
la Tortue (coquille),	276
la Tortue (Papillon),	488, 489
Toucan, (bec de),	491
Toupies, <i>Voyez culs de lampe.</i>	
la Tour de Babel,	156
le Tournesol à douze rayons,	462
à treize rayons,	463
à trente-sept rayons,	462
à trente-huit rayons,	463
la Tourterelle,	179
la Transparente,	280
la Tricottée,	339
la Trompe marine,	148

la Trompette de mer ,	63
la Trompette (poisson) ,	476
la Truitée ,	269
Tubes vermiculaires. Voyez <i>Tuyaux</i> <i>de mer.</i>	
Tubipores ,	24, 25
la Tuilée ,	366
la Tulipe (Buccin) ,	150
la Tulipe (gland de mer) ,	402
la Tulipe (moule) ,	384
la Tulipe (rouleau) ,	253
le Turban (éponge) ,	60
le Turban (casque) ,	177
le Turban (gland de mer) ,	402
le Turban Maure ,	416
Turc (Oursin) ,	413
Turc (Limaçon) ,	115
Turbans à grains de petite vérole ,	413
à mammelons ,	414
à panneaux ,	411
miliaires ,	410
miliaires anguleux ,	412
Tuyaux chambrés ,	101
cloisonnés ,	399
de mer multivalves ,	398
de mer univalves ,	95
d'orgue ,	103
fluviales ,	418
groupés, Voyez <i>Vermiculaires.</i>	
non testacés ,	104
simples ou isolés ,	97
trompette ,	102

V.

V ACHE marine (membre de),	477
(rête de),	494
Végétaux,	509
Velette,	469
le Verd doré,	488
Verge ailée. <i>Voyez plume marine.</i>	
marine,	469
Vermets,	102, 103
Vermiculaires,	102
Vers mangeurs de Chenille,	485
palmistes,	484
Vertebres de Baleine,	477
la Veuve,	112, 115
perlée,	111
le Vice Amiral,	233
de Rumphius,	234
la Vieille ridée,	364
le Villebrequin,	100
Vipere,	480
Vis,	218
à tête tronquée,	222
Buccins,	447
fluviatiles,	432
lisses,	219
striées,	224
terrestres,	447, 450
tuberculeuses,	226
la Vis à caracteres,	219
de pressoir,	223
feuilletée,	228
martelée,	229

558 TABLE ALPHABÉTIQUE.

la Vis tigrée,	219
la Vitre Chinoise (coquille),	280
la Vitrée de la Chine (phalene),	488
l'Unique (Buccin),	151, 466
l'Unique (Limaçon),	443
l'Unique (porcelaine),	266
l'Unique (Vis Buccin),	447
Univalves. Voyez coquilles.	
la Voile roulée. V. l'artimon entortillé.	
le Volant doré,	489
Volutes,	231
coniques. Voyez cornets.	
cylindriques. Voyez rouleaux.	
échancrées Voyez olives.	
la Voluté de Guinée. Voyez aîle de Papillon.	
le Vulcain,	488

Z.

le ZEBRE. Voyez l'Ane rayé.	
le Zig-zag (coquille),	240
le Zig-zag (phalene),	489
Zoophites,	451
Zygène, (machoire de),	476

Fin de la Table du premier Volume.

F A U T E S

A corriger dans ce Volume.

Pag.	11, <i>lig.</i> 18, lissés, <i>lis.</i> lisses.
20,	1, prolongent, <i>lis.</i> se prolongent.
48,	28, Rétépores dentellés, <i>lis.</i> Rétépores-dentelle.
69,	23, de, <i>effacez</i> ce mot.
146,	20, premières, <i>lis.</i> premiers.
172,	27, 184, <i>lis.</i> 284.
<i>ibid.</i>	27, 185, <i>lis.</i> 285.
292,	9, de <i>lis.</i> des.
349,	14, sommet, <i>lis.</i> sommets.
512,	3, Alcyons, <i>lis.</i> Alcyons.

Fautes à corriger dans les Citations.

Pag.	16, Gualt. ind. test. n°. 27, <i>lis.</i> n°. 122.
48,	Seba, pl. 114, n°. 3, <i>lis.</i> Rumph. herb. Amb. tom. 6, tab. 78, litt. a, b, c.
56,	Voyez l'essai de, <i>lis.</i> l'essai sur.
104,	Ellis, pl. 34, mar. tab. 1, f. 4, <i>effacez</i> mar. tab. 1, f. 4.
125,	Rumph. tab. 21, litt. A, <i>lis.</i> litt. D.
136,	List. tab. 56, <i>lis.</i> List. tab. 656.
137,	Seba, pl. 37, <i>lis.</i> Seba, pl. 39.
<i>idem. ibid.</i>	tab. 830, f. <i>ajoutez</i> 52.
152,	List. tab. 47, <i>lis.</i> List. tab. 892.
166,	Arg. pl. 10, <i>lis.</i> Arg. pl. 14.
171,	Rumph. tab. 22, lit. B, <i>lis.</i> Rumph. tab. 23, lit. C.
188,	Seba, pl. 81, <i>lis.</i> Seba, pl. 82.

Page 211, Seba, pl. 66, n^o. 13 &, *ajoutez* 143
 222, Seba, pl. 59, *lis*. Seba, pl. 55.
 233, Arg. pl. 11, *lis*. Arg. pl. 12.
 240, *ibid.* f. 26, *lis*. *ibid.* tab 779, f. 26.
 245, Seba, pl. 46, n^o. 3 & 4, *lis*. n^o. 1 & 2;
 275, 1 litt. A *bid.* *lis*. *ibid.* litt. A A.
 285, Rumph. tab. 47, litt. R, *lis*. litt. K.
 288, Gualt. tab. 103, *ajoutez* litt. C.
 293, Rumph. tab. 43, *lis*. Rumph. tab. 48.
 331, Bonan. Cl. 2, n^o. 60 & 62, *lis*. 60 & 61;
 353, Gualt. tab. 38, *lis*. Gualt. tab. 83.
 376, List. tab. 422, f. 226, *lis*. f. 166.
 406, Seba, pl. 87, n^o. 11, *lis*. pl. 13.
 433, List. tab. 150, *ajoutez* fig. 5.
 445, Arg. pl. 24. 28, fig. 4 & 8, *effacez* 24;
 481, *ibid.* pl. 93, n^o. *ajoutez* 1.

Fin de l'Errata



EXPLICATION DES FIGURES

DU TOME PREMIER.

PLANCHE I.

MILLEPORE à branches feuillues, formé sur une Bouteille pêchée à la Barbade. Il en est parlé à l'*art.* 73 des Polypiers, *page* 28.

PLANCHE II.

La lettre A représente un Lépas du premier genre, auquel nous avons donné le nom de *Parasol Chinois* : il en est parlé aux *articles* 1 & 2 des Coquilles, *page* 78.

Sous la lettre B est le Lépas *Cabochon* blanc de Saint-Domingue, du quatrième genre de cette famille, vû par dehors. Il en est parlé à l'*art.* 42 des Coquilles, *page* 91. On voit, en b, la même Coquille renversée, avec son appendice intérieur en demi-cornet.

PLANCHE III.

La lettre C offre un Lépas de Magellan, à
Tome I. Nn

coquille percée en-dessus, (ce qui caractérise le second genre de cette famille :) c'est celui de l'*art.* 37 des Coquilles, *page* 88. Il ne diffère que par de légers accidens de celui qui est décrit à l'*art.* 36.

Le Lépas de la lettre D est aussi de Magellan : c'est un Lépas papyracé du premier genre, qui se trouve décrit à l'*art.* 8 des Coquilles, *page* 79.

P L A N C H E I V.

On voit, à la lettre E, un groupe très-gracieux de Tuyaux de mer de l'espèce des *Tirebourres*, dont il est parlé à l'*art.* 57 des Coquilles, *page* 99.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre F, est un de ceux auxquels nous avons donné le nom de *Pains de bougie* : il en est parlé à l'*art.* 61 des Coquilles, *pag.* 100.

La lettre G montre un autre Tuyau de mer, nommé *Vilebrequin* : il en est parlé à l'*art.* 59 des Coquilles, *page* 100.

On voit, en H, trois Tuyaux de mer accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intestins. Ils sont compris dans l'*article* 60 des Coquilles, *page* 100.

P L A N C H E V.

On a représenté, à la lettre I, le premier des deux Burgaux de la Chine, décrits à l'*art.* 98 des Coquilles, *page* 111.

On voit, en K, l'un des deux Sabots de l'*art.* 148 des Coquilles, *page* 125.

Le petit Buccin qui se voit en L, est un des deux décrits sous le nom de *Perrons* à l'*art.* 193 des Coquilles, *pag.* 144.

P L A N C H E V I.

On voit, en M, un Sabot d'Amérique, chargé d'autres coquillages; ce qui lui a fait donner le nom de *Fripiere*: c'est la première des trois dont il est parlé à l'*article* 147 des Coquilles, *page* 125. La même Coquille est vue en m du côté de la bouche.

La lettre N offre le *Gland de mer épineux*, adhérent à une valve de Conque anatifere, dont il est parlé à l'*article* 919 des Coquilles, *page* 402.

On a représenté, en O, un Piquant d'Ourfin, extrêmement rare & singulier, décrit vers la fin de l'*art.* 961 des Coquilles, *page* 426.

N n ij

 P L A N C H E V I I .

Le Limaçon qui se voit en P, est une des deux *Bouches d'argent* d'espèce rare, décrites à l'article 106 des Coquilles, page 112.

On voit, en Q, le Buccin nommé *Gauxfre*, dont il est parlé à l'article 197 des Coquilles, page 144.

La lettre R offre la Coquille nommée *Amande rôtie*, décrite à l'article 823 des Coquilles, page 357.

 P L A N C H E V I I I .

Le Buccin de Magellan, représenté en S, se trouve décrit à l'article 181 des Coquilles, page 140.

Autre Buccin Magellanique, représenté à la lettre T : c'est l'un des deux décrits à l'article 198 des Coquilles, page 145.

On voit, à la lettre V, le Buccin nommé *Cabestan*, décrit à l'article 192 des Coquilles, page 143.

La lettre X fait voir un petit Buccin singulier, nommé *Mûre de haie*. Le même est vu en x du côté de la bouche. Il en est parlé à l'article 172 des Coquilles, page 136.

PLANCHE IX.

La lettre A offre un Buccin très-rare , nommé le *Buccin crénelé* : il est décrit à l'*art.* 202 des Coquilles , *page* 146.

On voit , en B , un Buccin de Magellan , nommé la *Licorne*. Le même se voit en b du côté de la bouche , pour en faire voir la dent faillante. Il en est parlé à l'*article* 174 des Coquilles , *page* 136.

On a représenté , en C , une Coralline rare , à longue tige , nommée le *Pinson de mer*. Le restant de la tige se voit à la lettre e. Ce morceau est décrit à l'*article* 149 des Polypiers , *page* 58.

PLANCHE X.

La lettre B offre un beau Buccin Magellanique , nommé le *Buccin feuilleté*. Le même est vu en d du côté de la bouche. Il est décrit à l'*article* 194 des Coquilles , *page* 144.

PLANCHE XI.

On voit , en E , le Rocher de la Chine , dont
N n iij

il est parlé à l'*article 231* des Coquilles, *page 161*. Le même est représenté en e du côté de la bouche.

P L A N C H E X I I.

La Coquille qu'offre cette planche est nommée par Klein *Racine de Brione*, & se trouve gravée dans Lister. Nous ne l'avons fait représenter que pour faire voir les divers changemens d'état de cette Coquille, qui est ici dépourvue d'aîle. Il en est parlé à l'*article 341* des Coquilles, *page 190*.

P L A N C H E X I I I.

La même Coquille de la planche précédente, mais plus avancée en âge, & garnie de son aîle. Elle est aussi décrite à l'*art. 341* des Coquilles, *page 190*.

P L A N C H E X I V.

La même Coquille représentée dans son dernier âge, avec ses pattes. C'est l'une des deux de même espèce dont il est parlé à l'*art. 340* des Coquilles, *page 190*.

P L A N C H E X V.

On voit, en F, une rare & belle *Olive* dont il est parlé à l'article 542 des Coquilles, page 257.

La lettre G représente un Rocher blanc de lait : c'est le premier des trois qui sont décrits à l'article 255 des Coquilles, page 162.

La lettre H offre une Pourpre épineuse très-rare, nommée le *Radix à pointes noires*. Elle se trouve décrite à l'article 374 des Coquilles, page 201.

La Porcelaine de la lettre I se nomme la *Tortue*, & est décrite dans l'article 581 des Coquilles, pages 275 & 276.

P L A N C H E X V I.

On a représenté, en K, une très-belle *Pourpre triangulaire aîlée*, décrite à l'article 366 des Coquilles, page 198.

Autre *Pourpre aîlée* représentée en L, & décrite à l'article 367 des Coquilles, page 198.

Troisième *Pourpre aîlée*, représentée en M : elle est décrite à l'article 368 des Coquilles, page 199.

On voit, en N, une Pourpre triangulaire

368

des Indes , blanche ; à taches peu nombreuses : une autre de même espèce , entièrement blanche , à la lettre O ; & une petite blanche du Sénégal , à queue fermée comme un tuyau , à lettre P. Ces trois Pourpres , qui toutes ont un commencement d'aîle , font partie de l'*article 365 des Coquilles , page 198.*

La Vis qui se voit à la lettre Q , est une des *Vis feuilletées blanches* qui font partie de l'*article 442 des Coquilles , page 229.*

P L A N C H E X V I I .

La lettre R offre un Casque des Indes , décrit à l'*article 283 des Coquilles , page 172.*

Le Casque qui est en S , est le dernier de ceux qui sont décrits à l'*article 289 des Coquilles , page 175.*

On voit , en T , une Coquille du genre des Cœurs , nommée *Marron épineux* , & décrite à l'*article 281 des Coquilles , page 356.* La lettre t fait voir la même Coquille dans une autre position.

P L A N C H E X V I I I .

La lettre V représente un grand Cœur très-rare , nommé le *Coqueluthon de Moine* : il se

trouve décrit à l'article 824 des Coquilles , page 357. L'intérieur de l'une des valves de cette Coquille est représenté en v , pour en faire voir le large appendice en forme d'oreille.

PLANCHE XIX.

Le groupe de deux Huitres , qui est représenté à la lettre X , est une espèce de *Crête de coq* d'une variété rare. Voyez ce qui en est dit à l'art. 606 des Coquilles , page 288.

On voit , en Y , une autre Huitre nommée *Corne d'abondance* ; elle appartient à l'article 610 des Coquilles , & est de l'espèce décrite dans l'article 608 , pages 288 & 289.

La lettre Z représente une des deux *Moules arborisées* , décrites à l'article 898 des Coquilles , page 386.

PLANCHE XX.

Cette planche réunit toutes les variétés d'Anomies que nous possédons , décrites aux pages 311 , 312 & 313.

La lettre A représente la grande Anomie Magellanique striée de l'article 696. On a mis , en a , la valve supérieure d'une Coquille de

cette espèce ; renversée , pour faire voir la forme singulière de ses appendices.

B est l'Anomie verd - noirâtre des Indes , connue sous le nom de *Bec de Perroquet* , & décrite à l'article 692. La même représentée de profil en b , pour faire voir l'avance de son bec.

C est l'Anomie lisse de Mahon , décrite à l'article 694.

D. Petite Anomie jaune-blond & transparente de Mahon ; c'est une des deux premières qui se trouvent décrites à l'article 699 : elle est représentée un peu plus grande qu'elle ne l'est en effet.

E. Autre petite Anomie à tuyaux latéraux , du même article , représentée de grandeur naturelle.

e. La même grossie de plus de moitié.

F. Anomie striée , de forme ovale , décrite dans le même article.

G. Autre Anomie différente , du même article.

g. La même , vûe par dessous.

P L A N C H E X X I.

Le Tuyau de mer , représenté à la lettre H , est le *Taret rongeur de bois* de M. Adanson , fermé , par le bout le plus large , d'une espèce

d'opercule hémisphérique : il est décrit à l'*article 916* des Coquilles, *page 399*.

On voit, en I, une autre variété de *Taret* coupé depuis a jusqu'en b, pour en faire voir la construction intérieure. La pièce qui en a été enlevée se voit en i. Il est parlé de ce Tuyau multivalve vers la fin de l'*article 916* ci-dessus.

Autre Tuyau de mer, représenté en K, dont l'extrémité c est fermée par une demi-sphère lisse & luisante. Il est décrit à l'*article 51* des Coquilles, *page 97*.

La lettre L offre un Tuyau de mer chambré, dont on a mis les cloisons à découvert depuis d jusques en e. Il est parlé de ce Tuyau à l'*article 62* des Coquilles, *page 101*.

P L A N C H E X X I I.


Palais d'une espèce de Raie de la Chine, contourné de maniere à imiter deux Buccins. Il en est parlé à l'*art. 14* des Poissons, *page 477*.


DE l'Imprimerie de MICHEL LAMBERT, rue des Cordeliers, au Collège de Bourgogne, 1767.

Pl. I.




C. Brydell at sail 1766.







C. Bresse bel. et seul 1766.








C. Briggs del et Scul 1766



PLXI.





1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

F

I



1

2

3


4


5

6

7

8






•
•

•
•
•

•
•

•



Bouche dans la classe des Rayes
Dessinée des deux côtés grand comme le naturel

Tirée du Cabinet de M^r Davila.

Marie Raboult del et Sculp.



